


6342



H. CORREVON



Floraine

CHÊNE-BOURG

GENÈVE



XIV^{me} Catalogue de Plantes

1912-1914

Notre liste de plantes.

Nous rendons nos lecteurs attentifs au fait que ce catalogue renferme, à côté de la presque totalité des plantes des montagnes qui sont cultivées dans les jardins du monde entier et que nous avons acclimatées à Genève par semis, greffe, bouturage, etc., une grande quantité de plantes rares, rustiques ou demi-rustiques sous le climat du Centre européen, qui ne se rencontrent dans aucun établissement d'horticulture. Cette collection, qui était originairement celle des frères Paris dont nous avons repris l'établissement justement réputé dès 1850 — s'est considérablement augmentée depuis 1884, époque où nous l'avons acquise.

Nos plantes sont, pour la plupart, cultivées en pots ou en godets et toutes sont acclimatées. **Il ne s'agit donc pas d'exemplaires arrachés dans la nature et mis en jauge en attendant leur vente.** C'est sur ce point surtout que nous attirons l'attention des amateurs qui ont subi des insuccès avec des plantes expédiées par des fournisseurs qui pratiquent ce mode de faire.

Notre étiquetage est aussi correct qu'il est possible de l'établir en horticulture. L'*Index Kewensis* est le guide d'après lequel nos plantes sont classées; quant aux variétés horticoles elles sont dénommées d'après le dictionnaire de Nicholson, autant que faire se peut. Les synonymes, ou les noms vulgaires sont en italique.

Pour l'instruction des amateurs qui ne sont pas au courant des cultures alpines nous marquons sur leur demande des indications sur les étiquettes des plantes que nous expédions. Un O = ombre (*sh.* = *shade*); s. = soleil (*sun*); h. = humide (*w* = *wet*); sc. = sec (*dr.* = *dry*); R. = fissure des rochers (*crevice*); aq. = aquatique.

Des Plantes alpines.

Depuis quelques années, la culture des plantes de montagnes a pris un développement considérable dans le monde de l'horticulture. Il n'est plus guère de beau jardin qui n'ait son « alpinum » ou sa petite rocaille. On a abandonné le style guindé qui nous a valu les corbeilles plates ou les « mosaïcultures » pour s'adonner de plus en plus aux cultures des plantes vivaces et rustiques; au *jardin-tapis* on commence à préférer un arrangement pittoresque et naturel, les rochers, les gazons fleuris et émaillés de fleurs variées, les sous-bois tout rayonnants de corolles harmonisant leurs teintes et répandant leur délicieux parfum dans l'air. Le *jardin alpin* a désormais sa place acquise dans tout parc ou dans toute propriété de goût.

Le jardin alpin d'acclimatation à Genève, qui fut créé en 1884 dans le but d'aider à ce mouvement qui commençait alors à se produire, a le mérite d'avoir été l'un des premiers qui se sont occupés de l'acclimatation des plantes alpines. Ces cultures furent établies déjà en 1876 dans ma propriété d'Yverdon (Vaud), et le catalogue de ces plantes fut publié en 1877. Depuis lors, grâce à une expérience de tous les jours, j'en suis arrivé à élever presque toutes ces plantes par le moyen du semis, le seul moyen propice à leur développement. De nombreux témoignages parus dans les journaux anglais, américains, suédois, autrichiens, allemands, français, italiens, danois, hollandais, belges et suisses, prouvent que les plantes que nous acclimatons à Genève réussissent bien dans les jardins de ces différents pays. D'innombrables attestations de nos clients, dans tous les pays de l'Europe, nous démontrent que nous avons eu raison d'entrer dans cette voie, et il est certain que, dans le monde horticole notre *jardin alpin d'acclimatation* a sa place marquée. Nous avons obtenu 85 médailles d'or, de vermeil et d'argent dans autant d'Expositions différentes, tant en Suisse qu'à l'étranger.

La plupart de nos plantes alpines peuvent s'expédier durant toute l'année, grâce à la culture en pots; les plantes vivaces, par contre, ne s'expédient que de février en juin, et de septembre en novembre.

Un catalogue de graines, qui paraît en novembre, donne la liste de toutes les espèces récoltées par nous, soit ici à Genève, soit dans les montagnes et de celles que nous recevons de nos différents correspondants.

Des volumes sur la description, sur le mode de culture ou d'utilisation des diverses plantes contenues dans cette liste, sont annoncés à la p. 59 du présent catalogue.

H. CORREVON.

Voir page 3 de la couverture : Conditions de vente et moyens d'expédition.

Plantes alpines, montagnardes et saxatiles

propres à planter dans les rocailles et les murs, en plates-bandes ou en groupes.

Nous donnons peu de descriptions des plantes énumérées, nos clients possédant très généralement le petit volume : *Les plantes alpines et leur culture*, annoncé à la fin du présent catalogue.

Nous vendons des collections à notre choix aux prix de : 40 fr. le cent, 20 fr. les 50, 10 fr. les 25 et 5 fr. les 12, en autant d'espèces que de pieds.

	Fr. Ct.
Acæna Buchanani (jol. verd. bleuâtre) . . .	0.50
» glauca	0.50
» microphylla	0.50
» Novæ Zelandiæ	0.50
» ovalifolia	0.50
» pinnatifida	0.50
» sarmentosa	0.50
X » sericea	0.50
» splendens (beau feuillage argenté) . . .	2.50

Plantes curieuses, naines et rampantes ; merveilleux gazon dans les sous-bois ou les lieux ombragés ; réussissent aussi en plein soleil ; feuill. parfois aussi délicates que frondes Fougères.

Acantholimon acerosum	2.50
» androsaceum	2.50
» Armenum	2.50
» Armenum, var. Balansæ	2.50
» Fomini	1.50
» glumaceum	1.50
» Hohenackeri	2.50
» lepturoides	2.20
» leptur. graminifolium	2.50
36 — venustum	1.50

Grand soleil ; rocher. Pl. à floraison superbe et prolongée.

* Acanthosonchus cervicornis 2.50

(Laitue-hérissée). Très petit arbuscule en boules épineuses, à fleurs jaune de Laitue, originaire d'Orient et d'Égypte.

Acanthus, voir *Pl. vivaces*.

* Les espèces de ce catalogue marquées d'un * sont celles qui réclament une couverture sous le climat de Genève et Paris.

ACHILLÉES

I. ESP. RAMPANTES A FLEURS BLANCHES, A FEUILLAGE ARGENTÉ :

Achillea ageratifolia	0.50
» aizoon	0.50
» argentea	0.50
» Clavennæ	0.50
» Kellereri	1.—
» umbellata	0.50

II. ACHILLÉES ALPINES DES HAUTES RÉGIONS, A FLEURS BLANCHES, A FEUILLAGE PLUS OU MOINS AROMATIQUE.

» atrata	0.50
» Clusiana	1.—
» Correvoniana	1.50
» crustata	1.—
» Grisebachii	1.—
» Herba-Rota	1.—
» Impatiens	0.50
» in punctata	2.50
» lingulata	0.50
» macedonica	1.—
» macrophylla	0.50
» moschata (faux Genipi)	0.50
» nana (Camomille des glaciers)	1.—
» pyrenaica	0.50
» Reichardiana	2.50
» rupestris	1.50
» serbica	0.50
» sibirica	0.50

III. ACHILLÉES RAMPANTES, BASSES ET A FLEURS

JAUNE VIF :

<i>Achillea Ageratum</i>	0 50
» <i>albicaulis</i>	0 50
» <i>Eupatorium</i>	0 50
» <i>pectinata</i>	0 50
» <i>sericea</i>	0 50

Très belle espèce basse à feuillage soyeux, à gros et nombreux capitules jaune vif (juillet-octobre).

» <i>tomentosa</i>	0 50
------------------------------	------

Excellente pour tapisser et former des bordures ; très solide et florifère, fl. jaune vif.

(Pour les esp. plus élevées, v. *Plantes vivaces*).

<i>Aconitum anthora</i> , fl. jaunes	0 50
» <i>californicum</i>	1. —
» <i>cammarum</i> (fl. violet bleu)	0 50
» <i>cernuum</i>	0 50
» <i>Columbianum</i>	1. —
» <i>Fischeri</i>	0 50
» <i>Japonicum</i>	0 50
» <i>Kusnetzowi</i>	0 50
» <i>Lycotomum</i> , fl. jaunes	0 50
» <i>Napellus</i> , fl. bleu-indigo	0 50
» » à fleurs blanches	1 50
» <i>paniculatum</i> , fl. bleu-foncé	0 50
» <i>septentrionale</i> , couleur lie de vin	1 50
» <i>tauricum</i>	0 50
» <i>variegatum</i> , fl. bleu et blanc	0 50
» » à fl. blanches	1 50
» <i>volubile</i>	1. —
» <i>Wilsoni</i>	1. —

Bonnes pl. vivaces, propres à garnir les places ombragées et les lieux frais, à décorer les plates-bandes et à animer les grandes rocailles. Excellentes pour le jardin alpin. Culture des plus faciles ; fleurissent l'été et l'automne.

<i>Actæa spicata</i> , beaux fruits noirs, luisants	0 50
<i>Actinella grandiflora</i>	2 50
» <i>scaposa</i>	2 50
<i>Adenophora communis</i>	0 50
» <i>denticulata</i>	1. —
» <i>latifolia</i>	0 50
» <i>lilifolia</i>	1. —
» <i>Potanini</i>	0 50
» » à fl. blanches	1. —
» <i>stylosa</i>	0 50
» <i>verticillata</i>	1. —

Ce sont des campanules propres à garnir les rochers, les plates-bandes et massifs ; fl. lilas ou bleues ; pl. élégantes, hautes de 50 cent. à 1 mètre ; juin-août.

<i>Adenostyles albifrons</i>	1 50
» <i>alpina</i>	1 50
» <i>leucophylla</i>	1 50
<i>Adonis amurensis</i>	1 50
» » fl. pl.	2 50
» <i>dahurica</i>	2 50
» <i>pyrenaica</i> , très rare et très belle espèce qui fleurit au printemps	1 50

Fr. Ct.

<i>Adonis vernalis</i>	0 50
» <i>wolgensis</i>	1 50

Grandes anémones d'un jaune brillant, à feuillage très finement divisé ; de mars en mai. L'*A. vernalis* est une superbe espèce facile à cultiver ; c'est l'une des meilleures plantes du premier printemps. Sol profond et léger, grand soleil ; lieux secs.

<i>Adoxa moschatellina</i>	0 50
--------------------------------------	------

Petite caprifoliacée rampante, très propre à garnir les sous-bois et lieux ombragés.

<i>Aegopodium Podagraria</i> à feuilles panachées (pour le sous-bois)	0 50
---------------------------------------------------------------------------------	------

<i>Aethionema armenum</i> (excellente pl. pour rochers)	2 50
-------------------------------------------------------------------	------

» <i>cordatum</i> (<i>Eunomia cordata</i>)	1. —
» <i>cordifolium</i> (<i>Iberis jucunda</i>)	1. —
» <i>gracile</i> (<i>A. persicum</i>)	0 50
» <i>grandiflorum</i>	0 50
» <i>Iberideum</i> , à fl. blanc pur	0 50
» <i>ovalifolium</i>	0 50
» <i>pulchellum</i>	0 50
» <i>rotundifolium</i> (nouveau)	2 50
» <i>saxatile</i>	0 50
» <i>schistosum</i> 3.	0 50
» <i>Thomasianum</i> (rarissime)	1 50
» <i>trinervium</i>	1 50

Gracieuses Crucifères, très florifères, aimant le soleil et propres à garnir les rocailles, les fentes des murs et les lieux secs. Les *A. cordifol.*, *grandifl.* et *gracile* sont les plus florifères et les plus décoratives.

<i>Aethopappus pulcherrimus</i>	1. —
-------------------------------------------	------

<i>Ajuga Genevensis</i>	0 50
» <i>metallica crispa</i>	0 50
» <i>pyramidalis</i>	0 50
» <i>reptans</i>	0 50
» » à fol. var.	0 50
» » à fl. blanches	0 50
» » à fl. roses	0 50

Les *Ajuga* (*Bugles*) ont des épis à fl. bleues, très décoratives chez les *A. Genevensis* et *reptans* qui sont des espèces envahissantes et très propres à garnir rapidement un talus aride ou un rocher ensoleillé ; sol maigre.

<i>Alchemilla alpina</i>	0 50
» <i>conjuncta</i>	0 50
» <i>helvetica</i>	0 50
» <i>Lapeyrousei</i>	0 50
» <i>pentaphyllea</i>	0 50
» <i>splendens</i>	0 50
» <i>vulgaris</i>	0 50

Petites Rosacées au feuillage gracieux et souvent argenté-soyeux.

<i>Alkanna orientalis</i> (bourrache grecque à fl. jaunes)	0 50
----------------------------------------------------------------------	------

<i>Allium moly</i> (fleurs jaune d'or)	0 50
» <i>pedæmontanum</i> (grand. fl. roses)	1. —
» <i>Schuberti</i>	0 50
» <i>Ursinum</i> , pour les sous-bois	0 50
» <i>Victorialis</i> (Herbe à 9 chemises)	0 50

	Fr. Ct.
Alsine, voir <i>Arenaria</i> .	
<i>Althæa canabina</i>	0.50
<i>Alyssum argenteum</i>	0.50
» <i>alpestre</i>	1.50
» <i>Gemonense</i>	0.50
» <i>halimifolium</i>	0.50
» <i>idaeum</i>	1.50
» <i>leucadeum</i>	1.—
» <i>Mœllendorffianum</i>	1.—
» <i>montanum</i>	0.50
» <i>obtusifolium</i>	1.50
» <i>ovirense</i>	1.50
» <i>pyrenaicum</i>	1.50
» <i>repens</i>	1.50
» <i>rostratum</i>	0.50
» <i>rupestre</i>	2.50
» <i>saxatile</i> (Corbeille d'or)	0.50
» » <i>citrinum</i>	0.50
» <i>saxatile compactum</i>	1.50
» <i>serpyllifolium</i>	1.50
» <i>speciosum</i>	0.50
» <i>spinosum</i>	1.—
» » <i>roseum</i>	2.50
» <i>tortuosum</i>	2.50
» <i>Wiersbickii</i>	0.50
» <i>Wulfenianum</i>	0.50

Crucifères rampantes ou en buisson, aux nombreuses fl. jaunes ou blanches; soleil, avril-juin.

Amelanchier, voir *Arbustes*.

— <i>Amphicome arguta</i>	2.50
<i>Amphoricarpus Neumayeri</i>	2.50
<i>Amphyrapis albensens</i>	1.—
<i>Anacyclus formosus</i>	1.50
Joli arbuste bas à feuillage gris d'argent.	

<i>Anagallis tenella</i>	1.50
------------------------------------	------

Délicieuse petite pl. rampante, aux fl. roses; sol poreux et humide; mi-soleil. Se cultive aussi dans les suspensions ou dans le sphagnum.

Anchusa, voir *Pl. vivaces*.

<i>Andrachne cœchica</i>	2.50
------------------------------------	------

Petit arbuste oriental très curieux, propre à garnir rochers au soleil.

» <i>telephiifolia</i>	0.50
<i>Andromeda polifolia</i>	1.50
» <i>tetragona</i>	2.50

ANDROSACES, GROUPE DES ESPÈCES TERRESTRES

<i>Androsace arachnoidæa</i> (fl. blanches)	1.—
» <i>Brigantiaca</i> (fl. blanc rosé)	1.50
» <i>carnea</i> (fl. rose vif)	1.—
» <i>Chamæjasme</i> (fl. blanches)	0.50
» <i>Chumbyi</i> (fl. carmin clair)	0.50
» <i>foliosa</i> (fl. lilas)	1.50
» <i>lactea</i> (fl. blanc pur)	0.50
» <i>Laggeri</i> (fl. rose vif; mars-avril)	0.50
» <i>lanuginosa</i> (fl. lilas, feuill. argenté-soyeux)	0.50
» <i>Mathildæ</i>	5.—
» <i>multiscapa</i>	5.—

	Fr. Ct.
<i>Androsace obtusifolia</i> (fl. blanches)	0.50
» <i>oculata</i> (fl. blanc rosé, à œil rose vif)	1.—
» <i>primuloides</i>	2.50
» <i>sarmentosa</i> (fl. rose lilas)	0.50
» <i>sempervivoides</i> (fl. rose carmin)	1.—
» <i>villosa</i> (fl. blanc et rose)	0.50

Toutes ces esp. aiment le soleil, un sol pierreux et sableux; une bonne niche dans la rocaille. Les *A. foliosa*, *lanuginosa*, *oculata* et *sarmentosa* (himalayennes) sont plus particulièrement robustes et vigoureuses et fleuriss. abond. de juin en octobre-novembre. On peut les cultiver en pleine terre.

ANDROSACES (*Aretia*), GROUPE DES ESPÈCES

SAXATILES

» <i>Charpentieri</i> (carmin vif, rarissime)	5.—
» <i>ciliata</i> (carmin vif, rare)	2.50
» <i>cylindrica</i> (blanc, rare)	5.—
» <i>glacialis</i> (du rose le plus vif au blanc pur)	1.—
» <i>Hausmanni</i> (rose)	5.—
» <i>Hedraantha</i> (rose vif)	1.50
» <i>Helvetica</i> (blanc, touffe serrée de rameaux grisâtres)	1.50
» <i>hirtella</i> (blanc, feuillage argenté, rarissime)	5.—
» <i>hybrida</i> (<i>Helvetica</i> × <i>pubescens</i>)	5.—
» <i>imbricata</i> (blanc, feuill. argenté)	5.—
» <i>Pacheri</i> (rose vif)	5.—
» <i>pubescens</i> (blanc)	2.50
» <i>pyrenaica</i> (blanc, pelote serrée, rarissime)	5.—
» <i>vitaliana</i> (fl. jaune vif, mars-avril)	0.50
» <i>Wulfeniana</i> (rose vif)	1.50

Ce groupe est composé d'esp. extrêmement belles et essentiellement alpines; ce sont ces pelotes de fleurs qu'on rencontre sur les hauts rochers des Alpes et des Pyrénées. Leur culture n'est point facile. Il leur faut une fente de muraille ou de rocaille au levant ou au couchant, pas de terre (ou seulement un composé de cailloux et de sable si l'on veut les cult. en pots). Eviter la pourriture. *A. vitaliana* est de culture aisée et va dans tous les lieux ensoleillés. Elle anime le sol de ses fleurs jaune vif de mars en mai.

ANÉMONES

ANÉMONE, GROUPE *Hepatica*.

<i>Anemone angulosa</i>	0.50
» » <i>alba</i>	1.50
» » <i>grandiflora</i>	1.50
» » <i>rosea</i>	1.50
» <i>Hepatica</i>	0.50
» » (var. à fl. blanches, à fl. bleu clair, à fl. lilas rose, à fl. rose clair, à fl. rose foncé, à fl. bleu azur)	0.50
» » (var. fl. pl. rose)	1.—
» » (var. fl. pl. bleu foncé)	1.50

	Fr. Ct.
<i>Anemone transylvanica</i>	1.50
Bonnes pl. à bordures ou pour émailler les tail- lis; ombre ou soleil; fleur. mars-avril.	

ANÉMONE, GROUPE *Pulsatilla*.

» <i>albana</i> (fl. lilas)	1.—
» <i>alpina</i> (fl. blanches)	1.50
» <i>amoena</i>	2.50
» <i>Halleri</i> (violet et or)	1.50
» <i>montana</i> (violet foncé et or).	1.50
» <i>patens</i> (lilas et jaune).	1.—
» (à fl. jaunes)	2.50
» <i>pratensis</i> (violet foncé)	1.—
» <i>var. nigricans</i>	1.50
» <i>propera</i>	2.50
» <i>Pulsatilla</i> (lilas, violet et or).	0.50
» (à fl. blanches)	2.50
» <i>Regeliana</i>	2.50
» <i>rubra</i> (rouge grenat et or)	1.—
» <i>sulfurea</i> (jaune soufre)	1.50
» <i>vernalis</i> (couleur opale)	0.50

Ce groupe renferme de fort belles pl., qui fleur.
en mars-avril; sol riche en humus et soleil.

ANÉMONE, GROUPE *Homolocarpus*.

» <i>narcissiflora</i> (rose et blanc)	0.50
» <i>polyanthes</i> (rose pâle).	2.50

Fleurs en bouquets, mai-juin, mi-soleil.

ANÉMONE, GROUPE *Anemananthea*.

» <i>altaica</i>	2.50
» <i>apennina</i> (bleu lilas)	0.50
» (à fl. blanches)	0.50
» <i>Baïkalense</i> (rose clair)	1.—
» <i>Baldensis</i> (blanc rosé).	0.50
» <i>blanda</i> (bleu)	0.50
» <i>caucasica</i>	2.50
» <i>dichotoma</i> (blanc pur)	0.50
» <i>intermedia</i> (jaune pâle).	5.—
» <i>nemorosa</i> , la sylvie des bois	0.50
» à fl. rose carmin	1.—
» <i>monstrosa</i> à fl. plein	1.—
» (à fl. doubles)	1.—
» <i>pensylvanica</i> , v. <i>dichotoma</i>	
» <i>ranunculoides</i> (jaune vif)	0.50
» <i>Robinsoniana</i> (lilas bleuâtre).	1.—
» <i>sylvestris</i> (blanc, rose extér.).	0.50
» <i>major</i>	0.50
» <i>trifoliata</i> (blanc pur)	0.50

Ces esp. réussissent bien sous bois, dans les ro-
cailles ou les plates-bandes; il leur faut le mi-
soleil ou l'ombre. Elles fleurissent de mars en
juin. *A. sylvestris*, aux grandes cloches blan-
ches qui rappellent *A. alpina*, est une pl. très
robuste et envahissante, qui fleurit longtemps
et souvent recommence à l'automne. *A. Bal-*
densis veut la rocaille et un sol pierreux.

ANÉMONE, GROUPE *Anemonospermus*.

» <i>canadensis</i>	1.50
-------------------------------	------

	Fr. Ct.
<i>Anemone caroliniana</i>	1.50
» <i>globosa</i>	0.50
» <i>magellanica</i>	0.50
» <i>multifida</i>	0.50

Fl. blanches, parfois teintées de rose à l'exté-
rieur, fleurissant l'été et demandant un sol lé-
ger et la mi-ombre.

ANÉMONE, GROUPE *Eriocephalus*.

» <i>rivularis</i>	0.50
» <i>coronaria</i> (A. du Midi)	0.50
» <i>fulgens</i> (A. écarlate)	0.50
» <i>palmata</i> (A. dorée)	1.50
» <i>stellata</i> (A. des jardins).	0.50

Ce sont les anémones du Midi, à tubercules et
aux fleurs brillantes.

<i>Anemonopsis macrophylla</i>	2.50
<i>Angelica pyrenaica</i>	1.50
<i>Anomatheca cruenta</i>	1.50
<i>Antennaria alpina</i>	0.50
» <i>carpathica</i>	0.50
» <i>dioica</i> . <i>Immortelle rose ou blanche</i> <i>des Alpes</i>	0.50
» <i>monocephala</i>	0.50
» <i>plantaginea</i>	0.50
» <i>triplinervis</i>	0.50

Composées touffues et gazonnantes, aux f. ar-
gentées soyeuses, dont on fait grand usage
pour l'ornementation des *mosaïcultures* ou des
plates-bandes; l'*A. dioica*, dont les fleurs se
conservent à l'infini, est très appréciée des
amateurs de jolies plantes et fait très bien
dans les rocailles, en plein soleil; fleurit en
mai-juin.

<i>Anthemis Biebersteiniana</i> (à fl. jaune).	1.—
» <i>carpathica</i> (<i>A. kitaibelii</i>)	0.50
» <i>cinerea</i> (fl. blanches)	0.50
» <i>montana</i> (belle marguer. simple)	0.50
» <i>nobilis</i> (camomille rom. vraie)	0.50
» <i>rigescens</i> (fl. jaune paille).	0.50
» <i>tinctoria</i> (fl. jaune vif)	0.50

Ce sont des sortes de camomilles à grandes fleurs
blanches ou jaunes, à feuillage finement di-
visé; soleil.

<i>Anthericum Liliago</i>	0.50
» <i>racemosum</i> , le petit lis blanc des rochers	0.50

Ce sont des Liliacées à fl. blanches très nom-
breuses chez *ramosum*, qui est très recom-
mandable; soleil.

<i>Anthyllis montana</i>	0.50
------------------------------------	------

Très belle papillon. à feuil. grisâtre, à fl. rose
vif, très odorantes, fleurissant de mai en oc-
tobre et s'étalant en touffes plates et orne-
mentales; roc. ou pl. terre, soleil.

<i>Antirrhinum asarina</i>	1.50
» <i>glutinosum</i>	0.50
» <i>sempervirens</i>	1.50
» <i>siculum</i>	1.50

Mufliers ou gueule-de-loup alpines ou murales,
des Pyrénées ou des mont. d'Espagne et de

	Fr. Ct.
Sicile; fl. jaune pâle ou blanc jaunâtre, nombreuses; <i>A. glutinosum</i> , fait l'ornement des rochers et des vieux murs au plein soleil.	
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> , <i>Jonc bleu du Midi</i>	1.50
<i>Apios tuberosa</i>	1.—
<i>Aposeris foetida</i> . <i>Hyoseris foetida</i>	0.50

ANCOLIES. — COLUMBINES

<i>Aquilegia alpina</i>	1.50
» <i>arctica</i> (rouge, vert et jaune)	2.50
» <i>atropurpurea</i> (rouge, sombre)	0.50
» <i>Bertoloni</i> (bleu pur, gracieuse)	1.50
» <i>californica</i> (rouge verm. et jaune)	1.—
» <i>canadensis</i> (rouge cinab. et jaune)	0.50
» <i>chrysantha</i> (jaune clair; longs épis)	0.50
» <i>cœrulea</i> (bleu d'azur et blanc)	0.50
» <i>flabellata</i> (très précoce; blanc pur; nain)	0.50
» <i>glandulosa</i> (bleu pur et blanc)	2.50
» <i>jucunda</i> (rose pâle)	0.50
» <i>hybrida</i> , v. pl. vivaces.	
» <i>longicalcarata</i> (bleu et blanc; nain)	1.—
» <i>nivea</i> (blanc pur)	0.50
» <i>oxysepala</i> (bleu et jaune; nain et précoce)	1.—
» <i>pyrenaica</i> (bleu; nain)	0.50
» <i>Skinneri</i> (rouge vif et or)	0.50
» <i>Stuartii</i> (grande fl. bleu céleste)	2.50
» <i>truncata</i> (rouge vif et or)	1.50
» <i>viridiflora</i> (presque noir; odor.)	2.50
» <i>vulgaris</i> (bleu)	0.50

Les Ancolies sont d'entre les meill. pl. du printemps; cult. facile; mi-ombre ou sous bois, rocaille, pl. terre, même au soleil. Les *A. alpina*, *Bertoloni*, *cœrulea*, *lactiflora*, *pyrenaica*, *thalictrifolia* et *transylvanica*, plus délicates, exigent la rocaille ou milieu frais, mi-ombre, un sol poreux et bien drainé. Toutes fleurissent abondamment et sont très grac. et ornementales. (Voir *Pl. vivaces*.)

<i>Arabis albida</i> . <i>Corbeille d'argent</i>	0.50
» <i>alpina</i>	0.50
» » à feuilles panachées	0.50
» » <i>grandiflora</i>	1.—
» <i>androsacea</i>	0.50
» <i>arenosa</i> (à fl. roses)	0.50
» <i>aubrietoides</i> (fl. lilas)	0.50
» <i>bellidifolia</i>	0.50
» <i>Billiardieri</i>	1.50
» <i>bryoides</i>	0.50
» <i>caucasica</i>	0.50
» <i>ciliata</i>	0.50
» <i>cœrulea</i> (fl. bleu rosé)	1.—
» <i>Drummondii</i>	1.—
» <i>Ferdinand-Coburgi</i>	1.—
» <i>Halleri</i> (rose clair)	0.50
» <i>Holboellii</i>	1.—
» <i>procurrens</i>	0.50
» <i>purpurascens</i>	0.50
» <i>rosea</i> (rose)	0.50

	Fr. Ct.
<i>Arabis scopoliana</i>	0.50
» <i>Soyeri</i>	0.50
» <i>Vochinensis</i>	0.50

Petites crucifères souvent trainantes, à fl. généralement blanches, précoces et recherchant la rocaille et le soleil.

<i>Archangelica officinalis</i>	0.50
<i>Arctostaphylos alpina</i> (Sprgl.) <i>Arbousier des Alpes</i>	2.50
» <i>nevadensis</i>	2.50
» <i>Uva Ursi</i> . <i>Raisin d'ours</i>	1.50

Arbustes rampants, le premier à f. caduques, rougissant l'automne, et à baies d'un noir de jais, le second à feuil. persistantes, d'un beau vert et à fr. rouges.

<i>Arenaria Arduini</i>	0.50
» <i>armeriastum</i>	0.50
» <i>balearica</i>	0.50
» <i>Bauhinorum</i>	0.50
» <i>cæspitosa</i>	0.50
» <i>cephalotes</i>	0.50
» <i>cerastiifolia</i>	0.50
» <i>ciliata</i>	0.50
» <i>Gerardi</i>	0.50
» <i>gracilis</i>	0.50
» <i>graminifolia</i>	0.50
» <i>grandiflora</i>	0.50
» <i>gypsophiloides</i>	0.50
» <i>hirta</i>	0.50
» <i>imbricata</i>	0.50
» <i>juniperina</i>	1.—
» <i>kotschyana</i>	0.50
» <i>lanceolata</i>	0.50
» <i>laricifolia</i>	0.50
» <i>Ledebouriana</i>	0.50
» <i>liniflora</i>	0.50
» <i>longifolia</i>	0.50
» <i>montana</i>	0.50
» <i>nardiflora</i>	0.50
» <i>norvegica</i>	0.50
» <i>pinifolia</i>	0.50
» <i>pungens</i>	0.50
» <i>purpurascens</i>	0.50
» <i>recurva</i>	0.50
» <i>rigida</i>	0.50
» <i>Rosani</i>	0.50
» <i>rotundifolia</i>	0.50
» <i>rupestris</i>	0.50
» <i>Sajanensis</i>	0.50
» <i>steveniana</i>	0.50
» <i>tetraquetra</i>	0.50
» <i>verna</i>	0.50
» <i>Villarsii</i>	0.50

Les *Arenaria* ou *Alsine* sont de petites pl. gazonnantes, tapissant le sol et reproduisant une infinité de fleurs blanches (roses chez *purpurascens*); on les nomme parfois *mousse fleurie*; mai-juillet, soleil.

<i>Aristolochia clematitis</i>	0.50
» <i>Pistolochia</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Armeria alpina</i>	0 50
» <i>cephalotes</i>	0 50
» » à fl. blanc pur	1. —
» <i>caespitosa</i>	2 50
» <i>majellensis</i>	0 50
» <i>maritima</i>	0 50
» <i>plantaginea</i>	0 50
» <i>vulgaris</i> , <i>Gazon d'Olympe</i>	0 50

Pl. basses et gazonn. à fl. rose plus ou moins vif en capitules serrés. Soleil : été.

<i>Arnebia echioides</i>	1 50
<i>Arnica Chamissonis</i>	0 50
» <i>montana</i>	1 50

Fleurs jaunes, en marguerites ; l'*A. montana*, *Arnica* des officines, est bien connu par ses grands capitules orangés. Il leur faut à tous un sol profond et meuble et, si possible (pour *A. montana* surtout), dépourvu de calcaire.

<i>Aronicum carpathicum</i>	2 50
» <i>scorpioides</i>	0 50
<i>Artemisia abrotanum</i>	0 50
† » <i>arborescens</i>	1 50
» <i>atrata</i>	1 50
† » <i>austriaca</i>	1 50
» <i>camphorata</i>	0 50
† » <i>canadensis</i>	0 50
» <i>chamæmelifolia</i>	0 50
1 X † » <i>coerulescens</i>	2 50
† » <i>discolor</i>	0 50
† » <i>frigida</i>	2 50
† » <i>glacialis</i>	1. —
» <i>gnaphalioides</i>	0 50
† » <i>granatensis</i>	0 50
† » <i>lanata</i>	0 50
† » <i>maritima</i>	1. —
† » <i>Mutellinum</i> , <i>faux Génipi</i>	0 50
» <i>nitida</i>	1. —
† » <i>rupestris</i>	0 50
1 — » <i>salsoloides</i>	2 50
» <i>sericea</i>	0 50
» <i>Sieversiana</i>	1 50
† » <i>splendens</i>	1 50
† » <i>Stelleriana</i>	0 50
» <i>suavis</i>	1 50
1 — † » <i>tridentata</i> (arbuste des déserts américains)	2 50
† » <i>Valesiaca</i> (à odeur très forte)	0 50
† » <i>Villarsii</i>	1 50

Les *Artemises* ou *Armoises*, sont de gracieuses composées fortement aromatiq., dont plusieurs très appréciées en pharmacie. Le vrai *Génipi* est la plus réputée ; mais sa cult. est difficile et son congénère *A. mutel.*, qui en diffère peu quant aux qualités et offre le même aspect, lui est généralement préféré dans les rocailles. Soleil ; sol sableux et caillout., profond, bien drainé. Le *Génipi* veut un sol dépourvu de calc., le soleil, la rocaille non calc.

Les esp. marquées d'un † ont le feuillage très fin, hautement décoratif et gris-d'argent ; soleil et sec.

	Fr. Ct.
<i>Asarum canadense</i>	0 50
» <i>caucasicum</i>	2 50
» <i>caudatum</i>	1 50
» <i>europæum</i>	0 50
» <i>virginicum</i>	1 50

Excellentes pour l'ombre ; beau feuillage ; plantes naines et touffues, propres à former un tapis de verdure dans les pentes des rocailles tournées au nord. L'*A. europæum* forme de très jolis sous-bois ; c'est l'une des meil. pl. d'ombre. Racines fortement aromatiques.

<i>Asparagus acutifolius</i>	2 50
» <i>tenuifolius</i> (charmante asperge des Alpes lombardes, au feuill. extrêmement fin et délicat)	1 50
» <i>verticillatus</i>	2 50

<i>Asperula athoa</i> , voir <i>suberosa</i>	
» <i>cynanchica</i>	0 50
» <i>hexaphylla</i>	0 50
» <i>hirta</i>	1 50
» <i>nitida</i>	0 50
» <i>odorata</i> (Waldmeister)	0 50
» <i>suberosa</i> (<i>A. Athoa</i>)	2 50
» <i>Taurina</i> (pl. d'ombre)	1. —

Jolies petites pl. de rochers ; l'*A. odorata* (Hépatique des bois ou Waldmeister) est recherchée pour le parfum qu'elle répand en séchant et comme pl. des bois ; excellente pour l'ombre ; fl. blanches ; mai-juin.

<i>Asphodelus pyrenaicus</i>	1. —
» <i>subalpinus</i>	1. —

Voir *Pl. vivaces*.

<i>Aster alpinus</i>	0 50
» » à fl. blanches	0 50
» » à fl. roses	1 50
» » v. <i>Baldensis</i>	1. —
» » v. <i>Himalayensis</i>	1. —
» » v. <i>speciosus</i>	0 50
» » v. <i>superbus</i>	1. —
» <i>amelloides</i> , riche floraison	0 50
» <i>amellus</i> , octobre-novembre	0 50
» <i>Bessarabicus</i> gr. fl. lilas	0 50
» <i>diplostephioides</i>	0 50

C'est le grand aster de nos alpes beaucoup plus grand et plus beau. Il nous vient de l'Himalaya.

» <i>Fremonti</i> , des Montagnes Roch.	0 50
» <i>Garibaldii</i>	2 50
» <i>graminifolius</i>	1 50
» <i>ibericus</i> (espèce superbe)	0 50
» <i>Ottomanicus</i>	2 50
» <i>Pattersoni</i>	2 50
» <i>Porteri</i> (petit, touffu, à fl. blanches)	0 50
» <i>Ptarmicoides</i>	1. —
» <i>pyrenæus</i> (rarissime et belle esp.)	2 50
» <i>ramosus</i>	1 50
» <i>sericeus</i>	1 50
» <i>Sikkimensis</i> , Himalaya	1 50
» <i>Thomsoni</i>	2 50

Marguerites violettes, lilas, blanches ou bleues, au cœur d'or ; soleil. Les *Aster alpinus*, *amellus* et *Bessar*, sont les plus solides et très florifères. (Voir *Pl. vivaces*.)

	Fr. Ct.
<i>Asterolynosyris Willmottiae</i>	1.50
<i>Astilbe Davidii</i> (très belle spirée à fl. roses en panicules dressés)	1.50
» <i>rivularis</i>	0.50

Les *Astilbe* aiment un sol frais et humide.

<i>Astragalus alopecuroides</i> rare et belle; fl. jaunes	1.50
» <i>alpinus. Phaca astragalina</i>	0.50
» <i>aristatus</i>	2.50
» <i>depressus</i>	1.50
» <i>maximus</i>	2.50
» <i>monspessulanus</i>	1.—
» <i>Onobrychis</i>	1.—
» <i>Narbonense</i>	2.50

Sol profond; soleil.

<i>Astrantia carinthiaca</i>	0.50
» <i>carniolica</i>	0.50
» <i>major, Etoile du Pâturage</i>	0.50
» » à fl. pourpres	1.—
» <i>minor</i>	0.50

L'*Etoile du pâturage* est bien connue de tous les amis de la montagne; ombre ou mi-ombre, mai-novembre, roc. ou pl. terre. Les autres espèces recherchent la fraîcheur et aiment les rocailles.

<i>Atalanthus (Lactuca) spinosus</i>	2.50
<i>Athamanthe cretensis</i>	0.50
» <i>Matthioli</i>	0.50
<i>Atragene alpina, Clématite bleue des Alpes</i>	1.—
» <i>alpina</i> , à fl. blanches	5.—
» <i>alpina</i> , à fl. roses	2.50
» <i>sibirica</i>	1.50
<i>Atraphaxis buxifolia</i>	1.50
» <i>lanceolata</i>	1.50
» <i>spinosa</i>	1.50

Petits arbustes de rocailles, trainant et garnissant rapidement le sol. Ils peuvent supporter les plus fortes sécheresses.

<i>Atropa Belladonna, Belladone</i>	0.50
» » à baies jaunes	0.50
<i>Aubrietia antilabani</i>	0.50
» <i>Columnæ</i>	0.50
» <i>croatica</i>	0.50
» <i>deltoidea</i>	0.50
» » <i>grandiflora</i>	0.50
» » <i>v. D. Mules</i>	0.50
» » <i>v. Moerneimi</i>	0.50
» » <i>v. Souv. W. Imgram</i>	0.50
» <i>Hendersonni</i>	0.50
» <i>Leichtlini</i>	0.50
» <i>libanotica</i>	0.50
» <i>Olympica</i>	0.50
» <i>Pinardi</i>	0.50
» <i>Tauricola</i>	0.50

Jolies petites crucifères aux innombrables fl. acaules, violettes, roses, lilas, etc., formant des touffes compactes recouvertes, de mars en juin, de fleurs. Soleil. Excellentes pour murs.

	Fr. Ct.
<i>Avena argentea</i>	0.50
<i>Azalea (Loiseleuria) procumbens</i>	2.50

Petite azalée des Hautes Alpes, où elle tapisse les rochers granitiques de ses innombrables fl. d'un rose intense; terre non calcaire, soleil.

Baccharis, v. *Arbustes*.

<i>Ballota spinosa</i>	2.50
<i>Banffia petraea</i>	2.50
<i>Baptisia australis</i>	1.—
» <i>exaltata</i>	1.—
» <i>minor</i>	1.—
» <i>tinctoria</i>	1.—

Pl. voisines des Lupins.

<i>Bellidiastrum Micheli, Grande Pâquerette</i>	0.50
<i>Bellis coerulescens</i>	2.50
» <i>sylvestris</i>	2.50
<i>Bellium belliioides</i>	0.50
» <i>crassifolium</i>	0.50

Minuscules Pâquerettes méditerran. formant des rosettes de feuilles d'où s'échappent de nombreuses fl. se succédant de mai en octobre. Soleil.

<i>Berardia subacaulis</i>	5 —
--------------------------------------	-----

Plante rarissime et fort curieuse des Hautes Alpes françaises.

Bergenia, v. *Saxifraga*.

<i>Berkheya purpurea</i>	1.50
<i>Berteroa incana</i>	0.50
<i>Betonica alopecuros</i>	0.50
» <i>grandiflora</i> , grandes fleurs violettes; Caucase	0.50
» <i>grandiflora. var. superba</i>	1.50
» <i>officinalis</i>	0.50

Labiées à fl. en thyrses ou en épis, corolles jaune clair, bleu lilas, roses ou blanches. Mi-soleil.

<i>Bigelovia albicaulis</i>	1.50
Belle comp. ornement. à fl. jaune d'or. Soleil.	

<i>Biscutella lævigata</i>	0.50
» <i>lucida</i>	1.50
<i>Blitum virgatum</i>	0.50

Très curieuse Chénopodiacée dont les graines, agglomérées en une pulpe rouge vif, ont l'aspect d'une énorme fraise ou d'une crête de coq. Soleil; pl. terre ou roc.

<i>Borago laxiflora</i>	1.50
» <i>orientalis</i>	0.50

La première est une délicieuse pl. corse, aux fl. d'un azur intense; la deuxième une grosse pl. vivace aux fl. azur et rose, en grands panicules apparaissant de février en juin; grand feuillage ornemental, très propre à garnir sous-bois ou lieux ombragés.

<i>Boykinia aconitifolia</i>	1.50
» <i>rotundifolia</i>	0.50
<i>Brassica repanda</i>	1.50
» <i>Richeri</i>	1.50

Deux pl. rares du Dauphiné.

	Fr. Ct.
<i>Brickelia grandiflora</i>	2.50
<i>Bruckenthalia spiculiflora</i>	2.50
<i>Bryanthus empetriformis</i>	2.50
<i>Bulbocodium vernum</i>	1.—
<i>Buphtalmum grandiflorum</i>	0.50
» <i>salicifolium</i>	0.50
» <i>speciosissimum</i> . <i>Telekia speciosissima</i>	2.50

Le vrai *B. speciosissimum*, aux feuilles parcheminées, aromatiques, aux beaux capitules d'or, est très rare dans les cultures. La pl. génér. vendue sous ce nom-là est le *B. speciosum*.

» <i>speciosum</i>	0.50
<i>Bupleurum fruticosum</i>	1.—

Arbuste à feuilles persistantes.

» <i>falcatum</i>	1.—
» <i>linearifolium</i>	0.50
» <i>longifolium</i>	0.50
» <i>ranunculoides</i>	0.50
» <i>stellatum</i>	0.50
<i>Cacalia hastata</i> . <i>Senecio sagittatus</i>	0.50
* <i>Calandrinia discolor</i>	2.50
» <i>grandiflora</i>	2.50
» <i>umbellata</i>	1.—
* <i>Calocephalus (Leucophyta) Browni</i>	2.50

Très jolie petite pl. au feuillage court et qu'on dirait d'argent, faisant un effet délicieux. Soleil.

<i>Caccinia glauca</i>	0.50
» <i>Rauwolfii</i>	1.50

Boraginées persanes, à tiges couchées, à feuilles rugueuses et bleuâtres, à fl. bleue et rose, en larges grappes; soleil; mai-août.

<i>Calamintha alpina</i>	0.50
» <i>grandiflora</i>	0.50
<i>Calceolaria polyrhiza</i>	2.50
<i>Callianthemum</i> (v. <i>Ranunculus</i>).	
<i>Callirhoë involucrata</i>	0.50
<i>Callixene poliphylla (Luxuriaga)</i>	2.50
<i>Calluna vulgaris. Bruyère commune</i>	1.—
<i>Caltha alpestris</i>	1.—
» <i>palustris Populage</i> ; fl. jaune-orangé vif	0.50

Fl. jaunes, grandes, décorat.; premier printemps; propres à animer les lieux frais, le bord des eaux, les places fraîches ou humides.

» » (à fleurs pleines)	1.—
» <i>leptosepala</i> (à fleurs blanches)	2.50
» <i>polysepala</i>	2.50
<i>Calypso borealis</i> (v. <i>Orchidées</i>).	
<i>Camassia esculenta</i>	0.50

CAMPANULES

I. — ESPÈCES PUREMENT ALPINES, BASSES OU TRAINANTES :

<i>Campanula acutangulare</i>	2.50
» <i>allionii</i> , grande cloche violette, penchée	2.50
» » à fl. blanc pur	5.—

	Fr. Ct.
<i>Campanula alpina</i>	2.50
» <i>argæi</i>	2.50
» <i>aucherii</i>	2.50
» <i>barbata</i>	0.50
» » à fleurs blanches	1.—
» <i>Baumgarteni</i>	0.50
» <i>Beauverdiana</i>	0.50
» <i>bellidifolia</i>	2.50
† » <i>cæspitosa</i> (nombreuses clochettes lilas clair)	0.50
» <i>carnica</i>	2.50
» <i>carpathica</i>	0.50
» » <i>alba</i>	0.50
» » <i>grandiflora</i>	1.50
» » var. <i>China Cup</i>	0.50
» » <i>Ditton blue</i>	1.50
» » var. <i>nana</i>	1.50
» » var. <i>Riverslea</i>	0.50
» <i>caucasica</i>	2.50
† » <i>cenisia</i>	1.50
» <i>collina</i>	0.50
» <i>crispa</i>	2.50
» <i>cristallocalyx</i>	1.50
† » <i>Elatines</i>	2.50
† » <i>Elatinoides</i>	2.50
† » <i>excisa</i>	2.50
† » <i>fragilis</i>	2.50
† » <i>garganica</i>	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » <i>hirsuta</i>	2.50
» <i>hederacea. Wahlenbergia hederac.</i>	1.—
» <i>imeritina</i>	2.50
* » <i>isophylla</i>	2.50
* » » <i>alba</i>	1.50
» <i>Kolenatiana</i>	2.50
» <i>lactiflora</i> (fl. lilas clair ou blanc.)	0.50
» <i>lanata</i>	2.50
» <i>libanotica</i>	2.50
» <i>longistyla</i>	1.—
* » <i>macrorrhiza</i> (du Midi)	2.50
† » <i>mirabilis</i>	2.50
† » <i>muralis. Portenschlagiana</i>	0.50
† » » <i>major</i>	2.50
» <i>nitida</i>	1.50
» <i>Parryi</i>	2.50
» <i>pelviformis</i> (lilas très clair; grande fleur)	1.50
† » <i>petræa</i> (fl. jaunes; très rare)	5.—
» <i>Portenschlagiana. v. muralis.</i>	
» <i>pseudo-carnica</i>	2.50
» <i>pseudo-Raineri</i>	2.50
» <i>pulloides</i>	2.50
» <i>pulla</i> (cloch. d'un violet noir; très nombr.)	0.50
† » <i>pusilla</i> (excell. espèce traînante; fl. lilas clair)	0.50
» <i>pusilla</i> à fl. blanches	0.50
» <i>Raddeana</i>	2.50

Très belle esp. basse et touffue, à placer dans les rochers.

† » <i>Raineri</i> vraie (très belle espèce des Alpes lombardes).	2.50
---------------------------------------------------------------------------	------

	Fr. Ct.
Campanula Raineri, var. N° I.	1. —
» » var. N° II	1. —
» Rhomboidalis	0 50
» » à fl. blanches	1 50
» rotundifolia	0 50
» » alba	0 50
» » à fl. pleines	2 50
» sarmatica	0 50
† » Saxifraga	1 50
» Scheuchzeri	0 50
» » à fl. blanches	2 50
» soldanellæflora	2 50
» speciosa (superbe espèce pyrénéenne).	2 50
» stenocodon (rare espèce piémontaise)	2 50
» Steveni	1. —
» thyrsoidea (à fl. jaunes, odorantes)	0 50
» Tommasiniana	2 50
✕ » trachiphylla	5. —
» trichopoda	2 50
† » tridentata	1. —
» turbinata	0 50
» » à fl. blanches	0 50
» tyroliensis	1. —
» Valdensis	1. —
» van Houttei	1. —
† » Vanneri	1. —
† » Velutina	2 50
» Waldsteiniana	2 50
» Wilsoni	1. —
† » Zoyzii	2 50

Les espèces marquées d'une † sont murales ou essentiellement saxatiles; elles exigent le rocher ou la muraille et veulent être plantées horizontalement. Elles aiment le soleil. Les *C. Allioni*, *cenisia*, *excisa* et *speciosa* croissent naturellement dans les pierriers, les moraines ou les éboulis terreux exposés au soleil. Il leur faut très peu de nourriture, un sol sableux, caillouteux et profond. Le vrai *C. Raineri* est rarement cultivé, car ce qu'on vend le plus souvent sous son nom, c'est le *C. turbinata*. Le *C. Raineri* hante les fissures des rochers dolomitiques très ensoleillés des Alpes lombardes-vénitiennes; sa belle large fl. lilas est une décoration superbe pour les rochers. Il lui faut le mur ou la fente d'un rocher en plein soleil. Les *C. Garganica* et *muralis* font merveille dans les rochers comme en pl. terre et le second supporte la mi-ombre et même l'ombre, fleurissant de juin en octobre souvent. Les espèces qui poussent les plus fortes touffes sont les *cæspitosa*, *carpathica*, *collina*, *Hostii*, *muralis*, *pelviformis*, *pulla*, *pusilla*, *rotundifolia*, *sarmatica*, *Scheuchzeri*, *turbinata*, *tyroliensis* et *Valdensis*; elles sont de culture facile et fleurissent beaucoup.

Toutes ces *Campanula* alpines et saxatiles sont riches de couleur et abondantes de floraison.

II. — CAMPANULES MONTAGNARDES, DES RÉGIONS INFÉRIEURES OU DES BOIS, PROPRES À ORNER LA PLEINE TERRE OU LES GRANDES ROCAILLES.

<i>C. Abietina</i>	1. —
» <i>Alliariaefolia</i> (gr. fl. blanc. penchées)	0 50

	Fr. Ct.
<i>Campanula amabilis</i>	1. —
» <i>dahurica</i>	1 50
» <i>elegans</i>	0 50
» <i>eriocarpa</i> (très belles et grandes fl. lilas)	0 50
» <i>Fergusonii</i>	1 50
» <i>glomerata</i> (violet foncé)	0 50
» » à fl. blanches	1 50
» » à fl. azurées	1 50
» » <i>nana</i>	1 50
✱ » <i>Haylodgensis</i>	1 50
» <i>Hendersonii</i>	1 50
» <i>lamiifolia</i> , voisin d' <i>Alliariaef.</i>	0 50
» <i>latifolia</i>	0 50
» » à fl. blanches	0 50
» <i>latiloba</i> (<i>grandis</i>)	0 50
» <i>longistyla</i>	1 50
» <i>macrantha</i> (grandes fl. bleu lilas)	0 50
» <i>Mœrheimii</i> (superbe var. à fl. blanc pur et pleines)	1. —
» <i>nobilis</i> (grandes fl. blanches)	0 50
» <i>persicifolia</i> (gr. cloch. bleu lilas)	0 50
» » à fl. blanches	0 50
» <i>phytidocalyx</i>	1 50
» <i>primulaefolia</i>	1 50
» <i>punctata</i> (grandes fleurs ponctuées de noir)	0 50
» <i>pyramidalis</i>	0 50
» » à fl. blanches	1. —
» <i>Rapunculoides</i>	0 50
» <i>sibirica</i>	0 50
» <i>subpyrenaica</i>	0 50
» <i>Trachelium</i>	0 50
» » à fl. pleines	1 50
» » à fl. blanches	1 50
» <i>urticifolia</i>	0 50
» <i>versicolor</i>	1 50

Les espèces les plus robustes et élevées sont : *Alliariaefolia*, *eriocarpa*, *lamiifol.*, *latif.*, *latiloba*, *macrantha*, *rapunculoides* et *trachelium*. Le *C. pyramidalis* et sa variété à fleur blanches, sont des pl. hautement décoratives et qui portent, en de longs épis dressés, des myriades de fleurs lilas clair ou blanc pur : hauteur 1 à 1 m. 1/2 suivant la cult.; fleurit de juillet en novembre, soleil, pleine terre, vieux murs, rochers, talus ensoleillés, graviers, etc.

<i>Camphorosma monspeliaca</i>	2 50
<i>Capparis spinosa</i> (Câprier)	2 50
<i>Cardamine asarifolia</i>	0 50
» <i>alpina</i>	1. —
» <i>chenopodifolia</i>	1. —
» <i>glauca</i>	2 50 —/
» <i>macrophylla</i>	0 50
» <i>pratensis</i>	0 50
» » à fl. doubles	1. —
» <i>savensis</i>	2 50 —/
» <i>trifolia</i>	0 50
<i>Carduus defloratus</i> . <i>Chardon carmin</i>	0 50
» <i>nutans</i>	0 50
» <i>Personata</i>	0 50

	Fr. Ct.
<i>Carex alba</i> (la douzaine 4 fr.)	0 50
Propre à former des tapis gazonneux dans les lieux secs et arides, sous les arbres, dans les bois, etc.	
» <i>Baldensis</i> . Très jolie graminée à épis blanc de neige; l'espèce la plus décorative du genre	1. —
» <i>Buchanani</i> , à verdure brune	1. —
» <i>Grayi</i>	1. —
» <i>stricta</i>	0 50
<i>Carlina acanthifolia</i>	2 50
» <i>acaulis</i>	0 50

Le grand Chardon d'argent anime à l'automne les pâturages alp. et subalp. de ses grands capitules bordés de ligules blanches et luisantes, scarieuses, ce qui fait que la fleur peut être conservée par les bouquets d'hiver; fleurit abondamment d. les roc. au soleil ou en pl. terre. Sol profond; soleil.

<i>Cassiope tetragona</i> . (<i>Andromeda tetr.</i>)	2 50
<i>Catananche cœrulea</i>	0 50
<i>Caulophyllum thalictroides</i>	2 50
* <i>Cedronella triphylla</i>	2 50
<i>Centaurea alpina</i> (à fl. jaune paille)	2 50
» <i>axillaris</i>	0 50
» <i>carniolica</i>	1 —
» <i>dealbata</i>	0 50
» <i>Lugdunensis</i>	1 50
» <i>montana</i> . Grand bluet vivace des montagnes	0 50
» » à fl. blanches	1. —
» » à fl. jaunâtres	1 50
» » à fl. roses	1 50
» <i>nervosa</i>	0 50
» <i>orientalis</i> . (Belles fl. jaunes)	0 50
» <i>pannonica</i>	1. —
» <i>phrygia</i>	0 50
» <i>præalta</i> (pourpre foncé)	0 50
» <i>rhaenana</i>	1. —
» <i>ruthenica</i> (fl. jaune paille)	1 50
» <i>rutifolia</i>	0 50
» <i>uniflora</i>	1. —

Bonnes pl. rustiques et solides, très florifères; les très grandes esp. figurent parmi les *Plantes vivaces*.

<i>Centranthus angustifolius</i>	1. —
» <i>ruber</i>	0 50

Le *Centranthus ruber* (valériane des murs) est l'une des meilleures pl. murales. On en possède de trois couleurs (rouge très vif, rose et blanc) et il fait merveille sur les rochers arides, dans les vieux murs, sur les talus pierreux, au grand soleil.

<i>Cephalaria alpina</i>	0 50
» <i>leucantha</i>	0 50

Grande Scabiense jaune d'ocre, à formes architecturales, croissant à l'ombre ou au sol., excellente pour les grands rochers ou les lieux pittoresques. Juillet-Septembre.

	Fr. Ct.
<i>Cerastium album</i>	0 50
» <i>Boissieri</i>	0 50
» <i>glaciale</i>	1. —
» <i>grandiflorum</i>	0 50
» <i>lanatum</i>	0 50
» <i>illyricum</i>	0 50
» <i>lineare</i> (très rare et belle espèce)	2 50
» <i>purpurascens</i>	0 50
» <i>strictum</i>	0 50
» <i>tomentosum</i>	0 50
» <i>villosum</i>	0 50

P. rampantes, à feuillage grisâtre, souvent argenté, à très nombreuses fleurs blanches, en étoiles; mai-juillet.

<i>Cerintho alpina</i> (feuillage glauque)	0 50
* <i>Chænostoma floribunda</i>	1 50
<i>Chamælyrion carolinianum</i>	2 50
<i>Chamæpence Casabone</i>	0 50
» <i>diacantha</i>	0 50
<i>Cheiranthus allionii</i>	0 50
» <i>mutabilis</i>	1 50
» <i>versicolor</i>	1 50
<i>Chelidonium lasiocarpum</i>	2 50
<i>Chenopodium Bonus Henricus</i>	0 50
<i>Cherleria sedoides</i>	1. —
<i>Chicorium Intybus</i> (fl. bleu azur)	0 50
» » à fl. blanches	1. —
<i>Chionodoxa gigantea</i>	0 50
» <i>Luciliæ</i>	0 50
» <i>Sardensis</i>	0 50
* <i>Chironia floribunda</i>	2 50
<i>Chrysanthemum alpinum</i> . <i>Marguerite des Alpes</i>	0 50
» <i>arcticum</i>	2 50
» <i>coronopifolium</i>	0 50
» <i>lacustre</i>	0 50
» <i>maximum</i>	0 50
» <i>niponicum</i>	1 50
» <i>uliginosum</i>	0 50
» <i>Zawadskyi</i>	1 50

Chrysogonum virginianum, petits soleils bas, fl. jaune orangé vif; juin-octobre 1. —

<i>Chrysopsis foliosa</i>	0 50
» <i>villosa</i>	0 50

Petites composées à fl. grisâtres, à nombreux capitules jaunes; soleil.

<i>Chrysosplenium alternifolium</i> , <i>Dorine</i>	0 50
» <i>glaciale</i>	0 50
» <i>oppositifolium</i>	0 50

Saxifragées à fl. jaunes enveloppées de bractées, à feuillage vert gai et luisant, formant de larges touffes et propres à décorer les fissures fraîches et humides des rochers ombragés.

<i>Cimicifuga americana</i>	1 50
» <i>cordifolia</i>	1 50
» <i>foetida</i> , <i>Actæa foetida</i>	0 50
» <i>japonica</i>	1 50
» <i>racemosa</i> , <i>Actæa racemosa</i>	0 50

Fleurs blanches en grappes ou en épis, gracieuses; feuillage ornemental; ombre, sous bois, etc.

	Fr. Ct.
<i>Cineraria aurantiaca</i>	1.50
» <i>campestris</i>	1.50
<i>Circæa alpina</i>	0 50
» <i>cordata</i>	1.50
» <i>intermedia</i>	0.50

Plantes d'ombre et propres à garnir les sous-bois.

<i>Cirsium acaule</i> . <i>Chardon rose sans tige</i>	0.50
» <i>Eriophorum</i>	0.50
» <i>Erisithales</i> (jaune paille)	0.50
» <i>heterophyllum</i> (rose pourpre)	0.50
» <i>monspessulanus</i>	0.50
» <i>spinosissimum</i> . <i>Chardon du Saint-Bernard</i>	0 50

Les *Cirsium* ou *Cnicus* sont des chardons d'ornement très solides et florifères.

Cistus, voir *Arbustes*.

<i>Claytonia asarifolia</i>	2.50
» <i>parvifolia</i>	2.50
» <i>sibirica</i>	0.50
» <i>virginica</i>	2.50

Portulacées à fl. roses, propres à garnir les lieux frais et ombragés.

<i>Clematis alpina</i> , voir <i>Atragene</i> .	
<i>Cochlearia danica</i>	0.50
» <i>groenlandica</i>	0.50
» <i>saxatilis</i> . <i>Kerner saxatilis</i>	0.50
<i>Codonopsis ovata</i> . <i>Glossocomia clematidea</i>	0.50
» <i>Ussuriensis</i>	2.50
<i>Colchicum alpinum</i>	0.50
» <i>autumnale</i> (veilleuse)	0.50
» » (à fl. blanches)	0.50
» » (à fl. doubles)	0.50
» <i>Siebthorpi</i> . <i>Colch. géante</i>	1.50
» <i>speciosum</i>	1.—
» <i>variegatum</i>	0.50
<i>Coluria potentilloides</i>	0.50
<i>Coluteocarpus reticulatus</i>	1.50
<i>Convallaria majalis</i> . <i>Muguet</i>	0.50
» » <i>var. major</i>	0.50
» » <i>rosea</i>	0.50
» » <i>unvittata</i>	0.50

<i>Convolvulus althaeoides</i> . <i>Liseron rose vif du Midi</i>	2.50
» <i>cantabricus</i>	0.50
* » <i>cneorum</i>	2.50

Petit arbuste aux feuil. argentées, avec fl. blanc rosé.

» <i>Libanoticus</i>	2.50
» <i>lineatus</i>	2.50
* » <i>mauritanicus</i>	0.50
» <i>Soldanella</i>	2.50
» <i>Stans</i>	2.50
<i>Coptis trifoliata</i>	2.50
<i>Coreopsis rosea</i> (fl. roses)	1.50

Pour les autres *Coreopsis*, v. *Pl. vivaces*.

* <i>Coris monspeliensis</i>	2.50
<i>Cornus canadensis</i>	2.50
» <i>suecica</i>	2.50
<i>Coronilla cappadocica</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Coronilla glauca</i>	2.50
» <i>lotoides</i>	2.50
» <i>montana</i>	0.50
* » <i>Valentina</i>	2.50
» <i>varia</i>	0.50

Cette dernière est à fl. rose ou lilas et blanc, très jolie, mais la plante est envahissante; très propre à garnir les lieux stériles et ensoleillés.

<i>Corrigiola telephioides</i>	2 50
<i>Cortusa Matthioli</i>	0.50
» » <i>grandiflora</i>	1.50
» <i>pubens</i>	1.50
» <i>villosa</i>	2.50

Les *Cortuses*, gracieuses primulacées à fl. carmin, recherchent un sol dépourvu de calcaire et l'ombre.

<i>Corydalis angustifolia</i>	2.50
» <i>australis</i>	1.—
» <i>cava</i>	0.50
» <i>cheilanthifolia</i>	0.50
» <i>lutea</i>	0.50
» <i>nobilis</i>	1.50
» <i>ochroleuca</i> (jaune pâle)	0.50
» <i>ophiocarpa</i>	0.50
» <i>solida</i>	0.50
» <i>thalict trifolia</i>	1.50
» <i>tomentella</i>	2.50
» <i>tuberosa</i> (la douzaine 2 fr.)	0.50

Les *Corydales*, ou *Fumetères* vivaces, sont des pl. du premier printemps, tout au moins les espèces tubéreuses, qui recherchent l'ombre et les sous-bois. Le *C. lutea*, aux fl. d'un jaune brillant, fleurit d'avril en novembre. Planté dans un mur au soleil ou à l'ombre, il s'y propage rapidement. C'est l'une des plus gaies décorations qu'on puisse donner à une rocaille et à une muraille qu'on veut animer de fleurs. Il envahit rapidement, mais on tolère bien volontiers cet envahissement.

<i>Cotula dioica</i>	0.50
» <i>potentilloides</i>	1 50
» <i>squalida</i> . Pl. cespiteuse et rampante, à très gracieux feuillage de fougère	0.50
<i>Cotyledon (Umbilicus) aizoon</i>	0.50
» <i>chrysanthus</i>	0.50
* » <i>(Echeveria) amoenum</i>	0.50
» <i>(Umbil.) ciliolata</i>	2.50
» » <i>globulariæfolia</i>	2.50
» » <i>oppositifolia</i>	2.50
» » <i>platyphilla</i>	2.50
» » <i>Sempervivum</i> (rouge vermillon).	2.50
» » <i>spinosa</i> , très jolie rosette épineuse	1.—

Pl. voisines des *Sempervivum*, à rosettes fermes et serrées, formant de gracieuses touffes qu'on place en plein soleil.

* <i>Cousinia Thomsoni</i> (beau Chardon de l'Himalaya)	1.—
<i>Crambe</i> , voir <i>Pl. vivaces</i> .	

	Fr. Ct.
* <i>Crassula lycopodioides</i>	2.50
<i>Crepis aurea</i> (fl. brune)	0.50
» <i>pygmæa</i>	1.—
» <i>Terglouensis</i>	0.50
<i>Crinum longifolium</i>	2.50
» <i>Powellii</i>	2.50
Lis rose très ornemental; culture facile; soleil, et, si possible, un abri léger. Il est superbe à Floraire, au pied d'un mur en plein air.	
<i>Crucianella stylosa</i>	0.50
» » var. carmin vif	1.—
<i>Crythmum maritimum</i>	0.50
<i>Cyananthus lobatus</i>	2.50

CROCUS

I. A FLORAISON PRINTANIÈRE :

<i>Crocus aureus</i>	0.50
» <i>biflorus</i>	0.50
» <i>candidus</i>	0.50
» <i>chrysanthus</i>	0.50
» <i>Imperati</i>	0.50
» <i>versicolor</i>	0.50
» <i>vernus</i>	0.50

II. A FLORAISON AUTOMNALE :

» <i>iridiflorus</i>	0.50
» <i>longiflorus</i>	0.50
» <i>sativus</i>	0.50
» <i>speciosus</i>	0.50

A parsemer dans les pelouses. Le *C. vernus* est la première fl. qui apparaît dans nos Alpes à la fonte des neiges; il en est de lilas et de blancs.

CYCLAMEN

I. A FLORAISON PRINTANIÈRE :

<i>Cyclamen Coum.</i> (janvier-mars)	1.50
» » à fl. blanches	1.50
» <i>ibericum</i>	1.50
» <i>libanoticum</i>	2.50
» <i>repandum</i> . <i>C. vernum</i>	1.—

II. A. FLORAISON AUTOMNALE :

»	<i>cilicium</i>	2.50
»	<i>europæum</i> . <i>Violette des Alpes</i>	0.50
	La douzaine	2.—
»	» à fleurs blanches	2.50
»	<i>græcum</i>	1.50
»	<i>hederæfolium</i> . v. <i>neapolitanum</i>	1.50
»	<i>macrophyllum</i>	1.50
»	<i>neapolitanum</i> (La douz. 3.—)	0.50
»	» à fleurs blanches	1.—
	<i>Cynanchum acutum</i>	1.—
	<i>Cypripedium</i> . v. <i>Orchidées</i> .	
	<i>Cytisus</i> . v. <i>Arbustes</i> .	
	<i>Dalibarda repens</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Daphne alpina</i>	2.50
» <i>altaica</i>	2.50
» <i>atropurpurea</i>	5.—
X » <i>arbuscula</i>	5.—
» <i>Blagayana</i>	1.50
» <i>buxifolia</i>	5.—
» <i>caucasica</i> (<i>salicifolia</i>)	2.50
» <i>cneorum</i>	1.50
X » <i>albiflorum</i> (à fl. blanc pur)	10.—
» » major	5.—
» » fol. var.	5.—
» <i>collina</i> (<i>Fioniana</i> ou <i>Mazelli</i>)	2.50
» <i>Genkwa</i>	5.—
X » <i>Gnidium</i>	5.—
» <i>hybrida</i> (<i>Dauphini</i> ou <i>Delphini</i> ; voir Bot. Reg. pl. 1177).	2.50
» <i>japonica</i>	2.50
» <i>Laureola</i>	2.50
» <i>Mezereum</i>	1.50
» » <i>album</i>	2.50
» » <i>alpinum</i>	2.50
» <i>odora</i>	2.50
» » <i>alba</i>	5.—
» » <i>marginata</i>	2.50
» <i>oleoides</i>	5.—
» <i>Philippi</i>	5.—
» <i>Pontica</i>	5.—
» <i>Pseudo-Mezereum</i>	5.—
X » <i>rupestris</i> (<i>petræa</i>)	2.50
X » <i>Sophia</i>	5.—

Jolis pieds greffés ou élevés de boutures. Cette plante superbe et si rare dans les jardins, se cultive dans les pentes des vieux murs ou des rochers, ou bien encore dans les plates-bandes au sec et au mi-soleil.

» <i>striata</i>	2.50
» <i>verloti</i>	5.—
<i>Dattisca cannabina</i>	2.50
<i>Delphinium albescens</i>	2.50
» <i>cachemirianum</i>	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>Brunonianum</i>	1.50
» <i>caucasium</i>	1.—
» <i>elatum</i> . <i>Pied d'alouette des Alpes</i>	0.50
» <i>grandiflorum</i> (Le plus beau bleu imaginable)	0.50
» <i>nudicaule</i>	1.—
» <i>occidentale</i>	1.50
» <i>sulfureum</i> (<i>Zalil.</i>) (jaune clair)	1.—
» <i>Tatzenense</i> (bleu d'indigo)	0.50
» <i>Tyrolense</i>	1.—
» <i>triste</i> (d'un gris noir)	1.—
» <i>volubile</i>	1.—
» <i>Wilsoni</i>	1.—

Les pieds d'alouettes ou dauphinelles des montagnes sont de belles pl. vivaces propres à décorer les plates-bandes, le bord des massifs d'arbres, les grands rochers; le *D. elatum* recherche l'ombre ou le mi-sol., tandis que le superbe *grandiflorum* veut le soleil. Pour les autres esp. ou variétés, voir *Pl. vivaces*.

	Fr. Ct.
Dentaria (<i>Cardamine</i>) bulbifera	0.50
» digitata	0.50
» diphylla	2.50
» enneaphyllos	1.—
» glandulosa	2.50
» intermedia	2.50
» laciniata	2.50
» pentaphyllos	2.50
» pinnata	0.50
» polyphylla	1.—

Belles crucifères aux grandes fl. lilas, blanches, rose clair ou jaunâtre, croiss. sous bois.

DIANTHUS (œillets).

I. ESPÈCES MONTAGNARDES OU ALPINES, NAINES ET CESPITEUSES :

Dianthus acaulis	2.50
» alpestris (très parfumé; rose clair)	0.50
» alpinus (rose très vif, pl. très basse)	1.—
» » albus	2.50
» arenarius	0.50
» atrorubens	1.50
» attenuatus	0.50
» bicolor	0.50
» brevicaulis	2.50
» caesioides	0.50
» calalpinus	2.50
† » callizonus	2.50
» campestris	0.50
» crinitus	2.50
» deltoïdes. Excellent pour tapisser rochers ou former bordures	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » » superbes	1.—
» fragrans (très parfumé)	0.50
† » Freynii	2.50
» frigidus	2.50
» furcatus	1.—
» gallicus	0.50

Esp. rare et très flor. et délicieusement parfumée.

» gelidus	2.50
† » glacialis	1.—
» » var. nivalis	2.50
† » granaticus	2.50
» Hoelzeri (superbe espèce)	1.50
» hungaricus (très parfumé)	0.50
» integer	1.50
» Lereschii (du Canavese)	2.50
» Libanotis	2.50
» microlepis	2.50
» monspessulanus (fl. élégante, lilas parfumée; août-sept.)	0.50
» montanus	0.50
» nanus	2.50
» neglectus. <i>Œillet bleu du Dauphiné</i>	1.—

Brillante espèce alpine à floraison prolongée.

» » var. grandiflorus	2.50
» » var. nanus	2.50
† » nitidus	2.50

	Fr. Ct.
Dianthus orbiculus	2.50
» petræus	0.50
» Plumarius (très parfumé, florifère, envahissant rapidement et propre à garnir les talus arides, les lieux secs et au soleil; mai-octobre)	0.50
» polycladus	1.50
» pyridicola (de Grèce)	2.50
» speciosus, voisin du superbus	0.50
» spinosus	2.50

L'œillet épineux des montagnes de Perse, est l'une des plus rare pl. de l'Orient.

» squarrosus	0.50
» suavis	0.50
† » subacaulis, très nain	1.—
» superbus (élégant et parfumé)	0.50
» » grandiflorus	0.50
» sylvestris	0.50
» Wimmeri, voisin du superbus	0.50
» Zonatus	0.50

Les esp. marquées d'une † sont les plus délicates et exigent une niche ensoleillée et bien drainée et un sol maigre et pierreux. Les autres vont en pl. terre comme dans la roc., au soleil ou au demi-sol. Tous fleurissent abondamment, de mai-juin en automne

II. ESPÈCES MONT. OU DES PLAINES ET ROCHERS, DONT LES TIGES SONT NON COUCHÉES ET QUI FORMENT DES TOUFFES DRESSÉES :

» ambiguus	0.50
» aridus (à fl. jaune clair)	1.—
» Armeria (peut croître sous bois, à l'ombre).	0.50
» Balbisii	0.50
» Bannaticus	0.50
» barbatus. <i>Œillet des portes</i>	0.50
» calocephalus	0.50
» capitatus	0.50
» Carthusianorum, rose très vif	0.50
» Cariophyllus	0.50
» carpathicus	1.—
» ciliatus	2.50
» controversus	0.50
» cruentus, rouge vermillon ardent; l'un des meilleurs	0.50
» fimbriatus	1.50
» giganteiformis	0.50
» giganteus	0.50
» pallens	0.50
» pinifolius	0.50
» Pontederæ	0.50
» Seguieri	0.50
» strictus	1.—
» sylvestris	0.50
» vaginatus	0.50
» versicolor	0.50

Ces œillets sont tous très florifères et préfèrent le soleil à l'ombre, un sol plutôt léger; juin-octobre.

	Fr. Ct.
<i>Dianthus semperflorens</i> (à fl. carmin vif).	1. —
» var. à fl. pleines, bigarrées de blanc et de carmin	1.50

Ces deux œillets de jardin ont une très grande valeur décorative.

<i>Dicentra cucullaria</i>	1.50
» <i>eximia</i>	0.50

Pl. d'ombre ou demi-ombre; *D. eximia* est un petit *Diclytra* à fl. carmin vif, très décoratives, gracieuses, qui fleurit abondamment d'avril à novembre.

» <i>formosa</i>	1.50
* <i>Dichondra repens</i>	2 50
<i>Diclythra spectabilis</i>	0.50
<i>Dictamnus</i> , v. <i>Pl. vivaces</i> .	
<i>Digitalis ambigua</i> . <i>D. grandiflora</i>	0.50
» <i>ferruginea</i>	0.50
» <i>lanata</i>	0.50
» <i>lutea</i>	0.50
» <i>purpurea</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50

Le *D. ambigua*, à grandes fl. jaune d'ocre, est précieux pour les rochers (demi-ombre) et la pl. terre; le *lutea*, à petites fl. jaune paille très nombreuses, réussit n'importe où et fleurit tout l'été. Toutes les *Dig.* sont de cult. très facile.

<i>Dioscorea caucasica</i> . (Pl. grimpante aussi rare qu'élégante)	2.50
» <i>pyrenaica</i> (pieds mâl. et femell.)	2 50

Esp. petite et rarissime, à rameaux traînant sur le sol; ombre et demi-ombre.

<i>Diphylleia cymosa</i>	2.50
* <i>Diplacus</i> (<i>mimulus</i>) <i>glutinosus</i>	2.50
* <i>Diplopappus</i> (<i>Aster</i>) <i>filifolius</i>	2.50
<i>Dipsacus asper</i>	0.50
<i>Dodartia orientalis</i>	2.50
<i>Dodecatheon giganteum</i>	1.50
» <i>integrifolium</i>	0 50
» <i>Jeffrayi</i>	1. —
» <i>Mædia</i> . <i>Gyroselle</i> ou <i>Herbe aux douze dieux</i>	0.50
» » v. <i>pauciflora</i>	1.50
» » <i>splendens</i>	1.50

Primulacées dont les fl. ressemblent à celles des *Cyclamens*, très élégantes, rose carmin ou clair, parfois blanc pur; demi-ombre, sol profond et frais; mai-juin.

<i>Doronicum austriacum</i>	0.50
» <i>caucasicum</i>	0.50
» <i>Pardalianches</i> . <i>Mort aux Panthères</i>	0.50
» <i>plantagineum</i>	0.50
» <i>romanum</i>	2.50

Soleils jaunes, apparaissant au printemps et très propres à garnir les lieux frais et demi-ombrés; ce sont de belles marguerites or ou orange qui fleurissent avec abondance; le *D. caucasicum* fleurit en mars-avril. Pl. terre ou roc; cult. facile.

	Fr. Ct.
<i>Dorycnium herbaceum</i>	0.50
» <i>rectum</i>	2.50
» <i>suffruticosum</i>	0.50
<i>Douglasia cinerea</i>	2.50

DRABA

I. ESPÈCES À FLEURS JAUNES :

<i>Draba affinis</i>	0.50
† » <i>aizoides</i>	0.50
» » var. <i>grandiflora</i>	1. —
† » <i>aizoon</i>	0.50
† » <i>armata</i>	0.50
» <i>athoa</i>	2.50
» <i>aurea</i>	0.50
» <i>bruniaeifolia</i>	0.50
» <i>cappadocica</i>	2.50
» <i>chionaea</i>	2.50
» <i>corsica</i>	0.50
» <i>cuspidata</i>	0.50
» <i>dicranioides</i>	1.50
» <i>diversifolia</i>	0.50
» <i>Haynaldi</i>	0.50
† » <i>hispanica</i>	0.50
» <i>Hoppeana</i>	0.50
» <i>imbricata</i>	2.50
» <i>lasiocarpa</i> , v. <i>Aizoon</i>	
† » <i>olympica</i>	1. —
» <i>oxycarpa</i>	2.50
» <i>repens</i> ; (rampant, fl. jaune vif)	0.50
» <i>rigida</i> (petite pelote serrée ressemblant à l' <i>Androsace</i> Helvet.).	2.50
» <i>scabra</i> (belle espèce à feuilles de genévrier).	1. —
» <i>Traunsteineri</i>	0.50
» <i>tridentata</i>	0.50
» <i>vesicaria</i>	0.50
» <i>Zahlbrückneri</i>	0 50

Les esp. marquées d'une † sont plus spécialement murales et saxatiles.

II. ESPÈCES À FLEURS BLANCHES :

» <i>alpina</i> , de Scandinavie	0.50
» <i>altaica</i>	0.50
» <i>arabisans</i>	0.50
» <i>borealis</i>	0.50
» <i>bronchialis</i>	0.50
» <i>cadmaea</i>	1.50
» <i>carinthiaca</i>	0 50
» <i>chamæjasme</i>	0 50
» <i>ciliata</i>	0.50
» <i>consorta</i>	0.50
» <i>Dedeana</i>	0.50
» <i>dentata</i>	0.50
» <i>Fladnizensis</i>	0.50
» <i>frigida</i>	0.50
» <i>glacialis</i>	0.50
» <i>Gygas</i> (<i>Arabis carduchorum</i>)	0.50
» <i>hirta</i>	0.50
» <i>incana</i>	0.50
» <i>Johannis</i>	0.50

	Fr. Ct.
<i>Draba lactea</i>	0.50
» <i>lapponica</i>	0.50
» <i>laxa</i>	0.50
» <i>nivalis</i>	0.50
» <i>rupestris</i>	0.50
» <i>scandinavica</i>	0.50
» <i>stellata</i>	0.50
» <i>subamplexicaulis</i>	0.50
» <i>Thomasii</i>	0.50
» <i>tomentosa</i> (feuill. blanc d'argent)	1. —
» <i>Wahlenbergi</i>	0.50

Cette dernière esp. est murale et saxatile et préfère le calcaire.

III. ESPÈCE A FLEURS VIOLET OU LILAS ROSE :

» <i>pyrenaica. Petrocallis pyrenaica</i>	1.50
<i>Dracocephalum alpinum</i>	0.50
» <i>altaicum</i>	2.50
» <i>austriacum</i>	1. —
» <i>botryoides</i>	0.50
» <i>grandiflorum</i>	2.50
» <i>heterophyllum</i>	2.50
» <i>inberbe</i>	1.50
» <i>nutans</i>	0.50
» <i>peregrinum</i>	1. —
» » <i>album</i>	1.50
» <i>Ruprechtii</i>	0.50
» <i>Ruyschiana</i>	0.50
» » <i>var. japonicum</i>	1.50
» <i>speciosum</i>	2.50

Labiées à fl. bleues, ou blanches, basses, touffues, fleur. en mai-juillet-août; soleil.

<i>Dryas Drummondii</i>	1. —
» <i>lanata. D. nivea</i>	2.50
» <i>octopetala. Dryade ou thé suisse</i>	0.50
» <i>tenella</i>	2.50

Charmanes rosacées rampantes, à beau feuillage et à fl. d'églantines. Le *D. octopetala* est l'une des meil. pl. de rocaïles; elle tapisse les rocs ou le sol et étale au soleil ses rameaux frais et gracieux et sa belle églantine blanche au cœur d'or. Mai-juillet; refléurit souvent à l'automne.

<i>Drypis spinosa</i>	0.50
Pl. touffue et naine, épineuse et rampante, à fl. blanches.	
<i>Echeveria amœna</i>	1. —
<i>Echinops</i> , voir <i>Pl. vivaces</i> .	
<i>Echium petraeum</i> (<i>Moltkia petraea</i>)	1.50
» <i>rubrum</i>	1.50
<i>Edelweiss</i> , v. <i>Leontopodium alpinum</i> .	
<i>Edrayanthus</i> , v. <i>Hedraeanthus</i> .	
<i>Empetrum nigrum</i>	1.50
<i>Eomecon chionantha</i>	1.50
* <i>Ephedra altissima</i>	2.50
» <i>distachya</i>	2.50
» <i>helvetica</i> (les deux sexes)	1.50

Pl. murale et saxatile rare et de grande valeur ornementale. C'est une sorte de Prêle (*Equisetum*) appartenant aux Gnétacées, voisine

	Fr. Ct.
des conifères, et dont les fruits, une baie rouge corail, sont assez semblables à ceux de l'If; soleil.	
» <i>Sikkimensis</i>	2.50
<i>Epilobium abyssinicum</i> , grandes fl. carmin.	0.50
» <i>alpinum</i>	0.50
» <i>angustifolium</i>	0.50
Fl. rose et carmin très vif, en longs épis dressés; feuilles de saules; 1 m. à 2 m. de hauteur; mai-août; mi-ombre ou ombre.	
» <i>angustifolium</i> à fl. blanches	1.50
» <i>Dodonæi</i> (grandes fl. carmin et rose; soleil	0.50
» <i>Fleischeri</i> , v. <i>Dodonæi</i> .	
» <i>glabellum</i>	1.50
» <i>hirsutum</i>	0.50
» » à fleurs blanches	1. —
» <i>latifolium</i> , sup. pl. à très gr. fl. rose carmin; feuill. bleuâtres	1.50
» <i>linnæoides</i> (à feuill. de <i>Linnæa</i>)	1.50
* » <i>luteum</i> (à fl. jaune clair)	2.50
» <i>nummulariæfolium</i>	1.50
» <i>obcordatum</i>	2.50
» <i>pedunculare</i>	1. —
» <i>rosmarinifolium</i> (rose carmin et clair)	0.50

Toutes, sauf *Dodonæi* et *rosmarinifolium*, demandent de la fraîcheur et la mi-ombre. Mai-octobre.

<i>Epimedium alpinum</i> (rouge-brun)	0.50
» <i>colchicum</i> , v. <i>pinnatum</i> .	
» <i>diphyllum</i>	1.50
» <i>hexandrum</i> , v. <i>Vancouveria</i> .	
» <i>lilacinum</i>	1.50
» <i>macranthum</i> (blanc pur)	1. —
» <i>Musschianum</i> (blanc terne)	1.50
» <i>ochroleucum</i> <i>Perraldianum</i>	1. —
» <i>pinnatum</i> (jaune vif)	1. —
» <i>rubrum</i> (rouge très vif)	1. —
» <i>versicolor</i> (rose et jaune)	1.50
» <i>violaceum</i> (violet foncé)	2.50

Les *Epimèdes* sont d'entre les meilleures pl. d'ombre; ils font admirablement sous bois, fleurissent en avril-mai et offrent une verdure merveilleuse toute l'année durant.

<i>Eranthis cilicica</i>	1.50
» <i>hyemalis</i>	0.50
» <i>sibirica</i>	1. —
Petits <i>Hellébores</i> jaunes, fleurit sous bois ou dans l'herbe, à l'ombre ou au soleil, de fin janvier à mars.	
<i>Eremostachys laciniata</i>	2.50
» <i>diversifolia</i>	2.50
<i>Eremurus altaicus</i>	2.50
» <i>Bungei</i>	5. —
» <i>caucasicus</i>	2.50
» <i>Elwesianus</i> (fort)	10. —
» <i>himalaicus</i> (fort)	5. —
» <i>Olgæ</i> (fort)	10. —
» <i>robustus</i> (très fort)	8. —
» <i>spectabilis</i>	2.50
» <i>tauricus</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Eremurus turkestanicus</i>	2 50
<i>Erica arborea</i>	2 50
» <i>alpina</i>	5.—
» <i>carnea</i> . <i>Bruyère rose des Alpes</i>	1.—
» à fl. blanc pur	1 50
» <i>ciliaris</i>	2 50
» <i>cinerea</i>	2 50
» <i>multiflora</i>	1 50
» <i>stricta</i> (fleurs rose vif, nombreuses ; automne)	1 50
» <i>tetralix</i>	2 50

L'*E. carnea*, la plus rustique de toutes, donne de janvier à mars-avril, une abondance de fl. rose carmin; soleil ou mi-ombre; c'est la seule esp. avec *stricta* qui forme de beaux buissons, fleurissant tout l'été, qui supporte bien le calcaire; les autres exigent une terre siliceuse (terreau de feuilles ou terre dite de bruyère), elles vont bien dans le sphagnum.

<i>Erigeron alpinus</i> , <i>Vergerette des Alpes</i>	0 50
» <i>aurantiacus</i>	0 50
» <i>compositus</i> (à f. divisées)	0 50
» <i>Coulteri</i>	0 50
» <i>flagellaris</i> (très cespiteuse et for- mant un large tapis de pâquerettes roses)	0 50
» <i>glabellus</i>	0 50
» <i>glaucus</i>	0 50
» <i>grandiflorus</i>	1.—
» <i>hybridus roseus</i>	1 50
» <i>leiomorus</i>	0 50
» <i>macranthus</i>	0 50
» <i>mucronatus</i> (<i>Vittadenia triloba</i>)	0 50
» <i>Philadelphicus</i> (fl. nombreuses, beau rose; mai-novembre)	0 50
» <i>pulchellus</i> (<i>caucasicus</i>)	0 50
» <i>speciosus</i> (grandes fl. violet foncé; été)	0 50
» <i>trifidus</i>	1 —
» <i>uniflorus</i>	0 50
» <i>Villarsii</i>	0 50

Charmanes composées propres à garnir les rochers ou les plates-bandes; soleil ou mi-soleil; été et automne.

<i>Erinacea pungens</i> (<i>Genêt à fleurs violet foncé</i>)	2 50
<i>Erinus alpinus</i>	0 50
» à fl. blanches	0 50
» <i>hirsutus</i>	0 50
» <i>hispanicus</i>	1 50

Excellentes pl. murales et saxatiles à fl. roses violettes ou blanches; mai-juin.

<i>Eriogonum arborescens</i>	2 50
» <i>campanulatum</i>	2 50
» <i>flavum</i>	2 50
» <i>racemosum</i>	2 50
» <i>umbellatum</i>	0 50

Eriogynia (*Spiraea*) *pectinata* 2 50

Eriophorum, voir *Pl. paludéennes*.

<i>Eriophyllum caespitosum</i> fl. jaune orangé; feuilles tomenteuses; pl. de grand effet, excellente pour les lieux en- soleillés	0 50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

	Fr. Ct.
<i>Eritrichium nanum</i> . <i>Roi des Alpes</i>	2 50

Le roi des Alpes est de culture plutôt difficile. Il lui faut la position horizontale, c'est-à-dire de rocher ou de muraille, le levant ou le couchant et un sol très maigre. Pour la cult. en pots il faut tenir très sec, l'air restant humide. Nous le cultivons pour la vente dans le sable granitique et le tenons très sec l'hiver.

<i>Erodium absinthoides</i> , <i>Sibthorpianum</i>	2 50
» <i>amanum</i>	2 50
» <i>chamædryoides</i> , <i>Reichardii</i>	2 50
» <i>cheilanthesifolium</i> , voir <i>trichomanæfo- lium</i>	
» <i>chrysanthum</i> (fl. jaunes)	2 50
» <i>corsicum</i>	2 50
» <i>Crispii</i> (hybride des <i>E. absinthoides</i> et <i>chrysanthum</i> que nous dédions à Sir Frank Crisp)	5.—
» <i>daucoides</i> , à f. de carottes et à fl. carmin	1.—
» <i>glandulosum</i> , v. <i>macradenum</i>	
» <i>Guiccardi</i>	5.—
» <i>guttatum</i>	2 50
» <i>hymenodes</i>	1.—
» <i>leucanthum</i>	2 50
» <i>macradenum</i>	1.—
» <i>Manescavi</i> (belles grandes fleurs car- min vif)	0 50
» <i>olympicum</i> , v. <i>absinthoides</i>	
» <i>pelargoniflorum</i>	1.—
» <i>petraeum</i>	2 50
» <i>Reichardii</i> , v. <i>chamædryoides</i>	
» <i>Romanum</i>	2 50
» <i>serotinum</i>	1.—
» <i>Sibthorpianum</i> , v. <i>absinthoides</i>	
» <i>supracanum</i>	2 50
» <i>trichomanæfolium</i>	2 50

Charmanes géraniacées très florifères dont plusieurs ont des fl. de *Pelargonium* élégantes. *E. Manescavi* — la plus florifère de toutes — va fort bien à l'ombre ou à mi-ombre. Mai-octobre, même novembre.

* <i>Erpetion réniforme</i>	1.—
<i>Eryngium alpinum</i> , <i>chardon bleu</i> , <i>Panicaut des Alpes</i> , <i>Reine de l'Alpe</i> , etc. ¹	1 —
» <i>amethystinum</i>	0 50
» <i>Bourgati</i> (<i>Chardon bleu des Pyrénées</i>)	0 50
» <i>cœruleum</i>	0 50
» <i>giganteum</i>	0 50
» <i>serbicum</i>	2 50
» <i>Rothenbergi</i>	1.—
» <i>spino-alba</i>	1.—
» <i>Zabeli</i>	1.—

Voir pour autres espèces aux *Pl. vivaces*.

Les *Panicauts* sont d'entre les plus ornementales des pl. alpines. Le *panicaut des Alpes* (*Blue thistle* des Anglais) est une merveille végétale;

¹ Le véritable *E. alp.* est très rare dans les cultures; on a publié sous ce nom et vendu presque partout plusieurs espèces inférieures.

Fr. Ct.

la collerette admirablement ouvragée, en filigrane et de teinte bleu-violet, qui porte le chaton de fleurs, est puissamment artistique. Toute la partie supérieure de la pl. (haute de près d'un mètre), se teinte en bleu-violet et conserve cette couleur pendant près de six semaines (juin-juillet). La multiplication de cette plante est lente et difficile, car les graines germent capricieusement; mi-soleil; sol profond; ni trop lourd ni trop léger; fait bien dans les gazons. Les *E. amethystinum*, des Alpes orientales, et *Bourgati*, des Pyrénées, sont également jolis. Tous bleussent leurs feuillages au moment de l'anthèse.

Erysimum allionii 0.50

Très belle giroflée orangé vif à floraison abondante et continue.

» *cheiranthoides* 0.50

» *Kotschyannum* 1.50

» *nanum* 0.50

» *ochroleucum* (superbe, à fl. jaune-clair) 0.50

» *pulchellum* (pl. naine et ramp., à fl. jaune d'or) 0.50

» *pumilum* 0.50

» *purpureum* 1.50

» *Wahlenbergii* 0.50

Les *Velars* sont des crucifères à floraison prolongée et brillante et aimant tous le soleil et la rocaille.

Erythraea elodes 2.50

» *diffusa* 2.50

» *littoralis* 2.50

» *ramosissima* 2.50

Erythronium albidum 0.50

» *americanum* 0.50

» *californicum* 0.50

» *dens canis* (Dent de chien) 0.50

» *album* 0.50

A planter dans les bosquets, sous les arbres des vergers ou les plates-bandes mi-ombragés.

Eunomia cordata 1.50

» *rotundifolia* 2.50

Euphorbia altissima 1.—

» *capitulata* 1.—

* » *Characias* 1.—

* » *Dendroides* 1.—

» *Gerardiana* (feuillage bleuâtre) 0.50

» *Kotschyana* 1.—

» *myrsinites* 0.50

Pl. à longs rameaux trainants, garnis de f. serrées et bleuâtre, disposées en spirales; pl. méditerranéenne très ornementale, précieuse pour la décoration des rochers ensoleillés des pentes arides et des moraines stériles.

» *polychroma* 0.50

» *robusta* 1.—

* » *spinosa* 2.50

» *Wulfeni* 1.—

Eurotia lanata 2.50

Euryangium Sumbul 1.50

Facchinia (Alsine) lanceolata 1.—

Fr. Ct.

Falcaria scioides (pl. envahissante à joli feuillage denté en scie) 0.50

* *Falkia repens* 2.50

Gracieux petit liseron à fl. roses du Transvaal.

Farsetia clypeata 0.50

Farsetia triquetra 2.50

Ferula Assa-foetida. Asafetida 2.50

» *communis* (très beau feuillage divisé). 1.—

» *glauca* 1.—

Les fêrúles sont des pl. remarquables par la majesté de leur port, leurs amples proportions et par la beauté du feuillage. Elles aiment un sol profond, une exposition abritée contre les trop grands froids et contre le trop fort soleil.

Festuca crinum ursi. La douz. 2 fr. 0.50

Le crin d'ours est un gazon oriental très fin, vert foncé, ne s'élevant pas au-dessus de 10 cent. et qu'on ne fauche jamais; il supporte le sec et la chaleur; propre à former des bordures.

» *glauca* (herbe bleuâtre) 0.50

Festuca punctoria 0.50

Ficaria grandiflora grande Ren. d'or; premier printemps 0.50

» *ranunculoides fl. pl. Petite fl. jaune brillant, très pleine; mars.* 0.50

» *à fl. blanches* 5.—

Fragaria alpina 0.50

» *californica* 0.50

» *Daltoniana* jolie fraise himalayenne 1.—

» *elatior* 0.50

» *grandiflora, var. tricolore* 0.50

» *Hagenbachiana* 0.50

» *indica, pl. très sarmenteuse, à fl. jaunes* 0.50

» *lucida* 0.50

» *monophylla* 0.50

» *nilgherensis* 0.50

» *roseiflora (à fl. roses)* 0.50

» *Sandwichensis* 0.50

» *semperflorens* 0.50

» *virginiana* 0.50

Francoa appendiculata 0.50

* » *sonchifolia* 0.50

* *Frankenia laevis* 1.—

Frasera speciosa 2.50

Fritillaria delphinensis 1.—

De la station classique du Dauphiné.

Fritillaria Imperialis (Couronne impériale) 0.50

» *inodora* 2.50

» *Meleagris. La douz. 2 fr.* 0.50

» *à fl. blanch. (La dz. 2 fr.)* 0.50

» *pyrenaica* 0.50

* *Fuchsia pumila* 2.50

Fumana procumbens 1.50

Gagea Liotardi 1.—

Galanthus caucasicus 0.50

» *Elwesii* 0.50

» *Forsteri* 0.50

» *nivalis (Perce-neige vrai). (La douz. 2 fr.)* 0.50

	Fr. Ct.
Galax aphylla	2.50
Galeobdolon luteum (pour ombre)	0.50
Galium Baldense	0.50
» purpureum	1.—
» rubrum	1.—
Gaya simplex	1.—
Genista, voir <i>Arbustes</i> .	

GENTIANES

I.

Gentiana acaulis	1.—
» » alba	5.—

Ce type renferme quatre espèces parfaitement distinctes, qui sont :

» alpina	2.50
» angustifolia	2.50
» Clusii	1.50
» Kochiana	1.50

La 2^{me} et la 3^{me} esp. sont calcicoles; tandis que la 4^{me} craint la chaux et exige un sol dépourvu de calcaire. Le *Gentiana acaulis* des jardins (*Gentianella* des Anglais) est le *G. angustifolia* introduit dans le XVI^{me} siècle en Angleterre et modifié par la culture. Le *G. angust.* est la plus belle espèce du genre avec le *Clusii*; ces deux pl. réussissent dans tous les terrains mais sont plus belles dans le calcaire. Mi-soleil. Avril-mai.

II. GROUPE DES ESPÈCES ÉLEVÉES, A GROSSES RACINES CHARNUES :

» lutea, <i>Grande gent. jaune</i>	1.50
» pannonica	2.50
» punctata	2.50
» purpurea	2.50

Il faut à ce groupe un sol profond et pierreux (calcaire pour lutea), une exposition au mi-soleil; ne jamais entamer ni couper de racines lors du repiquage ou de la transplantation.

III. ESPÈCES BASSES ET CESPITEUSES :

» angulosa	2.50
† » bavarica	2.50
» » albiflora	5.—
» brachyphylla	2.50
» Favratii	2.50
† » imbricata	2.50
» pyrenaica	2.50
† » Rostani (pl. rarissime des Alpes Cottienues)	2.50
† » septemfida	2.50
» verna (étoile bleue; l'une des plus belles fl. des montagnes)	0.50
» verna chionodoxa (à fl. blanc pur)	5.—
» atrocerulea (bleu tr. foncé)	2.50
» azurea (bleu clair)	2.50

Voir à ce sujet; Flore alpine par H. Correvon, pl. 78.

	Fr. Ct.
Gentiana verna grandiflora	2.50
» » violacea	2.50

Les espèces marquées d'une † exigent un sol poreux et humide, si possible la tourbe ou le sphagnum et le plein soleil. Les *G. brach.*, *Favratii* et *verna* recherchent le sec, le pl. soleil et un sol caillouteux, si possible calcaire pour *verna* et ses var. Le *pyrenaica* est de culture plutôt difficile; il lui faut une niche bien drainée dans une rocaille, au mi-soleil, et un sol poreux mélangé de cailloux et de sable.

IV. ESPÈCES DES LIEUX HUMIDES ET PALUDÉENS :

» asclepiadaea	0.50
» » à fl. blanches	2.50

Pl. d'ombre, à grosses racines charnues, recherchant la fraîcheur, un sol poreux et humide.

» Pneumonanthe, esp. des marécages; soleil	1.50
------------------------------------------------------	------

V. ESPÈCES DE CULTURE SPÉCIALE :

» ciliata	2.50
» frigida	2.50
» Frœlichii	2.50
» Parryi, des Mont. Rocheuses	5.—
» pumila	5.—

Il leur faut un sol composé de terreau de feuilles, de sable et de tourbe, le tout additionné de cailloux concassés; mi-soleil.

VI. ESPÈCES DE CULTURE FACILE :

» algida	2.50
» cruciata (exige le calcaire)	0.50
» dahurica (Sibérie)	1.50
» Fetisowi (Turkestan)	1.50
» Kesselringii (Turkestan)	1.50
» macrophila (Sibérie)	1.50
» Olivieri (Sibérie)	1.50
» phlogifolia (Transylvanie)	1.50
» straminea (Chine)	1.50
» tibetica (Himalaya)	1.50
» Walujewi (Turkestan)	1.50

Geranium aconitifolium, v. *G. rivulare*.

» albanum	0.50
» albiflorum	0.50
† » argenteum	1.50
» armenum (brillante esp. orient.)	1.50
† » cinereum	1.—
» Endressi	0.50
» Eriostemon	1.—
» Fremonti	1.—
† » grandiflorum	0.50
» gymnocaulon, différant certainement, de <i>Ibericum</i>	1.—
† » ibericum (grandes fl. bleu-violet)	0.50
» intermedium	2.50
» lancatriense (esp. basse à fleurs rose tendre)	1.50
» lividum	0.50

	Fr. Ct.
<i>Geranium maculatum</i>	1.50
» <i>macrorrhizum</i>	0.50
» <i>nodosum</i> (recherche l'humidité, fl. lilas)	0.50
» <i>palustre</i> (idem).	0.50
» <i>phæum</i>	0.50
» <i>platyanthum</i>	2.50
» <i>platypetalum</i>	0.50
» <i>pratense</i> (l'une des meilleures et des plus florif.; grandes fl. bleues de mai en octobre; très solide)	0.50
» » <i>bicolor</i>	1. —
» » à fl. blanches	0.50
» <i>rivulare, aconitifolium</i> (fl. bl.)	0.50
» <i>sanguineum</i> (pl. basse et étalée, à très nombr. grandes fl. rose vif; très facile; soleil ou mi-ombre; mai-sept.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» » <i>v. prostratum</i>	1.50
» <i>sessiliflorum</i>	2.50
† » <i>subcaulescens</i>	2.50
» <i>sylvaticum</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» <i>Traversi</i>	2.50
» <i>tuberosum</i>	1. —

Les esp. marquées d'une † sont plus spécialement de rocaillies et rech. le soleil. Tous ces ger. sont très solides et florifères.

<i>Gerbera Anandria</i>	1. —
* » <i>Jamesoni</i>	2.50
» <i>nivea</i>	1. —
<i>Geum aureum</i>	2.50
» <i>bulgaricum</i>	2.50
» <i>chiloense</i> (écarlates; soleil).	0.50
» <i>coccineum</i> (fl. d'un rouge vif, très ornementale).	0.50
» <i>coccineum, var. grandiflorum</i>	1. —
» <i>Heldreichii</i> (fl. orangée).	1. —
» <i>montanum</i> (fl. jaune brillant; plante basse).	0.50
» » <i>var. aurantiacum</i>	2.50
» <i>pyrenaicum</i>	0.50
» <i>reptans</i> (pl. saxatile; très grandes fl. jaune d'or).	1. —
» <i>rhæticum</i>	1. —
» <i>rivale</i> (fl. rouge brun, penchée)	0.50
» » <i>var. superbum</i>	1. —
» <i>Rossii</i> , de l'Amérique arctique	1.50
» <i>speciosum</i> (rarissime et nouvelle espèce du Caucase).	5. —
» <i>triflorum</i> (fl. rouge-brun).	1. —

<i>Gilia coronopifolia</i>	1. —
<i>Gillenia trifoliata</i>	1.50

Gracieuses Spirées à fl. blanches, à grands pétales, très rustique; mi-août; mi-soleil.

<i>Gladiolus communis</i>	0.50
» <i>imbricatus</i>	0.50
» <i>palustris</i>	0.50

La douz. 2. —

Charm. glayeuls miniature d'un carmin très vif.

	Fr. Ct.
<i>Glaucium flavum, Pavot marin cornu</i>	0.50
» <i>rubrum</i> à fl. rouge-brique	0.50
» <i>tricolor</i>	1. —
» » <i>var. grandiflorum</i>	1.50

Curieuses papavéracées à feuillage glauque, élégamment découpé, persistant l'hiver et constituant une belle décoration, même pour la fl. coupée et la décoration de tables et de salons; fl. jaunes et rouges, très solides partout, mais préfère un sol léger et sablonneux et le soleil.

<i>Glaux maritima</i>	0.50
<i>Glechoma hederacea</i> fol. var.	0.50
* <i>Globularia alypum</i>	1.50
» <i>bellidifolia</i>	1.50
» » <i>minor</i>	1.50
» <i>cordifolia</i> (La douz. 2 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» <i>nana</i>	1.50
» <i>nudicaulis</i>	0.50
» <i>trychosantha</i>	1. —
» <i>vulgaris</i>	0.50
» » à fl. blanches	1. —

Les Globulaires sont des pl. de soleil et de rochers; les deux premières esp. sont rampantes et cespitueuses et la prem. est l'une des meill. pl. de roc. pour le soleil. Toutes — sauf leurs var. à fl. blanches — ont des fl. lilas, disposées en capitules serrés, en boules sphériques chez les trois dernières, aplaties chez les trois premières. Mai-juin.

<i>Glossocomia</i> , voir <i>Codonopsis</i>	
<i>Glycyrrhiza glabra</i> (Régliasse)	1. —
<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , voir <i>Leontopodium alpinum</i>	
» <i>supinum</i>	0.50
<i>Gœbelia alopecuroides</i>	2.50
<i>Goniolimon</i> , voir <i>Statice</i>	
* <i>Goodenia repens</i>	2.50
* <i>Gunnera magellanica</i>	2.50
<i>Gutierrezia Euthamiae</i>	1.50

Sorte d'arbuste nain de la fam. des Composées, à feuil. très fin, à nombreuses fleurs jaune vif, fleurissant de juillet en novembre. Soleil.

<i>Gypsophila alpigena</i>	0.50
» <i>cerastioides</i>	0.50
» <i>repens</i>	0.50
» » <i>var. monstrosa</i> ; plus grande dans toutes ses formes	1. —
» <i>Rokejeka</i>	0.50
» <i>transylvanica</i>	1. —

Ce sont des cariophyllées aux très nombreuses fl. blanches ou roses, aimant le soleil et préférant le calcaire à la silice. Le *G. repens* est l'une des meill. et des plus florif. d'entré les pl. de rocaillies; pl. très retombante, se couvrant tout l'été de fl. rose clair; feuil. glauque. Pour les grandes esp., v. *Pl. vivaces*.

<i>Haberlea Rhodopensis</i>	2.50
Pl. balkanique pour rochers et murailles; à l'aspect de <i>Ramondia</i> , avec fl. violet lilas; cult. fac.; mi-ombre.	

	Fr. Ct.
<i>Hablitzia tamnoides</i>	1.50
<i>Hacquetia Epipactis</i>	0.50
Curieuse ombellif. à fl. jaunes en capitules portés par un involucre vert gai; février-mars; très solide.	
* <i>Haplocarpha Leichtlini</i>	2.50
<i>Haplophyllum (Ruta) patavinum</i>	1.50
<i>Harboursa trachypleura</i>	1.—
<i>Hedraeanthus caricinus (Edrayanthus)</i>	1.50
» <i>Bosniacus</i>	2.50
» <i>croaticus</i>	1.50
» <i>dalmaticus</i>	0.50
» <i>dinaricus</i>	2.50
» <i>graminifolius</i>	0.50
» <i>Kitaibelii</i>	2.50
» <i>pumilio</i>	2.50
» <i>serpyllifolius</i>	2.50
» » <i>var. major.</i>	2.50
» <i>tenuifolius</i>	0.50
Ce sont de gracieuses Campanules des rochers, qui fleurissent abondamment de mai en juillet et aiment les fentes des murs et des rocaïlles en pl. soleil; fl. lilas ou violet plus ou moins foncé, disposées en capitules.	
* <i>Hedysarum altaicum</i>	1.—
» <i>neglectum</i>	1.—
» <i>obscurum</i>	1.—
» <i>sericeum</i>	1.—
» <i>sibiricum</i>	1.—
* <i>Heeria elegans</i>	2.50
<i>Helianthemum alpestre</i> (fl. jaunes)	0.50
» <i>amabile</i> (rose tendre, vif ou carmin)	0.50
» <i>apenninum</i> (blanc pur)	0.50
» <i>bicolor</i> (jaune et rouge)	0.50
» <i>canum</i> (jaune; feuillage velu)	0.50
» <i>chamæcistus</i> (blanc)	0.50
» <i>coccineum</i> (rouge vermillon)	0.50
» » (à fl. doubles, rouges, fl. très pleines; juin-octobre)	1.—
» » « brillant »	1.—
» <i>cruentum</i> (rouge très vif)	0.50
» <i>cupreum</i> (rouge cuivre vif)	0.50
* » <i>formosum</i> (jaune à contre brun)	1.50
» <i>Fumana</i> (jaune clair; f. étroites)	0.50
» <i>grandiflorum</i> (jaune vif; très florif., fl. pl. à fl. très doubles. Mai-août)	1.—
» <i>italicum</i> (jaune)	0.50
» <i>Kotschyannum</i> (jaune vif)	1.50
» <i>mutabile</i> (variable)	0.50
» <i>obscurum</i> (jaune vif)	0.50
» <i>polifolium</i> (blanc)	0.50
» » <i>var. à fl. roses</i>	0.50
» <i>purpureum</i> (rose vif)	0.50
» <i>rhodantum</i> (rose clair)	0.50
» <i>roseum</i> (rose plus ou moins vif)	0.50
» <i>rubrum</i> (rouge cerise)	0.50
» <i>rupifragum</i>	0.50
» <i>sanguineum</i> (rouge sang)	0.50
» <i>suffruticosum</i>	0.50
» <i>tomentosum</i> (gr. fl. jaune vif)	0.50
» <i>velutinum</i>	0.50
» <i>vulgare</i> (jaune vif, très florifère)	0.50

Variétés :	Fr. Ct.
<i>Album maculatum</i>	Fire Bell
<i>Attraction</i>	Lemon Yellow
<i>Aurora</i>	Lunulatum
<i>Garibaldi</i>	à 50 Cts.
Les Hélianthèmes (Rockroses des Anglais) sont de petits arbustes couchés, les meilleurs pour garnir les rochers ensoleillés, les pentes arides et sèches, les sols exposés au soleil; on en fait des bordures et des corbeilles. Leurs fleurs ont l'aspect de petites Eglantines et offrent toutes les teintes en dehors de la couleur bleue; on en a même à fl. doubles. Ils ne s'élèvent pas au-dessus de 20 à 25 cm. et se couvrent littéralement de fl. de mai en juillet; puis, si l'on a soin de couper immédiatement les tiges qui ont fleuri et d'empêcher la graine de mûrir, on a une nouvelle floraison en septembre-octobre et jusqu'en hiver. Leur feuillage est à lui seul un ornement de valeur; mais ce qui les rend précieux, c'est leur solidité à toute épreuve et leur constitution, qui résiste aux plus fortes sécheresses.	
<i>Helichrysum anatolicum</i>	1.—
» <i>frigidum</i> (de Corse)	2.50
» <i>lanatum</i>	1.—
» <i>microphyllum</i>	2.50
» <i>odoratissimum</i>	1.—
» <i>Stœkas</i>	1.50
» <i>Tschiantanicum</i>	2.50
<i>Helleborus Abschasicus</i>	1.50
» <i>atrorubens</i>	1.—
» <i>colchicus</i> (à fl. cuivrées, très belles; mars-avril)	1.—
» <i>corsicus</i>	2.50
» <i>foetidus</i> (beau feuillage)	0.50
» <i>guttatus</i>	1.—
» <i>hybridus</i> , v. <i>Pl. vivaces</i>	
» <i>Kochii</i>	2.50
» <i>multifidus</i>	2.50
» <i>niger</i> , <i>Rose de Noël</i> , <i>Christmas Rose</i>	0.50
» » <i>var. altifolius</i>	2.50
» <i>occidentalis</i>	1.50
» <i>odorus</i>	1.50
» <i>olympicus</i>	1.50
» <i>orientalis</i>	1.—
» <i>purpurascens</i>	1.—
» <i>viridis</i> (fl. vertes)	1.—
Les Hellébore recherchent un sol riche en humus et un peu pierreux, une exposition un peu fraîche et mi-ombragée.	
<i>Helonias bullata</i>	2.50
<i>Helxine Soleirolii</i>	2.50
Plante minuscule, jolie pour garnir les murs ou rochers à l'ombre.	
<i>Hemerocallis</i> , v. <i>Pl. vivaces</i>	
<i>Hepatica</i> , v. <i>Anemone hepatica</i>	
<i>Heracleum alpinum</i>	1.—
» <i>Mantegazzianum</i>	1.—
Plante gigantesque que nous avons introduite du Caucase; propre à décorer les grands rochers ou à être isolée dans les parcs et jardins; mellifère et très recherchée des abeilles.	

	Fr. Ct.
<i>Heracleum montanum</i>	1. —
» <i>pubescens</i>	1. —
» <i>pyrenaicum</i>	1. —
<i>Herniaria glabra</i> (la douz. 2 fr.)	0.50

Plante naine et rampante, dont on forme des gazons, des tapis, des bordures, des fonds de parterre, et dont les jardiniers se servent pour toutes sortes de motifs de décoration et de « mosaiculture ». Elle résiste à la sécheresse et à la pluie, ne craint pas le grand soleil et est d'une culture très facile. C'est l'une des meilleures pl. tapissantes.

» <i>incana</i>	0.50
» <i>pyrenaica</i>	0.50
<i>Heuchera americana</i>	0.50
» <i>brizoides</i>	0.50
» <i>purpurescens</i>	0.50
» <i>rubescens</i>	1. —
» <i>rosea</i>	0.50
» <i>sanguinea</i>	0.50

Fl. rouge corail très vif, en grappes dressées, à grand effet, excellentes pour bouquets; mai-septembre; soleil; très solide; pl. précieuse et recommandable.

» <i>alba</i>	1. —
» <i>grandiflora</i>	1.50
» <i>splendens</i>	1.50
» <i>Walkeri</i>	1.50
» <i>grandiflora</i>	1.50
» <i>à fl. blanches</i>	0.50

Hibiscus, v. pl. vivaces.

<i>Hieracium albidum</i> (<i>H. intybaceum</i>)	1. —
» <i>aurantiacum</i>	0.50
» <i>lanatum</i> . <i>Andryala lanata</i>	0.50
» <i>pilosella</i> . (Pl. stolonif., envahissante, propre à garantir les lieux arides et secs)	0.50
» <i>rubrum</i>	1. —
» <i>stoloniflorum</i> (fl. rouge-brique)	0.50
» <i>villosum</i>	0.50

Hippocrepis comosa 0.50

Homogyne alpina (joli feuillage; fl. en capit. rosé clair) 0.50

» <i>discolor</i>	1.50
» <i>sylvestris</i>	1.50

Horminum pyrenaicum 0.50

» *purpureum* 1.50

Hoteya japonica. *Spirée blanche du Japon* 0.50

Honkeneya (*Arenaria*) *peplodes* 0.50

Houstonia cœrulea 2.50

» *fl. blanches* 2.50

» *purpurea* 2.50

» *serpyllifolia* 2.50

Hugueninia tanacetifolia 1. —

Hutschinsia (*Lepidium*) *alpina* 0.50

» *Auerswaldii* 0.50

Hydrocotyle rotundifolia. *Sibthorpioides* 2.50

Jolie petite esp. rampante, à feuil. ornemental, très propre à garnir les lieux frais.

Hydrophyllum occidentale 1. —

Hypericum alatum 0.50

» *ægyptiacum* 2.50

	Fr. Ct.
<i>Hypericum aureum</i>	1. —
* » <i>balearicum</i>	2.50
» <i>calycinum</i> . La douz. 2 fr.	0.50

L'une des meilleures pl. tapissantes pour sous-bois, lieux arides, à l'ombre ou au plein soleil; envahissante et très solide; beau feuillage et très grandes fl. jaune brillant.

» <i>chinense</i>	0.50
» <i>ciliatum</i>	0.50
» <i>Coris</i> , délicieux petit arbuste minuscule pour rochers	1. —
» <i>delphicum</i>	0.50
» <i>densiflorum</i>	1. —
» <i>empetrifolium</i>	1.50
» <i>fragile</i>	2.50
» <i>galioides</i>	1. —
» <i>Gebleri</i>	0.50
» <i>hircinum</i>	0.50
» <i>hyssopifolium</i>	0.50
» <i>inodorum</i> (d'Orient)	0.50
» <i>japonicum</i>	0.50
† » <i>Kotschyannum</i>	1.50
» <i>Lysimachioides</i>	2.50
» <i>montanum</i>	0.50
» <i>moserianum</i>	1. —
† » <i>nummularium</i>	0.50
» <i>oblongifolium</i>	0.50
» <i>olympicum</i>	1. —
» <i>orientale</i>	0.50
† » <i>organifolium</i>	1. —
» <i>patulum</i>	1. —
» <i>perforatum</i> , <i>Millepertuis</i>	0.50
† » <i>polyphyllum</i>	1.50
» <i>prolificum</i>	1. —
» <i>Przewalskianum</i>	0.50
» <i>pulchrum</i>	0.50
» <i>reptans</i>	1. —
† » <i>repens</i> (brillante espèce à floraison prolongée)	1.50
» <i>Richeri</i>	0.50
» <i>scouleri</i>	2.50
» <i>tomentosum</i>	0.50
» <i>transylvanicum</i>	1.50

Voir, pour les autres espèces, aux *Arbustes*.

Les *Hypericum* ont tous des fl. jaunes, brillantes et le plus souvent très ornementales; ils recherchent les lieux ensoleillés; mai-juillet.

Les esp. marquées d'une † sont des pl. de rocaïlles, basses et cespitueuses.

<i>Hypochaeris Helvetica</i> , <i>H. uniflora</i>	1. —
<i>Hyssopus aristatus</i>	1. —
» <i>cretaceus</i>	1. —
» <i>officinalis</i>	0.50
» <i>à fl. blanches</i>	0.50
» <i>à fl. rouges</i>	0.50

L'Hyssope est d'entre les pl. aromatiques les plus appréciées; elle croît dans les lieux les plus arides et stériles, au grand soleil, et ses fl. bleu foncé (blanches ou rouges chez les var. d'*officinalis*) sont un bel ornement; de juillet en octobre.

	Fr. Ct.
<i>Iberis commutata</i>	1.50
» <i>Gibraltarica</i>	0.50
» <i>Jordani</i>	0.50
» <i>jucunda</i> (<i>æthionema coridif.</i>)	1.50
» <i>saxatilis</i>	0.50
* » <i>semperflorens</i>	1.50
» <i>sempervirens</i>	0.50

L'une des meill. pl. à bordures et pour garnir rochers ensoleillés; verdure foncée persistant l'hiver; fl. bl. éblouissant, très abondantes, avril-juin; pl. des plus solides.

» » <i>var. nana</i>	0.50
» <i>stylosa</i>	1.50
<i>Imperatoria Ostruthium</i> , pl. d'ombre, très solide	0.50
<i>Incarvillea Delavayi</i>	0.50
» <i>grandiflora</i>	1.50
» » <i>brevipes</i>	2.50
» <i>Olgæ</i>	0.50

Très belles Bignoniacées de pl. terre, très rustiques, florifères et des plus recommandables. L'I. Delayi est la meilleure introduction qu'on ait faite depuis longtemps; de son tubercule très robuste s'élèvent, de juin en septembre, des hampes florales qui portent de grandes fl. carmin, roses et nuancées de jaune, ayant l'aspect des fleurs de Gloxinia. On la nomme parfois le Gloxinia vivace. Réussit dans tout sol sain et plutôt léger.

<i>Inula acaulis</i>	2.50
» <i>Aschersoniana</i>	2.50
* » <i>crythmoides</i>	1.50
» <i>ensifolia</i>	0.50
» <i>glandulosa</i> , grand Arnica à fl. orangées du Caucase	0.50
» <i>var. grandiflora</i> , superbe plante de grand effet	1. —
» <i>Helenium. Aulnée</i> (le meilleur remède contre les paresseuses d'estomac)	0.50
» <i>limonifolia</i>	5 —
» <i>macrocephala</i>	0.50
» <i>montana</i>	1. —
» <i>oculus-Christi</i>	0.50
» <i>Royleana</i>	1. —

Les aulnées sont de bonnes pl. de pleine terre, sortes de grandes Marguerites jaunes fleurissant l'été; elles aiment le mi-soleil et la fraîcheur.

<i>Iris acoroides</i> ¹	0.50
» <i>alata</i>	1.50
» <i>albicans</i>	2.50
» <i>aphylla</i>	0.50
» <i>arenaria</i> (très nain, fl. jaune)	1.50
» <i>asiatica</i> (très grandes fl. violet foncé, superbe)	1. —
» <i>aurea</i>	1. —
» <i>Balkanæ</i>	1. —
» <i>biflora</i>	0.50
» <i>Biliotti</i>	0.50

<i>Iris Bohemica</i>	0.50
» <i>bosniaca</i> (jaune brillant, précoce)	1.50
» <i>caucasica</i>	1. —
» <i>Chamæiris</i> (jaune pâle, nain)	0.50
» <i>Clarkei</i>	2.50
» <i>cristata</i> (bleu et orange)	0.50
» <i>cuprea</i> (<i>fulva</i>)	1.50
» <i>cypriana</i>	1.50
» <i>Danfordiæ</i>	0.50
» <i>Delavayi</i>	0.50
» <i>dichotoma</i>	1. —
» <i>Douglasiana</i>	2.50
» <i>ensata</i> (fl. violet et or, odorantes)	0.50
» » <i>var. Chinensis</i>	1. —
» <i>fimbriata</i>	1. —
» <i>Florentina</i> (fl. blanches, racine odorante dont on fait la poudre d'Iris)	0.50
» <i>foetidissima</i> (plante d'ombre, à f. ornemental, fruits rouge vif)	0.50
» <i>foetidissima</i> , à feuilles panachées	1. —
» <i>Germanica</i> . (La douz. 2 fr.)	0.50

Pour variétés, voir *Pl. vivaces*.

» <i>gigantea</i>	0.50
» <i>gracilipes</i>	1. —
» <i>graminea</i> (fl. bleues)	0.50
» <i>hexagona</i>	1. —
» <i>Histrio</i>	1. —
» <i>histrioides</i>	0.50
» <i>humilis</i>	1. —
» <i>iberica</i>	1. —
» <i>italica</i>	0.50
» <i>japonica</i> 1. <i>imbricata</i> (tr. beau)	1. —
» <i>juncea</i>	0.50
» <i>Kämpferi</i> , voir <i>Pl. vivaces</i>	
» <i>Koroleyp.</i> (H. Massé).	2.50
» <i>lacustris</i> (lilas et jaune, tr. nain)	1.50
» <i>longipetala</i>	0.50
» <i>lusitanica</i>	0.50
» <i>lutescens</i>	0.50
» <i>macrantha</i>	1. —
» <i>Mandraliscæ</i>	1. —
» <i>Millesi</i>	0.50
» <i>missouriensis</i>	1. —
» <i>Monnieri</i>	1. —
» <i>neglecta</i>	0.50
» <i>olbiensis</i>	0.50
» <i>orientalis</i>	1. —
» <i>orchioides</i>	1.50
» » <i>cœrulea</i>	2.50
» <i>oxypetala</i> (odorant)	1.50
» <i>pallida</i> (bleu d'azur; odorant)	0.50
» <i>persica</i>	1.50
» <i>plicata</i> (bleu et blanc)	0.50
» <i>pseudo-pumila</i>	0.50
» <i>pumila</i> (nain et précoce)	0.50
» » <i>var. fl. violet foncé</i>	0.50
» » <i>var. fl. jaunes</i>	0.50
» <i>pyrenaica</i>	0.50
» <i>reticulata</i>	0.50
» <i>rubro-marginata</i> (rare)	2.50
» <i>ruthenica</i>	0.50
» <i>sambucina</i> (jaune et brun)	0.50

¹ Pour la description des Iris lire le vol. de MM. H. Correvon et H. Massé: *Les Iris dans les jardins*.

	Fr. Ct.
<i>Iris sibirica</i> (bleu foncé)	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» <i>sordida</i>	0.50
» <i>spuria</i> (bleu clair et jaunâtre)	1.50
» <i>squalens</i> (jaune vif et brun foncé)	0.50
» <i>stylosa</i> (bleu, odorant et très précoce)	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» <i>Suziana</i> (<i>Iris deuil</i>)	1.50
» <i>tectorum</i>	1.50
» <i>tuberosa</i>	0.50
» <i>variegata</i> (jaune et brun)	1.50
» <i>versicolor</i> (violet, rougeâtre et or)	0.50
» <i>virescens</i> (jaune verdâtre, odorant, rare)	0.50
» <i>virginica</i> , <i>I. prismatica</i> (lilas vif)	0.50
» <i>Xyphium</i>	0.50
» <i>Xyphioides</i>	0.50
Voir en outre <i>Pl. vivaces</i> ou <i>Pl. paludéennes</i> . Tous ces Iris sont de culture facile et ne demandent qu'une place au soleil, dans la rocaille ou la pleine terre.	
<i>Isatis alpina</i>	2.50
De graines récoltées dans la station classique du Haut-Queyras.	
<i>Isopirum thalictroides</i>	0.50
Jolie petite renonculacée tuberculeuse précoce, à feuillage fin et à fleurs blanches; mi-ombre ou sous-bois.	
<i>Jasione humilis</i>	2.50
» <i>perennis</i>	1.—
Campanulées à fl. bleu lilas réunies en capitules; soleil.	
<i>Jeffersonia diphylla</i>	2.50
* » <i>dubia</i> , à fl. lilas 2 3	5.—
<i>Kernera saxatilis</i> , v. <i>Cochlearia</i>	
<i>Kuhnia eupatorioides</i>	2.50
<i>Lactuca perennis</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.50
v. <i>Mulgedium</i>	
<i>Lamium maculatum</i> × <i>album</i>	0.50
» <i>Orvala</i>	1.50
Très belle espèce à fl. rouge brun,	
<i>Laserpitium gallicum</i>	1.—
» <i>latifolium</i>	0.50
» <i>Panax</i> . <i>L. Halleri</i>	1.—
» <i>Siler</i>	0.50
Ombellifères à feuil. ornemental et très solides; fl. blanches.	
<i>Lathyrus aureus</i>	1.50
» <i>grandiflorus</i>	1.50
» <i>incurvus</i>	0.50
» <i>latifolius</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» <i>rotundifolius</i>	1.50
» <i>splendens</i>	1.50
<i>Laurentia tenella</i>	2.50
<i>Lavandula multifida</i>	1.50
» <i>spica</i>	0.50

	Fr. Ct.
<i>Lavandula spica</i> à fl. blanches	0.50
* » <i>Stœkas</i>	1.50
» <i>vera</i>	0.50
» » <i>compacta</i>	1.50
» » <i>nana</i>	1.50
Les lavandes sont très recherchées des maîtres-ses de maison pour parfumer le linge, les armoires, etc. Soleil et lieux secs.	
<i>Leiophyllum buxifolium</i>	2.50
» <i>Hugeri</i>	2.50
* <i>Leonitis Leonurus</i>	2.50
<i>Leontice altaica</i>	2.50
<i>Leontopodium alpinum</i> . <i>Etoile d'argent</i> , <i>Edelweiss</i>	0.50
» forts pieds de deux ans	1.—
La cult. de l'étoile d'argent est facile; soleil, rocher ou plate-bande si possible; tenir sec l'hiver, diviser la touffe tous les deux ans. Pour l'avoir très blanche, il faut mettre du calcaire dans le sol.	
» alp., v. <i>altaicum</i>	2.50
» » v. <i>Himalayense</i>	2.50
» » v. <i>sibiricum</i>	1.50
» » v. <i>Transylvanicum</i>	1.50
» <i>japonicum</i>	2.50
<i>Lepachys columnaris</i>	1.50
<i>Leptinella dioica</i> , de Nouvelle-Zélande	0.50
<i>Leucanthemum</i> , v. <i>Chrysanthemum</i>	
<i>Leucocyclus</i> , v. <i>Anacyclus</i>	
<i>Leucojum aestivum</i>	0.50
» <i>autumnale</i>	0.50
» <i>vernum</i> (nivéole)	0.50
* <i>Leucophyta Brownei</i> (<i>Corail d'argent</i>)	2.50
<i>Leuzea conifera</i>	0.50
<i>Levistichum officinale</i> . <i>Livèche</i>	0.50
<i>Lewisia rediviva</i>	2.50
<i>Liatris elegans</i>	1.—
» <i>graminifolia</i>	1.—
» <i>punctata</i>	1.—
» <i>pycnostachya</i>	1.—
» <i>scariosa</i>	1.—
» <i>spicata</i>	0.50
Charmant les composées de l'Amér. sept., à fl. roses, rouge carmin ou brunâtre, disposées en épis dressés; sol sain et léger; soleil ou mi-ombre; juin-septembre.	
<i>Libertia ixioides</i>	2.50
<i>Ligularia macroph.</i> <i>Senecio Ledebouri</i>	1.—
» <i>sibirica</i> . <i>S. Ligularia</i>	1.—
Grand. Compos. à grand feuillage, à fl. jaunes, disposées en grappes dressées; sol profond; juillet-septembre.	
<i>Lilium bulbiferum</i>	1.—
» <i>candidum</i>	0.50
» <i>carniolicum</i>	2.50
» <i>Chalcedonicum</i>	2.50
» <i>croceum</i>	0.50
» <i>dalmaticum</i>	2.50
» <i>Martagon</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	5.—
» <i>pomponium</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Lilium pyrenaicum. Martagon jaune</i>	1.50
<i>Linaria acutiloba</i>	0.50
† » <i>alpina</i>	0.50
» » à fl. roses	2.50
La <i>L. alp.</i> , l'une des plus gracieuses et des plus florifères d'entre les pl. de rocaïlles, réussit au soleil, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher; juin-septembre.	
» <i>anticaria</i>	0 50
» <i>cilicica</i>	1.—
† » <i>cymbalaria, Ruine de Rome</i>	0.50
(La douz. 2 fr.)	
» » à fl. blanches	1.—
» » <i>compacta</i>	0.50
» <i>dalmatica</i>	0.50
† » <i>hepaticæfolia</i>	0.50
» <i>italica</i>	0.50
» <i>macedonica</i>	0.50
† » <i>organifolia</i>	0.50
† » <i>pallida, Ruine de Naples</i>	0.50
» <i>Pancicii</i>	0.50
» <i>petræa</i>	0.50
» <i>pilosa</i>	2.50
» <i>purpurea</i>	0.50
» <i>repens, striata</i>	0.50
» <i>tristis</i>	0 50
† » <i>villosa</i>	2.50
Toutes sont des plantes de plein soleil; les espèces marquées d'une † préfèrent la muraille ou les fentes de rochers. La Ruine de Rome va bien à l'ombre.	
<i>Lindelofia afghanica</i>	2.50
» <i>spectabilis</i>	0.50
Boraginée à fl. d'un bleu superbe; mi-ombre; mai-juillet.	
<i>Linnæa borealis</i> (pl. d'ombre).	2.50
» <i>canadensis</i>	5.—
<i>Linosyris punctata</i>	1.—
» <i>villosa</i>	1.—
» <i>vulgaris</i>	0.50
Compos, à fl. jaune ardent, de 40 à 60 cm., très florif. et gracieuse; juillet-octobre; va partout, mais surtout au sec et au grand soleil.	
† <i>Linum alpinum</i> (bleu d'azur)	0.50
» <i>campanulatum</i>	1.—
» <i>capitatum</i> (grandes fl. jaunes)	1.—
» <i>flavum</i> (jaune clair)	0.50
» <i>glutinosum</i>	1.50
» <i>maritimum</i> (jaune clair).	1.—
» <i>monogynum</i>	2.50
» <i>narbonense</i>	1.—
» <i>orientale</i>	1.50
» <i>perenne</i>	0.50
» » <i>album</i>	0.50
» <i>salsoloides</i>	1.50
† » <i>sibiricum</i>	0.50
» <i>tenuifolium</i> (rose lilacé).	0.50
» <i>viscosum</i>	1.50

Pl. très florifères, surtout les espèces marquées d'une † qui donnent leurs abondantes fleurs bleues tout l'été durant et jusqu'en novembre. Port gracieux; soleil.

	Fr. Ct.
<i>Lippia canescens. L. repens</i>	0 50
Petite verveine minuscule et rampante.	
<i>Lithospermum fruticosum</i>	2.50
» <i>Gastoni</i> (bleu foncé, très rare).	2.50
» <i>graminifolium</i>	2.50
» <i>intermedium</i>	2.50
» <i>longiflorum</i> (jaune)	2.50
» <i>multiflorum</i> (jaune clair)	2.50
» <i>oleoides</i>	2.50
» <i>petræum</i> (<i>Echium</i>)	1.50
» <i>prostratum</i> (bleu superbe)	1.—
» <i>purpureo-cæruleum</i> (bleu intense)	0.50
Cette esp. seule demande l'ombre; c'est l'une des meill. pl. pour sous-bois. Les autres sont des pl. de rocaïlles et de soleil.	
» <i>rosmarinifolium</i>	2.50
» <i>Zollingeri</i>	2.50
<i>Lloydia alpina. L. serotina</i>	2.50
<i>Lobelia cardinalis</i> (type)	1.50
» <i>Kamtschatica</i>	1.50
» <i>siphylitica</i>	0.50
» » <i>alba</i>	0.50
» » <i>rosea</i>	0.50
<i>Lotus corniculatus</i>	0.50
<i>Lubinia lubinioides</i>	1.—
<i>Lunaria rediviva</i> (pl. d'ombre)	0.50
<i>Luzula albida</i>	0.50
» <i>lutea</i>	0.50
» <i>maxima</i> fol. var.	0.50
<i>Luzuriaga, v. Callixène</i>	
<i>Lychnis alpina</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» <i>Jovis</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» <i>fulgens</i> (écarlate vif)	0.50
» <i>Haageana</i>	0.50
» <i>Lagascæ</i> (pl. murale).	0.50
» <i>laponica</i>	0.50
» <i>Viscaria</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. doubles	1.—
Bonnes pl. florifères, faciles; soleil; mai-juillet. Voir en outre <i>Pl. vivaces</i> .	
<i>Lycopodium Selago</i>	2.50
<i>Lysimachia atropurpurea</i>	0.50
» <i>ciliata</i>	0.50
» <i>clethroides</i>	0.50
» <i>ephemerum</i>	0.50
† » <i>japonica</i>	0.50
» <i>Leschenaulti</i>	0.50
† » <i>nemorum</i> (excellent pour sous-bois).	0 50
† » <i>nummularia</i> (<i>Creeping Jenny</i>)	0.50
» <i>punctata</i>	0.50
» <i>racemosa</i>	1.—
» <i>thyrsiflora</i>	0.50
» <i>verticillata</i>	0.50
» <i>vulgaris</i>	0.50

Bonnes pl. florif., à fl. blanches, roses ou jaunes, propres à garnir les lieux frais et humides; les espèces marquées d'une † sont rampantes. Le *L. nummularia* est l'une des meill. pl. tom-



Un mur à Floraire.



Le mur du midi, à Floraire.



Une rocaille sous un toit, à Floraire.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
bantes ; au cœur de Londres, on le voit retomber des fenêtres de 1 et 2 étages et se couvrir de fl. jaune brillant, de mai en sept. ; très solide ; craint seulement le sec et le trop grand soleil.		<i>Mertensia virginica</i>	2.50
<i>Lythrum Salicaria</i>	0.50	Boraginées à fl. bleues ou lilas rose, fleurissant au printemps ; pleine terre, mi-soleil.	
» <i>virgatum</i>	1.—	<i>Meum athamanticum</i>	0.50
Pl. pour lieux humides, très florifères.		» <i>mutellinum</i>	0.50
<i>Malvastrum coccineum</i>	2.50	Petites Ombellifères alpines à feuell. très fin, extrêmement divisé et gracieux chez la première.	
<i>Mandragora officinalis</i>	2.50	<i>Michauxia campanuloides</i>	1.—
La mystérieuse Mandragore ! Parfaitement rustique au midi d'un mur.		» <i>Tschihatscheffi</i>	2.50
<i>Margyricarpus setosus</i>	1.50	* <i>Micromeria Douglasi</i>	1.—
<i>Marsdenia erecta</i>	1.50	Pl. aromatique, à feuillage délicieusement odorant, à croissance rapide, à port traînant et de couleur vert clair, très agréable.	
<i>Marrubium candidissimum</i>	1.50	» <i>filiformis</i>	0.50
» <i>sericeum</i>	0.50	» <i>græca</i>	0.50
» <i>velutinum</i>	1.50	» <i>montana</i> , <i>Satureya montana</i>	0.50
* <i>Matthiola fenestralis</i>	1.—	» <i>piperella</i>	0.50
» <i>fragrantissima</i>	1.—	» <i>rupestris</i>	0.50
» <i>Oyensis</i>	1.—	Petites Labiées propres pour les rochers ensoleillés ; été ; <i>M. rupestris</i> , jolie espèce à nombreuses fl. blanches, est très recommandable.	
» <i>pedemontana</i> (rarissime)	2.50	<i>Mimulus alpinus</i>	1.—
» <i>sinuata</i>	1.—	» <i>Burneti</i> (fl. jaune brun)	0.50
» <i>tristis</i>	2.50	» <i>cardinalis</i> (rouge écarlate)	0.50
» <i>Valesiaca</i>	2.50	» <i>cupreus</i> (rouge brun ardent)	0.50
<i>Mayanthemum bifolium</i>	0.50	» <i>luteus</i> (jaune vif)	0.50
Muguet nain des bois.		* » <i>moschatus</i> , <i>Herbe au musc</i>	0.50
» <i>canadense</i>	2.50	» <i>primuloides</i>	2.50
* <i>Mazus pumilio</i>	0.50	» <i>radicans</i>	2.50
<i>Meconopsis cambrica</i> . <i>Pavot jaune des Pyrénées</i>	0.50	» <i>repens</i>	2.50
» à fl. orangées	0.50	Belles et brillantes Scrophularinées à fl. généralement grandes et belles ; juin-octobre ; humidité et mi-ombre ; place abritée contre grands froids. Le <i>M. primuloides</i> a de très nombreuses petites fl. jaune vif, extrêmement élégantes ; il lui faut, chez nous, une légère couverture.	
» à fl. pleines	1.—	<i>Mirabilis multiflora</i>	1.—
» <i>integrifolia</i>	2.50	<i>Mitchella repens</i>	2.50
» <i>nepalensis</i>	2.50	<i>Mitella diphylla</i>	0.50
» <i>petiolata</i> (<i>Stylophorum</i>)	1.—	» <i>pentandra</i> . (<i>Drummondia</i>)	0.50
» <i>Wallichiana</i>	2.50	<i>Mœhringia Grisebachii</i>	2.50
Ombre et fraîcheur ; très florifères.		» <i>dasiphylla</i>	2.50
<i>Megasea</i> , v. <i>Saxifraga</i> .		Très jolie esp. des rochers, formant des pelotes serrées.	
<i>Melica altissima</i> (jolie graminée d'ornement)	0.50	» <i>glaucovirens</i>	2.50
» <i>nutans</i>	0.50	» <i>muscosa</i>	0.50
<i>Melissa officinalis</i> , <i>Mélisse</i>	0.50	Délicieuse petite Cariophyllée à feuell. très fin, à fl. blanches en croix, très nombreuses ; mai-octobre ; fissures d'un mur ou rocher, ombre ou mi-soleil ; fraîcheur ; préfère le calcaire.	
<i>Melitis melissophyllum</i>	0.50	» <i>papulosa</i> (feuillage bleuâtre)	1.—
<i>Mentha japonica</i>	0.50	» <i>pendula</i>	1.—
» <i>piperita</i> , <i>menthe poivrée</i>	0.50	» <i>polygonoides</i>	0.50
» <i>Pulegium</i>	0.50	<i>Molopospermum cicutarium</i>	0.50
» <i>Requienii</i> , <i>Thymus corsicus</i>	0.50	<i>Molucella spinosa</i> (rare)	2.50
Plante de rocaille, pour mi-ombre.		<i>Monarda</i> , v. pl. vivaces.	
» <i>rotundifolia</i>	0.50	<i>Morine Coulteriana</i>	1.—
» <i>viridis</i>	0.50	» <i>longifolia</i>	1.—
<i>Menziesia empetrifolia</i>	2.50		
» <i>polifolia</i>	2.50		
<i>Mertensia ciliata</i>	1.—		
» <i>echioides</i>	2.50		
» <i>lanceolata</i>	1.—		
» <i>oblongifolia</i>	1.—		
» <i>paniculata</i>	1.—		
» <i>primuloides</i>	1.—		
» <i>sibirica</i>	1.—		

	Fr. Ct.
<i>Morine persica</i>	1. —
Superbes pl. à l'aspect d'Acanthes; feuillage ornemental qui, froissé, répand odeur de citron; fl. roses et blanches, en épis dressés très beaux. Juin-septembre. Sol profond, soleil.	
<i>Morisia hypogæa</i>	1. 50
Très jolie pl. des rochers sardes à fl. sessiles, d'un jaune brillant.	
<i>Muhlenbeckia axillaris</i>	1. —
» <i>complexa</i>	1. —
» <i>nana</i>	1. —
<i>Mulgedium alpinum</i>	0. 50
» <i>Bourgæi</i>	1. —
» <i>glabrum</i>	1. —
» <i>macrophyllum</i>	0. 50
» <i>Plumieri</i>	0. 50
» <i>tataricum</i>	1 50
Composées à fl. bleu violacé, assez semblables à celles de la Chicorée sauvage, très nombreuses, en grappes ou panicules plus ou moins étalés, décoratifs; mi-ombre; pl. solides; mai-sept. Le <i>M. Bourgæi</i> est une pl. superbe que nous avons introduite du Caucase et qui donne des milliers de capitules bleus.	
* <i>Musa japonica</i>	5. —
<i>Myosotis alpestris</i>	0. 50
» » à fl. blanches	0 50
» <i>australis</i> , à fl. jaunes.	2. 50
» <i>lithospermifolia</i>	1. —
» <i>palustris</i>	0. 50
» » var. <i>sempervirens</i>	0. 50
<i>Myosotis pygmæa</i>	1. —
» <i>pyrenaica</i>	0. 50
» <i>Reichsteineri</i>	0. 50
» <i>rupicola</i>	1. —
Lieux frais et mi-ombragés.	
<i>Myrrhis odorata</i> , <i>Myrrhe</i>	0. 50
Ombellifère fortement anisée, à racines très odorantes, prop. à garnir lieux frais et ombragés.	
<i>Narcissus biflorus</i> . (La douz. 2 fr.)	0. 50
» <i>incomparabilis</i>	0. 50
» <i>Jonquilla</i> . (La douz. 2 fr.)	0. 50
» <i>juncifolius</i>	0. 50
» <i>Leedsii</i>	0. 50
» <i>moschatus</i>	0. 50
» <i>odorus</i>	0. 50
» <i>poëticus</i> (La douz. 2 fr.)	0 50
» <i>pseudo-narcissus</i> (La douz. 2 fr.)	0. 50
<i>Nardosmia fragans</i> , voir <i>Petasites</i>	
<i>Nepeta grandiflora</i>	0. 50
» <i>macrantha</i>	0. 50
» <i>Mussini</i>	0. 50
» <i>nepetella</i>	0. 50
» <i>nuda</i>	0. 50
Labiales aromatiques et florifères; sec et soleil.	
* <i>Nierembergia rivularis</i>	0 50
Excellente petite pl. naine et rampante, aux grandes fl. blanches se succédant pendant tout l'été et jusqu'en novembre.	

	Fr. Ct.
<i>Nigritella</i> , voir <i>Orchidées</i>	
<i>Obeliscaria pinnata</i>	1. —
* <i>Odontospermum sericeum</i>	2. 50
<i>Oenothera cæspitosa</i>	2 50
» <i>brachycarpa</i>	1 50
» <i>densiflora</i>	2. 50
» <i>Fraseri</i>	0. 50
» <i>fruticosa</i>	0 50
† » <i>missouriensis</i> (<i>macrocarpa</i>)	0. 50
† » <i>pumila</i>	0. 50
† » <i>rosea</i>	0. 50
† » <i>serrulata</i>	1. 50
» <i>speciosa</i>	0. 50
Les Primevères du soir sont de vigoureuses et bonnes pl. viv. et de roch.; les esp. marquées d'une † sont naines et cespitueuses; les autres atteignent 25 à 60 cent.; toutes sont très florifères. <i>O. missour</i> est la meill. des pl. rampantes, grandes fl. jaune clair, mai-octobre; <i>O. speciosa</i> , à très gr. fl. blanc rosé à centre jaune, est une merveille de grâce et d'élégance, très solide et plutôt envahissante. <i>O. cæspitosa</i> offre de grandes fl. blanc pur, rose extérieurement, et très agréablement odorantes. Toutes réclament soleil ou mi-soleil et vont dans tous les sols.	
<i>Omphalodes Cappadocica</i>	5. —
» <i>Luciliæ</i>	2. 50
L'O. <i>Luciliæ</i> est l'une des plus belles pl. que nous ait donné l'Orient. Sa grande fl. d'un bleu opalin est l'une des merveilles des rocailles où il lui faut une position à demi-ombre et la fente d'un mur ou d'un rocher.	
» <i>Luciliæ alba</i> (à fl. blanc pur)	2. 50
» <i>nitida</i> , <i>O. Lusitanica</i>	2. 50
» <i>verna</i>	0. 50
» » à fl. blanches	0. 50
<i>Ononis cenisia</i>	1. —
» <i>fruticosa</i>	1. 50
» <i>Natrix</i>	1. 50
» <i>rotundifolia</i>	1. —
<i>Onopordon bracteatum</i>	0. 50
Superbe chardon aux feuilles argentées à isoler dans les pelouses.	
» <i>albo-roseum</i>	2. 50
» <i>armena</i>	2 50
» <i>Bourgæi</i>	1. 50
<i>Onosma bracteatum</i>	2. 50
» <i>echioides</i>	2. 50
» <i>Helveticum</i>	2. 50
» <i>pallidum</i>	2. 50
» <i>petræum</i>	2. 50
» <i>poliphyllum</i>	2. 50
» <i>Rhodopea</i>	2. 50
» <i>rupestris</i>	2. 50
» <i>sericeum</i>	2 50
» <i>stellulatum</i>	2. 50
» <i>tauricum</i>	1. 50
» <i>Thompsoni</i>	2. 50
» <i>tinctorum</i>	2. 50
Boraginées à fl. jaunes; grand soleil et sec. L'O. <i>sericeum</i> est une vraie merveille que nous offre l'Orient; pl. formant des touffes de ver-	

Fr. Ct.

dure soyeuse argentée qui se recouvrent, en été, de belles grappes scorpioides de fleurs orangé vif. L'O. taurica est également très florifère et donne tout l'été ses abond. fl. jaune vif. Cult. des plus faciles.

<i>Ophiopogon Jaburan</i>	0 50
» (<i>Liriope</i>) <i>spicatum</i>	0 50
<i>Opuntia</i> , voir <i>Cactées rustiques</i> .	
<i>Orchis</i> , voir <i>Orchidées rustiques</i> .	
<i>Origanum Dictamnus</i>	2 50
» <i>hybridum</i>	2 50
» <i>pulchrum</i>	2 50
» <i>sipyleum</i>	2 50

Jolies Labiées au feuil. aromatique, très parfumé chez *pulchrum*, qui a de belles fl. roses entourées de bractées vivement colorées. Soleil et sec. Juin-octobre.

<i>Ornithogalum nutans</i>	0 50
» <i>pyrenaicum</i>	0 50
» <i>umbellatum</i>	0 50
<i>Orobis canescens</i>	1.—
» <i>aurantius</i>	1.—
» <i>lathyroides</i>	1.—
» <i>luteus</i>	1.—
» <i>niger</i>	0 50
» <i>tuberosus</i>	1.—
» <i>vernus</i>	0 50
» à fl. blanches	2 50

Ostrowskya magnifica 2 50

* *Othonna cheirifolia* 0 50

* *Ourisia coccinea* 2 50

Oxalis acetosella, *Pain de coucou* 0 50

» var. *rosea* 0 50

» *atrosanguinea* 0 50

» *cernua* 0 50

» *enneaphylla* 2 50

» *tetraphylla* 0 50

» *tropæoloides* 0 50

Oxybaphus nyctaginus 0 50

Oxycoccus macrocarpum 2 50

» *vulgaris* 2 50

Oxyria dygina 0 50

Oxytropis Baikalensis 2 50

» *campestris* 1 50

» *foetida* 1 50

» *Halleri* 1 50

» *lapponica* 2 50

» *montana* 2 50

» *ochroleuca* 2 50

» *pilosa* 1 50

» *pyrenaica* 2 50

» *sordida* 1 50

» *strobilacea* 1 50

» *sulfurea* 1 50

» *tyroliensis* 2 50

Culture assez difficile; soleil, sol profond et caillouteux.

Pachysandra procumbens 2 50

» *terminalis* 1.—

» fol. var. 1 50

Pl. basses et rampantes, à feuillage décoratif et persistant; mi-ombre.

Fr. Ct.

Pachystigma Canbyi 2 50

» *myrsinites* 2 50

Pæderota Ageria (fl. jaunes) 1 50

» *Bonarota* (fleurs bleues) 1 50

Pæonia lutea 5.—

Pour les autres *Pæonia*, voir *Pl. vivaces*.

Pancratium maritimum 1.—

Papaver alpinum 0 50

» » var. *Burserianum* 0 50

» » var. *flaviflorum* 0 50

» » var. *Rhæticum* 0 50

» » à fl. rose tendre 1.—

» » à fl. rouge vif 1.—

» » à fl. laciniées 1.—

Délicieuses petites pl. des pierriers calcaires qui prod. des cent. de fl. légèrement odor., très gracieuses, de mai en automne; fentes roch. ou mur ou pl. terre, au mi-sol.; se resème naturellement si l'on a soin de ne pas déranger le sol alentour.

» *atlanticum* (très florif.; rouge brique)

» *croceum* 0 50

» *Heldreichii* 0 50

» *nudicaule* 0 50

» » à fl. blanches 0 50

» » à fl. rouges 0 50

Voisin du *P. alpinum*, plus fort et plus solide; fl. très abond.; mai-automne; lieux frais; l'une des meill. pl. pour rochers et pl. terre à mi-ombre.

» *pilosum* 0 50

» *pyrenaicum* 1 50

» *radicatum* 1.—

» *rupifragum* 0 50

» *spicatum* 0 50

» *strictum* 0 50

Tous les Pavots vivaces sont d'excell. pl. d'ornement, fleurissant abondamment et de cult. extra facile.

Pour les espèces de grandes dimensions voir pl. vivaces.

Paradisica Liliastrium. *Lis de St-Bruno* 0 50

» var. *major* 0 50

Pardanthus chinensis 0 50

Paris quadrifolia. *Parisette*. (*Ombre*) 0 50

Parnassia alpina 1 50

» *asarifolia* 2 50

» *caroliniana* 2 50

» *Laxmanni* 2 50

» *mysorensis* 2 50

» *palustris* 0 50

Lieux frais et humides.

Parochetus communis 1 50

Paronychia argentea 0 50

» *capitata* 0 50

» *Kapella* 0 50

» *nivea* 0 50

» *polygonifolia* 0 50

Petites pl. saxatiles et ramp., au port absolum. nain, aux fl. insignif. entourées de bractées brillantes et souvent très belles; sol. et sec.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Parrya Menziesii	2.50	Phlox amœna	0.50
Crucifères très robustes, voisines des Matthiola, à fl. lilas foncé.		» Caroliniana	1.—
Passerina nivalis	2.50	» divaricata (<i>P. Canadensis</i>)	0.50
Patrinia gibbosa	1 —	» » à fl. blanches	0.50
Patrinia heterophylla	1.—	† » Douglasi	1.50
» rupestris	1.—	» Laphami	0.50
» scabiosæfolia	0.50	† » nivalis	0.50
Sortes de Valérianes à fl. généralement jaunes et très curieuses; juillet-octobre; mi-soleil.		Phlox ovata	0.50
Peganum Harmala	2.50	» paniculata (type)	0.50
* Pelargonium Endlicherianum	2.50	» » variétés, voir <i>Pl. vivaces</i> .	
Grandes fl. rose carné vif; la seule esp. rus- tique chez nous.		» pilosa	1 50
Pelteria alliacea	0.50	† » reptans	0.50
Penthorum sedoides	0.50	† » setacea	0.50
Pericome caudata	2.50	» » à fleurs blanches	0.50
Pentstemon , voir <i>Pl. vivaces</i> .		» » G. F. Wilson	0 50
Perovskya atriplicifolia	2.50	† » stellaria	0.50
Très belle pl. arbustive à longs épis de fl. de La- vandes, à feuilles argentées très aromatiques.		» » var. <i>purpurea</i>	0.50
Petalostemon candidus	1.50	† » subulata	0.50
» teuifolius	1.50	» » var. <i>Nelsoni</i>	0.50
Petites Papillonacées suffrutesc. propres à garnir roch.; soleil.		» » var. <i>vivid</i>	0.50
Petasites albus	0.50	» suffruticosa	1.—
» fragrans , <i>Héliotrope d'hiver</i>	0.50	» verna	0.50
Fleurit tout l'hiver en plein air s'il est à l'abri de la neige; parfum intense de vanille; lieux abrités contre gros soleil et trop grands froids; envahissant.		Les esp. marquées d'une † sont absolument naines et rampantes; abondante floraison en rose, rouge carmin ou blanc; avril-mai; soleil.	
» giganteus	1.—	Phygelius capensis	1.—
Feuilles pouvant atteindre de gigantesques di- mensions; mi-ombre.		Physalis Alkekengi , <i>Coqueret</i> , <i>Alkékenge</i>	0.50
» niveus	0.50	» Bunyardi	0.50
» ochroleucus	0.50	» Franchetti	0.50
» officinalis (humide et frais)	0.50	Très intér. Solanées dont la baie, une cerise rouge, est entourée d'un calice renflé et gonflé qui forme autour du fruit une grande vésicule comme une lanterne vénitienne d'un rouge brique vif, écarlate très ardent chez Franchetti; soleil; pl. envahissantes.	
» Reuterianus (feuell. avant les fl.)	0.50	Physaria dydimocarpa	2.50
Tous ces Tussilages sont envahissants et propres à garnir et à orner, grâce à leur grand et beau feuell., les lieux frais et mi-ombragés.		Physochlaina orientalis	1.50
Petrocallis , v. <i>Draba pyrenaica</i> .		Solanée à floraison très précoce; fl. d'un violet foncé, métallique.	
Phaca alpina	1.50	Physostegia , voir <i>Pl. vivaces</i> .	
» astragalina	1.50	Phyteuma austriacum	1.—
» australis	1.50	» betonicæfolium	1 —
» frigida	1.50	» caresiæ	1.—
Phalaris arundinacea , v. fol. var. (<i>Herbe vaudoise</i>)	0.50	» Charmelli	0.50
Philesia Magellanica	2.50	† » comosum	2.50
Phlomis cachemiriana	1 —	» globulariæfolium	2.50
» chrysophilla	1 50	† » hemisphæricum	1.50
» fruticosa	1.50	» limonifolium	0.50
» Samia	0.50	» nigrum	1.50
Grandes Labiées de soleil; le <i>P. Samia</i> est une excellente pl. vivace pour grands rochers ou pleine terre, aux grands épis dressés; fleurs jaune ocre et orangé. Mai-août.		» orbiculare	0.50
		† » pauciflorum	2.50
		» Scheuchzeri	0.50
		» spicatum , <i>Raiponce</i>	0.50
		» » à fleurs bleues	0.50
		Campanulacées à fl. génér. bleues, blanches chez le <i>spicatum</i> de nos pays, très jolies et cu- rieuses. Les espèces marquées d'une † sont saxatiles et de soleil; le <i>P. comosum</i> exige la fente d'un roch. calc. en plein soleil. Prin- temps et été.	

Fr. Ct.	Fr. Ct.	Fr. Ct.
0.50	Pinguicula alpina, <i>Grassète</i> (fl. blanche)	0.50
1.—	» grandiflora (bleu et blanc)	1.50
0.50	» longifolia (bleu et blanc)	1.50
0.50	» Reuteri (rose et blanc)	1.50
1.50	» vulgaris (violet foncé)	0.50
0.50	Pl. insectivores, à feuell. visqueux qui attire, prend et absorbe les mouches; racines presque nulles, à l'automne les feuilles disparaissent et la vie de la plante est renfermée dans un pseudobulbe qu'il faut surveiller afin que les oiseaux ne le mangent pas et qu'il faut enterrer dans le sol moussu où on le cultive. Humidité constante et, si possible, eau suintant au travers du sol ou de la roche; mai-août.	
0.50	Plagiag. ageratifolius	0.50
0.50	Plantago alpina	0.50
0.50	» argentea	0.50
0.50	» Cynops	0.50
0.50	» montana	0.50
0.50	Platycodon, voir <i>Pl. vivaces</i> .	
1.—	Plumbago Larpentæ	0.50
0.50	Plante basse et traçante, à fl. d'un bleu intense, assez semblable au <i>Gentiana verna</i> ; mi-omb.; août-novembre.	
1.—	Podanthum lobelioides	1.—
0.50	Podophyllum Emodi	1.—
0.50	» peltatum	1.—
0.50	Polemonium album	0.50
0.50	» cœruleum, <i>Valériane grecque</i>	0.50
0.50	» » à fl. blanches	0.50
0.50	» confertum	2.50
0.50	» dissectum	1.—
0.50	» flavum, à fl. jaunes	0.50
0.50	» foliosissimum	2.50
0.50	» grandiflorum	0.50
0.50	» Himalayense	0.50
0.50	» humile	0.50
0.50	» molle	1.50
0.50	» pauciflorum, à fleurs jaunes	0.50
0.50	» pulchellum	0.50
0.50	» reptans	0.50
0.50	» Richardsoni	0.50
0.50	Les Polémoines sont de bonnes pl. viv. de pl. terre ou de rocaill. fleurissant de mai en septembre, à fl. généralement bleues, odorantes, disposées en panicules dressées; les <i>P. humile</i> , <i>pulchellum</i> et <i>reptans</i> sont nains ou rampants; fraîcheur; soleil, mi-soleil ou ombre.	
0.50	Polygala Chamæbuxus	1.—
0.50	» Rhodoptera. <i>b</i>	1.50
0.50	Charmante var. à fl. carmin vif et jaune, des Alpes italiennes.	
0.50	» Vayredæ	2.50
0.50	Très belle esp. espagnole parfaitement rustique, à fl. carmin vif et jaune, à f. étroites.	
0.50	Polygonatum biflorum	1.—
0.50	» elegantissimum	1.50
0.50	» multiflorum, <i>Sceau de Salomon</i>	0.50
0.50	» roseum	1.50
0.50	» verticillatum	0.50
0.50	» vulgare	0.50
0.50	Polygonum affine, <i>P. Brunonis</i>	0.50
0.50	Pl. de sous-bois, propre à garnir les lieux frais.	
0.50	» alpinum	0.50
0.50	» amplexicaule	0.50
0.50	» Bistorta, <i>Bistorte</i>	0.50
0.50	» bistortioides	2.50
0.50	» Brunonis	0.50
0.50	* » capitatum	0.50
0.50	» Emodi	2.50
0.50	» Ephedroides (belle espèce corse, à pord d'Ephedra)	2.50
0.50	» romanum (pl. traînante)	0.50
0.50	» vacciniifolium	2.50
0.50	» viviparum	0.50
0.50	Pour les plus grandes espèces voir <i>Pl. vivaces</i> .	
0.50	Potentilla alba (fl. blanches)	0.50
0.50	» alchemilloides (blanc; feuil arg.)	1.—
0.50	» alpestris (jaune brillant)	0.50
0.50	» ambigua (jaune vif)	0.50
0.50	» anserina (jaune; feuillage arg.)	0.50
0.50	» apenninea	0.50
0.50	» argentea (jaune)	0.50
0.50	» argyrophila (rouge écarlate ou jaune)	0.50
0.50	» atrosanguinea	0.50
0.50	† » aurea (jaune vif)	0.50
0.50	† » Baldensis (jaune)	1.—
0.50	» bifurea	0.50
0.50	» carniolica (blanc et rose)	0.50
0.50	† » caulescens (blanc)	0.50
0.50	» chrysantha (jaune pâle)	0.50
0.50	† » cinerea (jaune)	0.50
0.50	† » Clusiana (blanc)	1.50
0.50	» Dahurica	2.50
0.50	† » delphinensis (jaune)	0.50
0.50	» Fenzlii (délicat feuillage argenté)	2.50
0.50	» Formosa	0.50
0.50	» fragiformis	1.—
0.50	» Friedrichseni (<i>Dahurica</i> × <i>Fru-</i> <i>ticosa</i>)	2.50
0.50	† » frigida (jaune)	1.50
0.50	» fruticosa (jaune; esp. arboresc.)	1.—
0.50	» » var. arbuscula	2.50
0.50	» fulgens	2.50
0.50	» geranioides (du Liban)	2.50
0.50	» glandulosa (jaune)	1.—
0.50	» gracilis (jaune vif)	0.50
0.50	» grammopetala	2.50
0.50	» grandiflora (jaune d'or)	0.50
0.50	» Hippiana (jaune, feuil. arg.)	0.50
0.50	» hybrida (<i>alba</i> × <i>fragrariactrum</i>)	0.50
0.50	» hybrida, voir <i>Pl. vivaces</i> .	
0.50	» Kurdica (jaune)	0.50
0.50	» libanotica	1.—
0.50	» maculata (jaune vif)	0.50
0.50	» micrantha	2.50
0.50	† » minima (jaune)	1.—
0.50	» montenegrina	0.50
0.50	» multifida (jaune)	0.50
0.50	» Nepalensis (rose intense)	0.50
0.50	» nitida (rose tendre)	1.—
0.50	» nivalis (blanc)	1.50

	Fr. Ct.
† <i>Potentilla nivea</i> (jaune)	0.50
» <i>pedemontana</i> (jaune vif)	0.50
» <i>peduncularis</i> (jaune)	2.50
» <i>petiolulata</i> (blanc, saxatile)	1. —
† » <i>pygmæa</i>	2.50
» <i>pyrenaica</i> (jaune)	0.50
» <i>recta</i> (jaune pâle)	0.50
» <i>reptans</i> (var. fl. pl., jaune vif)	0.50
» <i>rupestris</i> (blanc)	0.50
» <i>Salesoviana</i> (blanc rose)	2.50
» <i>sanguisorbæfolia</i> (jaune)	2.50
† » <i>saxifraga</i> (fentes des rochers, soleil)	2.50
» <i>speciosa</i> (blanc jaunâtre)	2.50
» <i>taurica</i> (jaune)	2.50
» <i>tormentilla</i> (jaune)	0.50
» <i>tridentata</i> (blanc)	1.50
» <i>Valderia</i> (feuill. grisâtre)	1.50

Les espèces marquées d'une † sont basses, caespitueuses ou rampantes. Les *Potentilles* sont de bonnes pl. gracieuses et florifères, de cult. génér. facile; été et automne; les esp. à feuillage argenté, qui brunit souvent à l'automne et se bronze délicatement, sont très décoratives.

<i>Pratia angulata</i>	2.50
» <i>arenaria</i>	2.50
» <i>begoniifolia</i>	2.50
<i>Prenantes purpurea</i> (sous bois)	0.50

PRIMEVÈRES

I. GROUPE DES ESPÈCES SAXATILES :

<i>Primula allionii</i>	2.50
-----------------------------------	------

Fortes pl. bien enracinées, prêtes à fleurir; cette rare et belle esp. aime les fentes de rochers abritées contre la pluie et l'humidité.

» <i>alpina</i>	2.50
» <i>arctotis</i>	2.50
» <i>Auricula</i> (La douz. 5 fr.)	0.50

Le type des *Auricules* de jardins à fl. jaune vif, très odorantes.

» <i>Auricula</i> , var. <i>ciliata</i>	2.50
» » var. <i>Dusty Miller</i>	2.50
» » var. <i>gigantea</i>	2.50
» » var. <i>marginata</i>	2.50
» <i>Balbisii</i>	2.50
» <i>bellunensis</i>	2.50
» <i>Berninæ</i>	5. —
» <i>calycina</i>	1.50
» <i>carniolica</i>	1.50
» <i>Clusiana</i>	1. —
» <i>commutata</i>	2.50
» <i>Cottia</i> (rarissime et très belle)	2.50
» <i>crenata</i>	2.50
» <i>decora</i>	2.50
» <i>deorum</i>	2.50
» <i>discolor</i>	2.50
» <i>Dumoulini</i>	2.50
» <i>Facchini</i>	1.50
» <i>Flørkeana</i>	2.50
» <i>glutinosa</i>	1. —

	Fr. Ct.
<i>Primula Goeblii</i>	2.50
» <i>Heerii</i>	2.50
» <i>hirsuta</i> (La douz. 5 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>Huteri</i>	2.50
» <i>hybrida</i> (<i>minima</i> × <i>glutinosa</i>)	2.50
» <i>integrifolia</i>	0.50
» <i>Kernerii</i>	2.50
» <i>Kitaibaliana</i>	2.50
» <i>latifolia</i> (graveolens)	1. —
» <i>marginata</i> (Primevère en arbre)	1. —
» <i>minima</i>	0.50
» <i>monacensis</i>	2.50
» <i>nivea</i> (<i>viscosa alba</i>)	2.50
» <i>obovata</i>	2.50
» <i>Enensis</i>	1.50
» <i>Palinuri</i> (des Abruzzes)	5. —
» <i>Paryi</i>	2.50
» <i>pedemontana</i>	2.50
» <i>Portæ</i> , rare	5. —
» <i>Portenschlagiana</i>	2.50
» <i>pubescens</i>	1.50
» <i>pumila</i>	2.50
» <i>Rhætica</i>	2.50
» <i>serrata</i>	2.50
» <i>similis</i>	2.50
» <i>spectabilis</i>	1.50
» <i>Sueptitzi</i>	2.50
» <i>tirolensis</i>	2.50
» <i>Veninæ</i>	2.50
» <i>venusta</i>	2.50
» <i>villosa</i>	2.50
» <i>viscosa</i> , voir <i>P. hirsuta</i>	
» <i>Vochinensis</i>	2.50
» <i>Wulfeniana</i>	1. —

Tous ces *Pr.* fleurissent de mars en mai et préfèrent une position horizontale, dans les fentes d'un mur ou d'un rocher, au mi-soleil.

II — GROUPE DES ESPÈCES PALUDÉENNES :

<i>Primula algida</i>	1.50
» <i>auriculata</i>	2.50
» <i>Belesiana</i>	2.50
» <i>Bulleyana</i>	2.50
» <i>Cockburniana</i>	2.50
» <i>darialica</i>	1.50
» <i>farinosa</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» » <i>alba</i>	2.50
» <i>frondosa</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» <i>grandis</i>	2.50
» <i>involuta</i>	1. —
» <i>japonica</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» <i>Kaufmanniana</i>	2.50
» à fl. blanches	0.50
» » marmorées	1. —
» <i>longiflora</i>	1. —
» <i>luteola</i>	1.50
» <i>magellanica</i>	1. —
» <i>pulverulenta</i>	2.50
» <i>Poissonni</i>	0.50
» <i>rosea</i>	1. —

	Fr. Ct.
Primula rosea, var. <i>grandiflora</i>	1.50
» » var. <i>splendens</i>	2.50
» <i>Scottica</i>	2.50
» <i>Sikkimensis</i>	1.—
» » var. <i>grandiflora</i>	2.50
» <i>sibirica</i>	2.50
» <i>stricta</i>	1.50
» <i>Veitchii</i>	2.50
» <i>Warei</i>	1 —

Ces espèces préfèrent un sol poreux et légèrement humide, une situation fraîche et mi-ombragée.

III. GROUPE DES ESPÈCES SILICICOLES ET DE CULTURE SPÉCIALE :

» <i>capitata</i> (vrai)	2.50
» <i>erosa</i>	2.50
* » <i>floribunda</i>	1.—
» <i>Forbesi</i>	1.—
» <i>Juliae</i>	5.—
* » <i>Kewensis</i>	1.—
* » <i>megasæfolia</i>	2.50
* » <i>malacoides</i>	1.—
» <i>mollis</i>	2.50
» <i>munroi</i>	2.50
» <i>nivalis</i>	2.50
» <i>patens</i>	2.50
» <i>purpurea</i>	5.—
» <i>Sieboldi</i> . <i>Cortusoides amœna</i>	1.—
» » var. à fl. blanches	1.50
» » » fl. bleues	1.50
» » » fl. rose carmin	1.50
» » » fl. lilas	1.50
» » » fl. blanche intér. et rose extér.	1.50
» » » fl. blanc strié rose	1.50
» » » fl. laciniées	1.50

Il faut à cette catégorie un sol dépourvu de calcaire, terre de feuilles et sable granitique et une exposition mi-ombragée.

IV. GROUPE DES ESPÈCES DE PLEINE TERRE :

» <i>acaulis</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» » var. à fl. bleues	2.50
» » var. <i>nigra</i>	2.50
» <i>amœna</i>	2.50
» <i>Carpathica</i>	0.50
» <i>Cachemiriana</i>	0.50
» <i>Columnæ, suaveolens</i>	0.50
» <i>cortusoides</i>	0.50
» <i>denticulata</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. liliacées	1.—
» <i>elatior</i> (<i>Oxlip</i>)	0.50
» <i>macrocalyx</i>	0.50
» <i>officinalis</i> (<i>Cowslip</i>)	0.50
» » var. <i>duplex</i>	0.50
» <i>Siebthorpi</i>	1.—
» <i>veris</i> . <i>Primevères des jardins</i>	0.50

	Fr. Ct.
Primula veris, variétés de toutes couleurs, formes et dimensions	0.50
(La douz 5 fr.)	

Prunella grandiflora	0.50
» laciniata (fl. blanches)	0.50
» » à fl. rouge vif	1.—
» <i>pyrenaica</i>	0.50

Labiées rampantes et propres à garnir les lieux secs.

Psoralea acaulis	1.50
* » bituminosa	1.—
» macrostachya	1.50
Pterocephalus Parnassi	0.50
Pulmonaria angustifolia	0.50
» azurea	0.50
» mollis	0.50
» rubra (fl. vermillon)	1.50
» styriaca	1.50
Putoria calabrica	2.50
Pycnanthemum lanceolatum (aromat.)	0.50
Pyrethrum argenteum	2.50
» densum	1.—
» macrophyllum (très grande esp.)	0.50
» parthenifolium	0.50
» roseum	0.50
» Tschihatscheffii	0.50

Les P. argenteum et densum ont le feuillage finement divisé et d'un gris d'argent, rappelant celui des Armoises alpines. Le P. Tschihatscheffii est la meilleure pl. gazonnante pour les lieux arides et secs.

Pyrola rotundifolia	1.—
» secunda	1.—
» uniflora	2.50

Pour bien réussir ces plantes délicieuses qui recherchent l'ombre des bois à f. caduques ou les pentes situées au nord, il faut un sol composé de terreau et de feuilles, de terre franche et de sable et l'ombre. Nous les réussissons parfaitement dans nos terrines de Sphagnum.

Ramonda Nataliæ	1.50
» <i>pyrenaica</i>	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>serbica</i>	1.50

Le plus beau est certainement le R. pyrenaica; tous exigent les fentes rocheuses à l'ombre et une humidité constante aux racines.

RENONCULES

1. GROUPE DES ESPÈCES DE PLEINE TERRE :

† Ranunculus aconitifolius	0.50
» » à fl. pleines	1.—
» caucasicus	0.50
» carpathicus	0.50
» <i>Ficaria alba</i>	2.50
» <i>Illyricus</i>	0.50
» <i>hybridus</i>	2.50
» <i>millæfoliatus</i>	1.50
» <i>monspeliacus</i>	1.50

	Fr. Ct.
Ranunculus montanus	0.50
† » platanifolius	0.50
» repens fl. pl. (<i>bouton d'or</i>)	0.50
» Villarsii	0.50

Les esp. marquées d'une † sont à fl. blanches.

II. ESPÈCES SAXATILES OU DES HAUTS SOMMETS A PORT BAS :

» alpestris	0.50
» alatavicus	2.50
» amplexicaulis	1.—
» (Callianthemum) anemonoides	2.50
» bilobus	1.50
» crenatus	1.50
» Escorialensis	2.50
» glacialis	1.—
» » var. algidus	1.50
† » gramineus	1.—
» hybridus	1.—
» Kernerianus	2.50
» majellensis	2.50
» parnassifolius	1.—
» pygmæus	2.50
» pyrenæus	0.50
» (Callianthemum) rutifolius	1.—
» Seguii	1.50
† » Thora (à feuillage orbiculaire, très curieuse)	0.50
» Traunfellneri	2.50
» uniflorus	2.50

Toutes sont à fl. blanches ou roses, sauf celles marquées d'une † qui sont à fl. jaunes; le R. parnassifolius a de grandes fl. d'un blanc brillant et des f. entières, très belles; rocaille; mi-soleil; avril-juin.

III. ESPÈCES AQUATIQUES OU PALUDÉENNES :

» cymbalaria	0.50
» Lingua	0.50
» reptans	1.—
Rehmannia angulata	1.50
» chinensis	1.50
Reseda complicata	0.50
» glauca	0.50
» sesamoides	0.50
Rhaponticum cynarioides	1.50
» pulchrum	1.50
Rhazia orientalis	2.50
Belle et curieuse pl. de la famille des pervenches, à fl. d'un violet rougeâtre.	
Rhodiola linifolia	0.50
» » var. rubra	1.—
» rosea, <i>Sedum Rhodiota</i>	0.50

Rhododendron chamæcistus	5.—
» ferrugineum (pl. fortes)	5.—

Absolument acclimatées et couvertes de boutons.

» ferrugineum à fl. blanches	10.—
» » à grandes fleurs	5.—

	Fr. Ct.
Rhododendron hirsutum	5.—
Pl. acclimatées, couvertes de boutons à fl. et dont la reprise est certaine.	
» intermedium	5.—
» Kamschaticum	5.—
» præcox	5.—

Les Rhod. des Alpes (*Rose des Alpes* ou *Rosage*) sont des plus difficiles à acclimater par le transport de leurs stations naturelles dans les jardins. Il faut les élever par semis ou marcottes si l'on veut obtenir des sujets dont la reprise et la floraison sont assurées. Ceux que nous offrons sortent des pépinières d'un spécialiste qui les élève pour nous; ils sont absolument acclimatés.

Rodgersia æsculifolia	2.50
» pinnata	2.50
» podophylla	1.—
» tabularis	2.50

Curieuse Saxifragée japonaise très rustique, à feuillage décoratif; mi-ombre et fraîcheur.

Romanzoffia Sitchensis	2.50
----------------------------------	------

Petite Hydrophyllée à fl. blanc pur, des confins de l'Alaska, fleurissant tout l'été; fraîcheur; mi-ombre.

Romneya Coulteri	2.50
Pavot blanc vivace de Californie.	

Rosa, voir *Arbustes*.

Roscoeæ purpurea	2.50
Rosmarinus prostratus	1.50

Délicieux petit Romarin se traînant sur le sol et fleurissant dès février.

Rubia Aucheri	1.50
Rubus arcticus, <i>Framboise Cap Nord</i>	1.—
* » australis	5.—
» biflorus	2.50
» chamæmoros	5.—
» nutans	1.50
» saxatilis	0.50
» triflorus	2.50
» Xanthocarpus	1.50

Pour les autres Ronces, voir: *Arbustes* ou *Pl. grimpantes*.

Ruellia ciliosa	2.50
Rumex alpinus, « <i>Lappis</i> »	0.50
» flexuosus (feuillage brun)	1.50
Ruscus hypoglossum	2.50
Ruta angustifolia	1.—
» graveolens	0.50
» patavina	1.50
Sagina Boydei	1.50
» Linnæi	0.50
» procumbens	0.50
» saginoides	1.50
» subulata	0.50

Salix, voir *Arbustes*.

Salpichroa rhomboidea	0.50
Salvia argentea	0.50
» cypriana	2.50



(Cliché R. H. S., Londres).

Saxifraga longifolia dans un mur de serre, au Jardin Correvon.



Rocaille, à Floraire.



Dans le jardin alpin, à Floraire.

Fr. Ct.

<i>Salvia grandiflora</i>	1.—
» <i>officinalis</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» <i>pratensis</i>	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. roses	1.—
» <i>Przewalsky</i>	1.—
» <i>ringens</i>	1.—
» <i>scabiosæfolia</i>	5.—
» <i>Sclarea</i>	0.50
» <i>undulatifolia</i>	2.50

Le *S. scabiosæf.* est une belle introduction d'Orient au feuillage balsamique, aux grandes fl. blanc rosé. Pour les grandes espèces voir: *Pl. vivaces*.

<i>Samolus repens</i>	2.50
» <i>Valerandi</i>	0.50

Petite *Primulac.* à fl. blanches, recherchant l'humidité.

<i>Sanguinaria canadensis</i>	0.50
✕ <i>Sanguisorba canadensis</i>	0.50
✕ » <i>Vallistellinæ</i> (<i>dodecandra</i>)	1.—
<i>Sanicula europæa</i>	0.50
» <i>Marylandica</i>	1.50

Pl. pour sous-bois.

<i>Santolina chamæparissus</i>	0.50
✕ » <i>incana</i>	0.50
» <i>pinnata</i>	0.50
» <i>rosmarinifolia</i>	0.50

Excellentes pl. buissonneuses pour constituer des bordures.

<i>Saponaria bellidifolia</i> (fl. jaunes)	0.50
† » <i>cæspitosa</i> (fl. rose pâle)	0.50
» <i>cypria</i>	2.50
» <i>glutinosa</i>	0.50
† » <i>lutea</i> (fl. jaunes)	2.50
† » <i>ocymoides</i> (La douzaine 5 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » <i>splendens</i>	1.—
» <i>officinalis</i>	0.50
» » à fl. blanches pleines	0.50
† » <i>pulvinaris</i>	1.50

Les espèces marquées d'une † sont à port nain et rampant; *S. ocymoides* est l'une des meil. pl. de rocailles; fl. rose vif, très nomb.; mai-juin.

<i>Sarracenia purpurea</i>	1.50
<i>Satureya diffusa</i>	0.50
» <i>intermedia</i>	0.50
» <i>montana</i>	0.50
» <i>repanda</i>	0.50
» <i>pygmæa</i>	1.—

Petites Labiées aromatiques en arbustes nains et serrés, aux rameaux et aux fl. innombrables. Été et automne.

<i>Saussurea albescens</i>	1.50
» <i>alpina</i>	0.50
» <i>discolor</i>	1.50
» <i>pygmæa</i>	2.50

Fr. Ct.

SAXIFRAGES

SECTION BERGENIA OU MEGASEA :

<i>Saxifraga ciliata</i>	0.50
» <i>cordifolia</i>	0.50
» <i>crassifolia</i>	0.50
» <i>ligulata</i>	0.50
» <i>Stracheyi</i>	0.50

Cette section renferme des espèces à larges feuilles, épaisses, souvent luisantes et poilues sur les bords. Fl. généralement rose vif, ramassées en grappes serrées et apparaissent chez plusieurs espèces de très bonne heure au printemps.

SECTION BORAPHYLA :

» <i>Forbesii</i>	2.50
» <i>Hieracifolia</i>	1.50
» <i>Mertensiana</i>	2.50
» <i>micranthidifolia</i> (<i>erosa</i>)	2.50
» <i>nivalis</i>	1.—
» <i>pennsylvanica</i>	1.—
» <i>stellaris</i>	1.—
» <i>Virginensis</i>	2.50

Ce groupe comprend des espèces qui aiment la fraîcheur et l'humidité. Roc.; mi-soleil; avril-mai.

SECTION CYMBALARIA :

<i>Saxifraga Cymbalaria</i>	0.50
» <i>Huetiana</i>	0.50

Petites pl. annuelles ou bisannuelles à fleurs nombreuses, d'un jaune vif, à feuillage luisant et gai, formant de petites touffes très élégantes qui fleurissent de mai en automne. Roc. ou vieux murs; ombre et fraîcheur.

SECTION DACTYLOIDES :

» <i>adscendens</i>	1.—
» <i>ajugæfolia</i>	1.—
» <i>Allionii</i>	0.50
» <i>androsacea</i>	0.50
» <i>aquatica</i>	1.50
» <i>arachnoidea</i>	5.—
» <i>atropurpurea</i> , à fl. rouge foncé	0.50
» <i>cæspitosa</i>	0.50
» <i>Camposii</i>	1.—
» <i>canaliculata</i>	0.50
» <i>cantabrica</i>	0.50
» <i>capitata</i>	0.50
» <i>cervicornis</i>	0.50
» « <i>cherry tree</i> »	1.—
» <i>citrina</i>	0.50
» <i>conifera</i>	1.50
» <i>Corbariensis</i>	2.50
» <i>cuneata</i> (très beau et rarissime)	5.—
» <i>cymosa</i>	5.—
» <i>decipiens</i>	0.50
» » <i>var. villosa</i>	0.50
» <i>densa</i>	0.50

	Fr. Ct.
<i>Saxifraga exarata</i>	0.50
» <i>Fergussoni</i>	1.—
» <i>gemmafera</i>	0.50
» <i>geranioides</i>	0.50
» <i>globosa</i>	0.50
» <i>Gibraltarica</i>	1.50
» <i>globulifera</i>	1.50
» <i>Guildford Seedling</i> (rose vif)	0.50
» <i>hibernica</i>	0.50
» <i>hypnoides</i>	0.50
» <i>var. purpurea</i>	1.—
» <i>intricata</i>	1.—
» <i>Iratiana</i>	1.—
» <i>islandica</i>	0.50
» <i>Kingii</i>	0.50
» <i>Lindseyana</i>	1.—
* » <i>Madeirensis</i>	2.50
» <i>moschata</i>	1.—
» <i>muretti</i>	1.—
» <i>muscoïdes</i>	0.50
» <i>hybrida</i>	1.—
» <i>nervosa</i>	1.—
» <i>pedata</i>	0.50
» <i>pedatifida</i>	0.50
» <i>pedemontana</i>	2.50
» <i>petraea</i>	1.50
» <i>phlogifolia</i>	1.50
» <i>planifolia</i>	2.50
» <i>polyphilla</i>	0.50
» <i>Prostii</i>	1.—
» <i>pubescens</i>	0.50
» <i>pulchella</i>	0.50
» <i>« purple mantel »</i>	1.50
» <i>recurvifolia</i>	2.50
» <i>« Red Admiral »</i>	1.50
» <i>sedoides</i>	1.50
» <i>Seguieri</i>	2.50
» <i>Sponhemica</i>	0.50
» <i>Sternbergii</i>	0.50
» <i>stenopetala</i> (fl. jaune citron)	2.50
» <i>tridens</i>	2.50
» <i>trifida</i>	0.50
» <i>varians</i>	0.50
» <i>Wilkommiana</i>	1.50

Les plantes de cette section sont des espèces moussues et cespitueuses, à rameaux étalés sur le sol qu'ils recouvrent à la manière des mousses; feuillage finement divisé; fleurs blanches ou roses. R. ou pl. terre; ombre ou mi-soleil. Excellentes pour bordures. Mai-juin.

SECTION DIPHTERA :

* » <i>cuscutæformis</i>	2.50
» <i>Fortunei</i>	1.50
» <i>sarmentosa</i>	0.50
» <i>tricolor</i>	2.50
» <i>Tellimoides</i>	1.50

Ces espèces sont chinoises ou japonaises, rustiques ou mi-rustiques; position abritée.

Fr. Ct.

SECTION EUAIZOONIA :

<i>Saxifraga aizoon</i>	0.50
» <i>atropurpurea</i> (à fl. rose vif)	1.50
» <i>brevifolia</i>	0.50
» <i>Churchilli</i>	0.50
» <i>dubia</i>	0.50
» <i>Malyi</i>	0.50
» <i>microphylla</i>	1.—
» <i>minima</i>	1.—
» <i>minor</i>	0.50
» <i>rosea</i>	1.—
» <i>robusta</i>	1.—
» <i>altissima</i>	1.—
» <i>australis</i>	1.—
» <i>balcana</i>	1.—
» <i>carniolica</i>	1.—
» <i>cartilaginea</i>	1.—
» <i>catalaunica</i>	1.50
» <i>cochlearis</i>	1.—
» <i>cotyledon</i>	0.50
» <i>cotyledon-aizoon</i>	2.50
» <i>crustata</i>	1.—
» <i>cultrata</i>	1.—
» <i>dalmatica</i>	1.—
» <i>demissa</i>	5.—
» <i>elatior</i>	0.50
» <i>Engleri</i>	1.—
» <i>flavescens</i>	1.—
» <i>Fosteri</i>	1.—
» <i>Gaudini</i>	1.—
» <i>Hostii</i>	0.50
» <i>intacta</i>	0.50
» <i>Kolenatia an.</i>	1.50
» <i>labradorica</i>	2.50
» <i>Lagrangeana</i>	1.50
» <i>Lantoskana</i>	1.—
» <i>lingulata</i>	1.—
» <i>linguæformis</i>	1.—
» <i>longifolia</i>	1.—

Position verticale entre les pierres d'une rocaille ou dans un vieux mur; soleil.

» <i>longifolia-cotyledon</i>	2.50
» <i>longifolia-cochlearis</i>	2.50
» <i>longifolia major</i>	2.50
» <i>mac Nablana</i>	1.—
» <i>micrantha</i>	1.—
» <i>mutata</i>	0.50
» <i>notata</i>	0.50
» <i>pectinata</i>	0.50
» <i>Portæ</i>	0.50
» <i>Probyni</i>	1.—

C'est une forme intermédiaire entre les *S. cochlearis* et *Valdensis* et parfaitement distincte que nous prenons la liberté de dédier au général Probyn.

» <i>pseudo-Forsteri</i>	1.50
» <i>pyramidalis</i>	1.—
» <i>pyrenaica</i>	1.—
» <i>recta</i>	1.—
» <i>rhætica</i>	1.—
» <i>rosularis</i>	1.—

	Fr. Ct.
<i>Saxifraga sempervivum</i>	1. —
» <i>speciosa</i>	2.50
» <i>Stabiana</i>	0.50
» <i>Stenoglossa</i>	0.50
» <i>sturmiana</i>	0.50
» <i>Zimmerii</i>	1.50
» <i>Zeileborii</i>	1.50
» <i>transylvanica</i>	0.50
» sp. <i>Vénétie</i>	2.50
» <i>Wildeana</i>	1.50

Originaires des lieux rocheux et ensoleillés des montag. de l'Eur.; le feuillage durci par la chaleur, crustacé, d'un vert grisâtre, souvent recouvert d'une poussière blanchâtre, offre un aspect très particulier et une grande résistance qui permet de les considérer comme très robustes; soleil, rocher; le *S. mutata* seul recherche un sol frais, et, tandis que les fleurs des autres espèces sont blanches, souvent pointillées de pourpre, celles-ci sont d'un rouge brun vif.

SECTION TRISTYLEA :

» <i>florulenta</i> (pieds très forts, en éch. très enracinés.)	10. —
Pieds de force moyenne	7.50
Semis de 3 à 5 ans.	5. —

Cette pl., la merveille des Alpes-Maritimes, a été longtemps considérée comme étant de culture impossible. Nous en offrons ici des pieds parfaitement enracinés dont la reprise est sûre.

SECTION HIRCULUS :

» <i>diversifolia</i>	2.50
» <i>Hirculus</i>	1.50
» <i>grandiflora</i>	2.50

Pl. marécageuses, aimant la tourbe et les lieux frais; fleurs jaune orange; mai-juillet.

SECTION ISOMERIA :

» <i>aconitifolia</i>	1.50
Lieux frais et demi-ombragés; fleurs blanches. Mai-juin.	
» <i>ranunculifolia</i>	2.50

SECTION KABSCHIA :

» <i>alberti</i>	2.50
» <i>apiculata</i>	1.50
» <i>aretioides</i>	1.50
» <i>Boydei</i>	2.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>Boryi</i>	2.50
» <i>Burseriana</i>	1.50
» » <i>grandiflora</i>	2.50
» <i>cæsia</i>	2.50
» <i>calciflora</i> (voir <i>media</i>).	
» <i>coriophylla</i>	2.50
» <i>diapensioides</i>	2.50
» <i>Elisabethæ</i>	2.50
» <i>Ferdinand-Coburgi</i>	5. —

<i>Saxifraga Grisebachii</i>	2.50
» <i>Friedrich-Augusti</i>	5. —
» <i>Hedraantha</i>	5. —
» <i>juniperifolia</i>	1.50
» <i>Kotschyi</i>	2.50
» <i>laevis</i>	2.50
» <i>luteo-purpurea</i>	2.50
» <i>luteo-viridis</i>	2.50
» <i>marginata</i>	2.50
» <i>media</i>	2.50
» <i>patens</i>	5. —
» <i>porophylla</i>	2.50
» <i>pseudo-Kotschyi</i>	2.50
» <i>pseudo-sancta</i>	2.50
» <i>Rocheliana</i>	2.50
» <i>Salomoni</i>	2.50
» <i>Scardica</i>	2.50
» <i>sancta</i>	2.50
» <i>splendens</i>	5. —
» <i>squarrosa</i>	2.50
» <i>Thessalica</i>	2.50
» <i>Tombeanensis</i>	1.50
» <i>Tyrolensis</i>	2.50
» <i>Valdensis</i>	2.50

Très belle et solide espèce du Mont-Viso.

» <i>Vandelli</i>	1.50
-----------------------------	------

C'est ici la plus jolie, la plus intéressante section du genre; les espèces qui la composent forment toutes de petites touffes en boules ou en pelotes, à feuillage serré, composées d'une infinité de petites rosettes serrées les unes contre les autres, et émettant au printemps (de mars en juin suivant les espèces) un gr. nombre de fleurs blanches ou jaunes. Roc. Soleil.

SECTION MISCOPETALUS :

» <i>Græca</i>	1. —
» <i>lasiophylla</i>	0.50
» <i>repanda</i>	1. —
» <i>rotundifolia</i>	0.50
» <i>rotundifolia</i> × <i>Geum</i>	2.50
» <i>Taygetæa</i>	1. —

Feuilles généralement orbiculaires, dentées sur les bords; fleurs blanches souvent panachées de pourpre et disposées sur des tiges paniculées, hautes de 10 à 80 cm. Roc. ou pl. terre; fraîcheur et mi-ombre; Mai-août.

SECTION NEPHROPHYLLUM :

» <i>bulbifera</i>	0.50
» <i>carpathica</i>	2.50
» <i>cernua</i>	1.50
» <i>corsica</i>	2.50
» <i>irrigua</i>	0.50
» <i>granulata</i>	0.50
» » à fl. doubles	1.50
» » × <i>decipiens</i>	1. —
» <i>latepetiolata</i>	2.50

Position humide ou les lieux frais; fl. blanches. Roc. ou pl. terre; mi-soleil. Mai-juin.

Fr. Ct.

SECTION PELTIOPHYLLUM :

Saxifraga Peltata 1.50

Bell. et grand. esp. de Californie; feuell. en parasol retourné, mesurant parfois 60 cm. de diamètre, à fl. roses disposées en groupe au sommet d'une tige épaisse, charnue et garnie de poils bruns, haute de près d'un mètre. Sol profond et très poreux, frais et riche en humus. Mi-soleil. Juin-juillet.

SECTION PORPHYRION :

» angustana	2.50
» biflora	1.50
» blepharophylla	2.50
» Kochii	2.50
» oppositifolia	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » var. <i>grandiflora</i>	1.50
» » var. <i>pyrenaica</i>	1.50
» retusa	2.50
» Rudolphiana	2.50
» Wulfeniana	2.50

Touffes naines et étalées sur le sol, formant des gazons plus ou moins épais et denses, se recouvrant en mars-avril-mai de fleurs sessiles d'un rose vif, carmin foncé ou clair, ou rouge brique suivant les espèces et produisant le plus charmant effet. Roc., ou sec ou mi-soleil.

SECTION ROBERTSONIA :

» apennina	0.50
» Andrewsii	0.50
» Bucklandii	1.—
» Colvillei	1.—
» cuneifolia	0.50
» Geum	0.50
» » var. <i>reniformis</i>	1.—
» hirsuta	0.50
» reniformis	1.—
» spathulata	1.—
» umbrosa (<i>London Pride</i>)	0.50

Bonnes plantes connues sous le nom de « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches pointillées de pourpre et disposées en épis ou panicules dressés; feuillage très élégant. Excellentes pour bordures ou pour garnir les niches de roc. à l'ombre ou au mi-soleil. Mai-juin.

SECTION TRACHYPHYLLUM :

» aspera	0.50
» aizoides	0.50
» bronchialis	1.—
» Brunoniana	2.50
» bryoides	0.50
» flagellaris	1.50
» Regeli	2.50
» Reyeri	2.50
» Stelleriana	1.—

Fr. Ct.

Saxifraga tenella	1.—
» tricuspidata	1.—

Pl. cespitueuses formant des touffes, à feuilles velues-ciliées ou nues, à fl. blanches, jaunes ou rougeâtres, recherchant les sols humides et mi-ombragés; Roc. Mai-août.

Scabiosa amoena	0.50
» argentea	2.50
» balcanica	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» caucasica	0.50
» » alba	0.50
» crenata	2.50
» graminifolia	0.50
» lucida	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» lyratifolia	0.50
» ochroleuca (fl. jaunes)	0.50
» Olgæ	1.50
» silenifolia	0.50
» variifolia	1.—
» vestina	1.50

Le Scab. Caucas. est une pl. superbe, à grands capitules bleu lilas ou blanc pur; graminifolia a les feuell. étroites et argentées et les capitules lilas clair; c'est une excell. pl. de rocail.; qui fleurit tout l'été et l'aut., et tapisse sur un grand espace; soleil.

Schivereckia (<i>Alyssum</i>) Bornmülleri	1.50
» podolica	0.50
Scilla amoena	0.50
» autumnalis	0.50
» bifolia (La douz. 2 fr.)	0.50
» campanulata (La douz. 2 fr.)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. roses	0.50
» nutans (<i>Jacinthe des bois</i>)	0.50
» » (La douz. 2 fr.)	
» » à fl. blanc pur	0.50
» » à fl. roses	0.50
» sibirica (La douz. 2 fr.)	0.50
» » alba	1.—
Scopolia carniolica (mars-avril)	1.50

Curieuse Solanée aux fl. en cloches, rouge brun ou verdâtre; mi-omb.

Scorzonera purpurea	0.50
» rosea	2.50
Scrophularia Juratense	0.50
» vernalis	0.50
Scutellaria alpina	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » var. <i>bicolor</i>	0.50
» » <i>lupulina</i>	0.50
» altissima	0.50
» Baikalensis	1.50
» Brittoni	1.50
» macrantha (à très grandes fleurs)	1.50
» orientalis	1.50

Labiées à fl. plus ou moins grandes et nombr. en épis plus ou moins serrés; pl. généralem. touffues et basses; Sc. alpina est une plante naine et saxatile pouvant constituer des bordures; mai-septembre; soleil.

Fr. Ct.

SEDUM

I. ESPÈCES NAINES, CESPITEUSES

ET ESSENTIELLEMENT SAXATILES :

Sedum acre	0.50
» acutifolius	2.50
» Alberti	0.50
» albescens	0.50
» album	0.50
» » var. <i>virens</i>	0.50
» algidum	0.50
» alsinæfolium	1.50
» altissimum	0.50
» amplexicaule	0.50
» Anacampseros (fl. pourpre foncé)	0.50
» anglicum	0.50
» annuum	0.50
» anopetalum (<i>ochroleucum</i>)	0.50
» asiaticum	1.50
» athoum	0.50
» atratum	0.50
» balticum	1.—
» Beyrichianum	0.50
» Boloniense	0.50
» brevifolium	1.—
» cœruleum (annuel)	0.50
» compactum	2.50
* » confusum	2.50
» corsicum	1.—
» crista-Galli	0.50
» cruicatum	1.50
» dasiphyllum (jolie esp. murale)	0.50
» divergens	1.—
» Douglasi	1.50
» Eversii	0.50
» Forsterianum	0.50
» gemmiferum	2.50
» glaucum	0.50
» gracile	0.50
» Greigii	2.50
» himalense	2.50
» humifusum	2.50
» hybridum	0.50
» Kamtschaticum (jaune brillant)	0.50
» » à feuil. panaché de jaune et vert	0.50
» Laggeri	2.50
» Liebmannianum	2.50
» lividum	0.50
» Lydium	0.50
» magellense (<i>Olympicum</i>)	0.50
» Maweanum	1.50
» montanum	0.50
» multiceps	1.50
» nicaense	0.50
» obtusatum	2.50
» oppositifolium	0.50
» Oreganum	1.—
» oxypetalum	2.50
» Pachyphyllum	2.50
» pilosum	1.50
» Pittoni	1.50

Fr. Ct.

Sedum pruinaum	0.50
» pulchellum (fl. rose clair)	1.50
» reflexum	0.50
» » var. <i>cristatum</i>	1.—
» rubens (<i>Crassula rubens</i>)	0.50
» rupestre	0.50
* » Sarmentosum	1.—
» Selskianum	0.50
» sexangulare	0.50
» Sieboldi (type)	0.50
» » fol. var.	1.—
» spathulifolium	2.50
» spurium	0.50
» » splendens	0.50
* » Stahlian	1.50
» stellatum	0.50
» stenopetalum	2.50
» stoloniferum (belles fl. roses)	0.50
» tenella	0.50
» ternatum	2.50
» testaceum	2.50
» Treleasii	2.50
» trifidum	5.—
» turgidum	1.—
» turkestanicum	0.50
» Verloti	0.50

Tous ces Orpins, à fl. jaunes, blanches ou roses, sont d'entre les plus solides et les meill. pl. pour garnir les roch. et les murs au soleil ou les pentes arides. Ils fleurissent longtemps et résistent aux plus fortes sécheresses.

II. ESPÈCES A TIGES DRESSÉES, FORMANT DES TOUFFES

PLUS OU MOINS ÉLEVÉES :

» Aizoon	0.50
» atropurpureum	1.50
» carpathicum	1.—
* » dendroideum	2.50
» Fabaria	0.50
» hæmatodes	0.50
» macrophyllum	0.50
» Maximowiczii	0.50
» maximum	0.50
» Middendorffianum	0.50
* » Palmeri	2.50
» populifolium (petit arbuste dressé)	0.50
» Rhodiola (<i>Rhodiola rosea</i>)	1.—
» rubricaule	1.—
» Sempervivum	2.50
» spectabile (belles fl. roses)	0.50
» Telephium	0.50
» » var. <i>purpurascens</i>	0.50

Ces esp. sont fortes et solides, génér. très flor., à fl. roses, jaunes ou blanches, et propres à garnir les grands rochers et les plates-bandes; soleil ou mi-soleil.

Selaginella, voir au chap. *Fougères*.
Selliera radicans, voir *Goodenia*.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<i>Sempervivum</i> ¹ <i>acuminatum</i>	1.—	<i>Sempervivum</i> <i>Ferrieri</i>	1.—
» <i>admontensis</i>	1.—	» <i>fimbriatum</i>	1.—
» <i>albernelli</i> (Hort.)	0.50	» <i>flagelliforme</i>	1.—
† » <i>albidum</i>	1.—	» <i>Fontanæ</i> (Hort.)	2.50
* » <i>allionii</i>	1.—	» <i>frigidum</i>	1.—
» <i>alpestre</i>	1.—	» <i>Funkii</i>	0.50
» <i>alpinum</i>	1.—	† » <i>Gaudini</i>	1.—
» <i>ambiguum</i>	1.—	» <i>glaucum</i>	0.50
» <i>angustifolium</i>	1.—	† » <i>globiferum</i>	1.—
» <i>anomalum</i>	1.—	» <i>grandiflorum</i>	1.—
» <i>arachnoideum</i>	0.50	» <i>Greeni</i>	2.50
» » à fl. blanches.	2.50	» <i>Hausmanni</i>	1.50
» » var. <i>Gnaphalium</i>	1.—	» <i>heterotrichum</i>	1.—
» » var. <i>minimum</i>	1.—	† » <i>Heufelii</i>	1.—
» <i>arenarium</i>	0.50	† » <i>hirtum</i>	0.50
» <i>arvernense</i>	1.—	» <i>Hillebrandti</i>	1.—
» <i>assimile</i>	2.50	» <i>Hookeri</i>	1.—
» <i>atlanticum</i>	2.50	» <i>Huteri</i>	1.—
» <i>atropurpureum</i>	1.—	» <i>hybridum</i>	1.—
» <i>atroviolaceum</i>	0.50	» <i>juratense</i>	0.50
» <i>Aureggi</i> (Hort.)	0.50	† » <i>Kapaornikense</i>	2.50
* » <i>austriacum</i>	1.—	» <i>Laggeri</i>	1.—
» <i>barbatum</i>	1.—	» <i>Laharpii</i>	1.—
» <i>barbulum</i>	1.—	» <i>Lamottei</i>	1.—
» <i>barbulatum</i>	1.—	» <i>latifolium</i>	0.50
» <i>blandum</i>	1.—	» <i>Lehmanni</i>	1.—
» <i>Boissieri</i>	1.—	† » <i>leucanthum</i>	2.50
» <i>Boulangeri</i> (Hort.)	0.50	» <i>Mettenianum</i>	1.—
» <i>Bourgeanum</i>	1.—	» <i>Moggrigei</i>	1.—
» <i>Boutignanum</i>	0.50	» <i>montanum</i>	0.50
» <i>Braunii</i>	1.—	» <i>murale</i>	0.50
» <i>brevifolium</i>	1.—	» <i>Murithi</i>	2.50
» <i>bryoides</i>	1.—	† » <i>Neilreichii</i>	1.—
» <i>Bungeanum</i>	1.—	» <i>nigrum</i> (Hort.)	1.—
» <i>calcareum</i> (<i>Californicum</i>)	0.50	» <i>ornatum</i>	1.—
» <i>canescens</i>	1.—	» <i>parvulum</i>	2.50
» <i>Caucasicum</i>	1.—	† » <i>patens</i>	1.—
» <i>Chaboisseaui</i> (Hort.)	0.50	» » var. <i>glaucum</i>	2.50
» <i>Chavini</i>	2.50	» <i>penninum</i>	1.—
» <i>Christii</i>	2.50	» <i>piliferum</i>	1.—
† » <i>ciliatum</i> (<i>ciliosum</i>)	1.—	» <i>pilosella</i>	1.—
» <i>cinarescens</i>	2.50	† » <i>Pittonii</i>	2.50
» <i>Comolii</i>	1.—	» <i>Pomelii</i>	1.—
» <i>commutatum</i>	1.—	» <i>Powellii</i> (Hort.)	1.—
» <i>Corni di Canzo</i>	1.—	» <i>pulchellum</i>	1.—
† » <i>cornutum</i>	0.50	» <i>pumilum</i>	1.—
» <i>Cottetti</i>	2.50	» <i>putriflorum</i>	1.—
» <i>debile</i>	1.—	» <i>pyrenaicum</i>	1.—
» <i>Delassoiei</i>	1.—	† » <i>Reginæ Amaliæ</i>	1.—
» <i>Delponti</i> (Hort.)	1.—	» <i>Requienii</i>	1.—
» <i>dichotomum</i>	1.—	» <i>Rhæticum</i>	2.50
» <i>Doellianum</i>	1.—	» <i>Rhodanicum</i>	2.50
» <i>dolomiticum</i>	1.—	» <i>robustum</i>	1.—
» <i>elegans</i>	2.50	» <i>rubellum</i> (Hort.)	1.—
» <i>Fauconnetti</i>	2.50	» <i>rubicundum</i>	1.—
		» <i>Rudeni</i>	1.—
		» <i>rupestre</i>	1.—
		» <i>rupicolum</i>	2.50
		» <i>ruthenicum</i>	1.—
		» <i>sabaudum</i>	2.50
		» <i>sanguineum</i>	0.50
		» <i>Schlehani</i>	1.—

¹ Nous avons collectionné depuis 24 ans toutes les esp. et var. de *Sempervivum* qu'il nous a été possible de rencontrer dans les jardins ou dans la nature. Malheureusement la nomenclature de ce genre si embrouillé est très compliquée. Nous nous livrons à une étude spéciale de ces pl. et serons reconnaissants à tous ceux qui voudraient nous aider à compléter cette collection.

	Fr. Ct.
<i>Sempervivum Schnittspahni</i>	1.—
» <i>Schottii</i>	1.—
» <i>Seguii</i>	1.—
» <i>serpyllifolium</i>	1.—
† » <i>soboliferum</i>	0.50
» <i>speciosum</i>	1.—
» <i>spinulifolium</i>	1.—
» <i>Studeri</i>	1.—
» <i>tectorum</i> , <i>Joubarbe</i> (Dz. 2 fr.)	0.50
» » <i>var. bicolor</i>	1.—
» » <i>var. densum</i>	1.—
» » <i>var. glaucum</i>	1.—
» » <i>var. pulchrum</i>	1.—
» » <i>var. violaceum</i>	1.—
» <i>tenellum</i>	1.—
» <i>Theobaldi</i>	2.50
» <i>Thomayeri</i>	2.50
» <i>Tissieri</i>	2.50
» <i>tomentosum</i>	1.—
» <i>triste</i>	1.—
» <i>turkestanicum</i>	2.50
» <i>Valesiacum</i>	2.50
» <i>Velenowskyi</i>	2.50
» <i>Verloti</i>	1.—
» <i>Webbianum</i> (Hort.)	1.—
† » <i>Wulfeni</i>	1.—
» <i>Zelebori</i>	1.—

Les Joubarbes sont extrêmement précieuses pour la garnit. de roc. et de vieux murs, comme aussi pour faire des bordures ou des décor. dans les plates-bandes. Ce sont les plus solides d'entre toutes les pl. et on en cultive des collections en godets, en vases japonais, etc., sur les fenêtres ou balcons; elles s'accommodent de toutes les situations et leurs jolies fl. mais surtout leur feuillage à l'aspect de petits artichauts, les font rechercher par beaucoup d'amateurs. Il y a un plaisir très grand à les collectionner et à les cultiver. Les esp. marquées d'une † sont à fl. jaunes; les autres ont des fl. de différents roses.

SENECIO

GROUPE I. ESPÈCES ALPINES NAINES

ET CESPITEUSES :

<i>Senecio abrotanifolius</i> (fl. orangé vif)	0.50
» <i>adonidifolius</i>	0.50
† » <i>carniolicus</i>	1.—
† » <i>Fendleri</i>	1.50
† » <i>incanus</i>	1.—
† » <i>leucophyllus</i>	5.—
» <i>tirolensis</i> (fl. rouge orangé très vif)	2.50

Les espèces marquées d'une † sont à feuillage argenté.

GROUPE II. ESPÈCES SUBALPINES OU MONTAGNARDES, A PORT PLUS ÉLEVÉ, EN TOUFFES DRESSÉES OU ÉTALÉES :

† <i>Senecio alpinus</i>	0.50
» <i>aurantiacus</i>	2.50

	Fr. Ct.
» <i>clivorum</i>	0.50
† » <i>cordifolius</i>	0.50
» <i>Doronicum</i>	1.—
† » <i>Jacquini</i>	0.50
† » <i>Japonicus</i> , <i>Erythrochæte palmat.</i>	1.—
» <i>Ligularia</i> , <i>Ligularia sibirica</i>	1.—
† » <i>macrophyllum</i>	0.50
» <i>pinnatifidus</i>	1.50
* » <i>pulcher</i>	2.50
» <i>stenocephalus</i>	0.50
» <i>Veitchi</i>	1.50
» <i>Wilsonianus</i>	1.50

Les espèces marquées d'une † préfèrent la mi-ombre et un peu de fraîcheur.

<i>Serratula nudicaulis</i>	2.50
<i>Seseli cæspitosum</i> (de l' <i>Olympe</i>)	1.—
» <i>gummiferum</i> (du <i>Taurus</i>)	1.—

Ombellif. orientales, à f. glauques, propr. à garnir roch. Soleil.

<i>Sesleria cœrulea</i>	0.50
<i>Shortia galacifolia</i>	2.50
<i>Sibbaldia parviflora</i>	0.50
» <i>procumbens</i>	0.50
* <i>Sibthorpia europæa</i>	0.50
» <i>peregrina</i>	2.50
<i>Sidalcea candida</i>	0.50
» <i>malvæflora</i>	0.50

Jolie Malvacée aux fl. roses ou blanches, en épis; été; roc. ou pl. terre; soleil ou mi-soleil.

<i>Sideritis Eubæa</i>	2.50
» <i>hyssopifolia</i>	0.50
» <i>Libanotica</i>	2.50
» <i>Taurica</i>	2.50

Labiées aux fl. jaunes, excellentes pour roc.; été et aut.; pl. soleil.

<i>Siebera cherlerioides</i>	2.50
----------------------------------------	------

SILÈNES

GROUPE I. ESPÈCES ALPINES OU SAXATILES, NAINES

ET CESPITEUSES :

† <i>Silene acaulis</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» » fortes touff. de 5 à 6 ans.	1.50
» » à fl. blanches	2.50
† » » <i>var. bryoides</i>	2.50
† » » <i>var. elongata</i> (grand. fl. rose-carmin, pédonculées)	1.—
† » » <i>var. Correvoniana</i> (la même à fl. très doubles)	2.50

Excell. var. très florifère, trouvée dans la Haute Maurienne; les fl. offrent l'aspect de petites roses (mai-juin).

» <i>alpestris</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» <i>argæa</i>	1.—
» <i>cappadocica</i>	1.—
» <i>ciliata</i>	1.50
» <i>cordifolia</i>	2.50

	Fr. Ct.
† <i>Silene Elisabethæ</i>	1.50
La plus belle des <i>Silènes</i> ; grandes fl. carmin vif à pétales incisés, Mi-soleil; rouille.	
† » <i>exscapa</i>	1.—
» » à fl. blanches.	2.50
» <i>Kitaibeli</i>	1.—
» <i>legionensis</i>	2.50
» <i>Lerchenfeldiana</i>	1.—
» <i>Libanotica</i>	2.50
» <i>maritima</i>	0.50
» » à fl. pleines.	1.—
» <i>Monachorum</i> (espèce minuscule)	1.—
» <i>pharmaceifolia</i>	2.50
† » <i>Pumilio</i>	1.50
» <i>pusilla</i> (aime la fraîcheur)	1.—
» <i>quadrifida</i>	0.50
» <i>Reichenbachiana</i>	1.—
» <i>rupestris</i> (craint la chaleur)	0.50
» <i>Saxifraga</i>	0.50
† » <i>Schafta</i>	0.50
» <i>Valesia</i> (rampante et stolonifère)	0.50
» <i>Veselskyi</i>	2.50
» <i>Zawadskyi</i>	0.50

Les espèces marquées d'une † sont à fl. rose ou
carmin plus ou moins vif; les autres à fl.
blanches ou blanc rosé.

GROUPE II. ESPÈCES À TIGES DRESSÉES
PLUS OU MOINS BUISSONNEUSES :

» <i>Delphica</i>	1.—
» <i>fimbriata</i> (très belle et grande pl. à fl. blanches, très finem. laciniées.	1.—
» <i>Fortunei</i>	0.50
C'est l'une des plus délicieuses fl. d'été; fl. grandes, très nombreuses, pétales échancrés comme ceux de l'œillet superbe, rose vif et se succédant de juillet en novembre.	
» <i>fruticosa</i>	1.—
» <i>Graefferi</i>	0.50
» <i>nutans</i>	0.50
» <i>odontopetala</i> var. <i>rubella</i>	2.50
Ces esp. vont indiff. sur les roc. ou dans la pleine terre; soleil.	
<i>Sisimbrium strictissimum</i>	0.50
<i>Sisyrinchium anceps</i>	0.50
<i>Smilacina racemosa</i>	1.—
» <i>stellata</i>	0.50
Petite Liliacée à fl. blanches, pour les sous-bois et les lieux ombragés.	
<i>Smilax herbacea</i>	2.50
» <i>Oldami</i>	2.50
» <i>rotundifolia</i>	2.50
<i>Sobolewskia clavata</i>	0.50
<i>Solanum dulcamara</i> Douce-amère	0.50
» <i>Sainclairii</i> (Pomme de terre-pygmée)	1.50
<i>Soldanella alpina</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» <i>Ganderi</i>	5.—
» <i>hungarica</i>	2.50
» <i>hybrida</i>	5.—

	Fr. Ct.
<i>Soldanella minima</i>	2.50
» <i>montana</i> (très grande espèce)	2.50
» <i>pusilla</i>	2.50
» <i>pyrolæfolia</i>	2.50

Les *Sold.* fleurissent bien si l'on a soin de leur
donner une posit. fraîche mais ensoleillée; il
leur faut, non point un sol mouillé mais l'air
humide, en février-mars, alors que leurs bou-
tons se forment et se développent; cultiv. dans
du *Spagnum*, elles fleurissent très bien.

<i>Solidago alpestris</i> , <i>Verge d'or</i>	0.50
» <i>arctica</i>	0.50
» <i>brachystachia</i>	1.50
» <i>humilis</i>	0.50

Pour les autres esp., voir *Pl. vivaces*.

* <i>Sphaeralcea munroana</i> (jolie mauve à fl. roses).	1.50
<i>Spigelia marylandica</i>	2.50
<i>Spiræa Aruncus</i> (Reine des Bois)	0.50
» <i>cæspitosa</i>	2.50
» <i>crispifolia</i>	1.50
» <i>filipendula</i>	0.50
» » à fl. doubles.	0.50
» » à feuilles panachées	1.—
» <i>Ulmaria</i>	0.50
» <i>venusta</i> (à fl. rose vif)	0.50

Voir *Pl. vivaces* et *Arbustes*.

<i>Stachys coccinea</i>	2.50
» <i>lanata</i> (f. laineuses; fl. roses; bonne pl. pour bordures et garnitures des lieux secs). (Les douz 2 fr.).	0.50
» <i>lavandulæfolia</i>	1.—
Jolies Labiées ornementales; rocaille; soleil.	
<i>Stæhelinia unifluculosa</i>	1.50
<i>Statice bellidifolia</i>	0.50
» <i>Girardiana</i>	0.50
» <i>globulariæfolia</i>	0.50
» <i>Limonium</i>	0.50
» <i>oxylepis</i>	0.50
» <i>sareptana</i>	0.50
» <i>serbica</i>	0.50
» <i>tatarica</i>	0.50

ESPÈCES NON RUSTIQUES :

* » <i>arborescens</i>	1.50
* » <i>fruticans</i>	1.50
* » <i>imbricata</i>	1.50
* » <i>macrophylla</i>	1.50
* » <i>macroptera</i>	1.50
* » <i>Perezi</i>	1.50

Ce sont de superbes pl. des Canaries qu'on doit
rentrer l'hiver (sous notre climat) mais qui sont
de vraies merveilles végétales et donnent tout
l'été durant, des panaches de fl. bleues qu'on
peut conserver à la façon des immortelles.
Grand soleil.

<i>Stellaria bulbosa</i>	2.50
» <i>nemorum</i> (pl. d'ombre)	0.50
<i>Stenanthum robustum</i>	2.50

	Fr. Ct.
<i>Sternbergia lutea</i>	0.50
<i>Stipa Calamagrostis</i>	0.50
» <i>gigantea</i>	1.—
» <i>pinnata</i> (panache valaisan).	0.50

Belles graminées ornementales; soleil.

<i>Stobæa Radula</i>	2.50
<i>Stockesia cyanea</i>	2.50
<i>Streptopus amplexifolius</i>	0.50
<i>Stylophorum diphyllum</i>	1.—
» <i>japonicum</i>	2.50
* <i>Suæda fruticosa</i>	2.50
<i>Swertia connata</i>	2.50
» <i>longifolia</i>	2.50
» <i>perennis</i>	0.50
<i>Symphyandra Armena</i>	2.50
» <i>Hoffmanni</i>	0.50
» <i>Ossetica</i>	2.50
» <i>pendula</i>	2.50

Jolies Campanules des Balkans ou Caucase; roc. ou murailles; soleil ou demi-soleil; juin-sept.

<i>Symphytum bulbosum</i>	1.—
» <i>caucasicum</i>	0.50
» <i>officinale</i> , <i>Consoude officinale</i>	0.50
» <i>peregrinum</i> (grande espèce)	1.—
» <i>tuberosum</i>	0.50
<i>Synedesis aconitifolia</i> (rare)	2.50
<i>Synthiris pinnatifida</i>	2.50
» <i>plantagea</i>	2.50
» <i>reniformis</i>	2.50

Scrophulariées américaines à beau feuillage; pl. naines.

<i>Tamus communis</i>	1.50
---------------------------------	------

Le Tamier est une Asparaginée dont les tiges volubiles se couvrent de baies rouge vif à l'automne; ombre ou demi-ombre.

<i>Tanacetum argenteum</i>	2.50
» <i>Balsamita</i> . <i>Toute bonne</i>	0.50
» <i>bipinnatifidum</i>	1.—
» <i>densum</i>	1.—
» <i>vulgare Tanaisie odorante</i>	0.50
» <i>var. crispum</i>	0.50

<i>Tanakaë radicans</i>	2.50
-----------------------------------	------

<i>Telekia speciosissima</i> (vrai).	2.50
----------------------------------------------	------

<i>Telephium imperati</i>	0.50
-------------------------------------	------

» <i>orientale</i>	2.50
------------------------------	------

<i>Telesperma gracilis</i> (scabieuse jaune vif)	2.50
------------------------------------------------------------	------

<i>Tellima grandiflora</i>	0.50
--------------------------------------	------

<i>Teucrium Arduini</i>	1.—
-----------------------------------	-----

» <i>capitatum</i>	1.—
------------------------------	-----

» <i>Chamædrys. Germandrée</i>	0.50
------------------------------------------	------

(La douz. 5 fr.)

Excell. pl. à feuil. décoratif et à très nombreuses fl. rose et rouge; juillet-novembre; va partout et excelle pour garnir les lieux secs et arides.

» <i>flavum</i>	1.—
» <i>lucidum</i>	1.—
* » <i>marum</i>	2.50
» <i>montanum</i>	0.50
» <i>orientale</i>	1.50

<i>Teucrium polium</i>	0.50
» <i>pyrenaicum</i>	0.50
» <i>Scorodonia. Pl. des bois.</i>	0.50

Labiées odorantes, à fl. en capitules ou en grappes, très nombreuses et se succédant longtemps sur la pl.; soleil et sec; roc. ou pl. terre.

<i>Thalictrum alpinum</i>	1.—
» <i>adiantifolium</i>	0.50
» <i>aquilegifolium</i> , <i>Pigamon des bois</i> ,	0.50
» <i>à fl. blanches</i>	0.50
» <i>Baïkalense</i>	0.50
» <i>cormuti</i>	1.—
» <i>Delavayi</i>	1.50

Superbe pl. à fl. roses, originaire des montagnes du Yunnan.

» <i>dipterocarpum</i>	2.50
» <i>elegans</i>	2.50
» <i>Fendleri</i>	1.—
» <i>fœtidum</i>	0.50
» <i>galioides</i>	0.50
» <i>var. glabrum</i>	0.50
» <i>glaucum</i>	0.50
» <i>minus</i>	0.50
» <i>orientale (verum)</i>	1.50
» <i>petaloideum</i>	1.50
» <i>saxatile</i>	0.50
» <i>tuberosum</i>	2.50

Charmantes Renonculacées aux feuillages élégants, rappelant, chez les espèces naines, les *Adiantum* qu'ils remplacent fréquemment pour les bouquets parce qu'ils offrent sur ces délicates fougères l'avantage de durer très longtemps. Le *Th. aquilegifolium* est l'une des meill. plantes pour sous-bois ou orner les bords des taillis, les grands rochers, etc;

<i>Thermopsis carolina</i>	1.50
» <i>fabacea</i>	1.50
» <i>lanceolata</i>	1.50
» <i>montana</i>	1.50

Sortes de pois vivaces voisins des Lupins.

<i>Thlaspi cepæfolium</i>	1.50
» <i>Kowatzii</i>	0.50
» <i>limosellæfolia</i> (des Alpes-Maritimes).	2.50
» <i>rotundifolium</i>	1.50
» <i>violascens</i>	0.50

<i>Thymus australis</i>	0.50
-----------------------------------	------

» <i>carnosus</i>	1.—
-----------------------------	-----

» <i>citriodorus</i>	0.50
--------------------------------	------

» <i>à aurea var.</i>	0.50
-------------------------------	------

» <i>à argentea var.</i>	0.50
----------------------------------	------

» <i>coccineus</i>	0.50
------------------------------	------

» <i>collinus</i>	0.50
-----------------------------	------

» <i>Herba Barone</i> (de Corse)	1.50
--------------------------------------------	------

» <i>latinus</i>	0.50
----------------------------	------

» <i>lanuginosus</i>	0.50
--------------------------------	------

» <i>pannonicus</i>	0.50
-------------------------------	------

» <i>rotundifolius</i>	0.50
----------------------------------	------

» <i>serpyllum, Serpolet</i>	0.50
----------------------------------------	------

» <i>à fl. blanches</i>	0.50
-----------------------------------	------

» <i>à fl. carmin vif</i>	0.50
-------------------------------------	------

» <i>var. pulchellum</i>	0.50
------------------------------------	------

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Thymus villosus	1.50	Tunica saxifraga	0.50
» vulgaris	0.50	* Tweedia cœrulea	2.50
Bonnes pl. p. soleil, pl. terre ou roc., longue floraison.		Umbilicus glaber	2.50
Tiarella cordifolia	0.50	» pendulinus	1.—
» poliphylla	2.50	» Semenowi	1.—
Tiofieldia borealis	1.50	Pour autres Umbilicus, voir <i>Cotyledon</i> .	
» calyculata	0.50	Uniola latifolia	0.50
» rubescens	2.50	Curieuse graminée américaine à épillets plats d'un bel effet décoratif.	
Towsendia grandiflora	2.50	Uvularia grandiflora	1.—
Superbe pl. américaine simulant un chardon ar- genté tout à fait nain; fl. d'un grand Aster alpin blanc pur. Pl. curieuse et très florifère. Soleil et rocher.		» perfoliata	1.—
» sericea	2.50	» sessilifolia	2.50
» Wilcoxiana	2.50	Vaccinium macrocarpum	2.50
Trachelium cœruleum	1.50	» Myrtillus, <i>Myrtille</i>	2.50
Tragopogon ruber	0.50	» oxycoccus	2.50
Trautvetteria palmata	2.50	» uliginosum	2.50
Tricyrtis hirta	1.—	» Vitis Idæa, <i>Airelle</i>	2.50
Trientalis europæa	1.50	Valeriana Alliariæfolia	0.50
» canadensis	5.—	» alpestris	0.50
Jolie et petite Primaculée aux fl. blanches, propre à garnir les sous-bois.		+ » celtica, <i>Nard celtique</i>	2.50
Trifolium alpinum	2.50	» dioica	0.50
Trillium erectum	1.—	» Dioscoridis	1.—
» cernuum	1.—	» edulis	1.—
» grandiflorum	1.—	+ » globulariæfolia	2.50
» pendulum	1.—	» longiflora (pl. rare)	2.50
» petiolatum	1.—	» montana	0.50
» sessile	1.—	» officinalis	0.50
» stylosum	1.—	» pyrenaica	2.50
» viride	1.—	+ » rotundifolia	2.50
Triteleya uniflora	0.50	+ » Saliunca	1.—
» violacea	0.50	+ » saxatilis	2.50
Trollius abschasicus	1.50	» septentrionalis	2.50
» acaulis	1.50	+ » supina	1.—
» altaicus	1.50	» tripteris	0.50
» asiaticus	1.—	» tuberosa	2.50
» aurantiacus	1.50	Les Valérianes sont bien connues pour les propr. odorantes de leurs racines; fl. blanc-rosé, per- sistant longtemps; mi-soleil et fraîcheur. Les esp. marquées d'une † sont naines et ram- pantes et plus spécialement de rocailles.	
» caucasicus	1.—	Vancouveria hexandra	2.50
» europæus, <i>Globeflower</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50	Vella pseudocytisus	2.50
» » var. <i>giganteus</i>	2.50	» spinosa	2.50
» hybridus	0.50	Petits arbustes espagnols de la famille des Cruci- fères; très rares; soleil et rocaille.	
» Ledebouri	1.—	Veratrum album	1.—
» pallidus	1.—	» californicum	2.50
» patulus	1.—	» nigrum	1.—
» pumilus	1.—	Belle pl. au feuillage architectural; sol profond et frais	
» transylvanicus	1.—	Verbascum Blattaria	0.50
Les Trolles sont de gros boutons d'or aux fl. glo- buleuses et odorantes, qui recherchent les sols frais et humides mais ensoleillés. Mai-juin.		» decorum	2.50
Tropæolum pentaphyllum	1.50	» montanum	0.50
» poliphyllum	1.50	» Olympicum	0.50
» tuberosum	0.50	» Phœnicæa	0.50
Tulipa Mauriana	1.—	» Thapsus	0.50
» saxatilis	0.50	Verbena venosa	1.50
» sylvestris	0.50		

Fr. Ct.

VÉRONIQUES

GROUPE I. ESPÈCES ALPINES, NAINES
OU SAXATILES .

Veronica Allionii	1.50
» alpina	0.50
» aphylla	0.50
» austriaca	0.50
» bellidifolia	0.50
» biebersteiniana	0.50
* » canescens (minuscule espèce)	2.50
» caucasica	0.50
» cinerea	2.50

Très belle esp. orientale à feuilles grises, à fl. blanches.

» dychrus	1.50
» filiformis	1.—
» fruticulosa	0.50
» montana	0.50
» multifida	1.—
» nivalis	0.50
» officinalis (des bois)	0.50
» orbiculata	1.50
» orientalis	1.50
» peduncularis	1.50
» Ponæ	0.50
» prostrata (bleu intense)	0.50
» » à fl. blanches	1.—

Cette var. est une pl. de tout premier ordre pour l'ornementation de rocailles.

» saturejoides	0.50
» saxatilis	0.50
» » à fl. blanches	1.50
» serpyllifolia	0.50
» spicata	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. roses	1.—
* » teliphiifolia	1.—
» tenuifolia	1.—
» urticifolia (pour ombre)	0.50
» virginica	0.50

Exc. pl. pour rochers; fl. bleues ou roses; pl. solides; soleil.

GROUPE II. ESPÈCES EN TOUFFES ÉRIGÉES,
PLUS OU MOINS ÉLEVÉES :

Plantes de plates-bandes ou de rochers, à fl. bleues ou roses, en épis dressés, très recherchées des abeilles, florifères (juillet-octobre) et excellentes pour les bouquets; sol, ou mi-ombre.

» austriaca	0.50
» carnea	0.50
» Chamædrys	0.50
» crassifolia	0.50
» elegans	0.50
» Gentianoides	0.50
» » var. <i>stenophylla</i>	0.50
» » fol. var.	0.50
» incana	0.50
» » alba	1.—

Fr. Ct.

Veronica longifolia	0.50
» maritima	0.50
» » alba	0.50
» » rosea	1.50
» » variegata	0.50
» paniculata	0.50
» sibirica	0.50
» subsessilifolia	0.50
» Teucrium	0.50

GROUPE III. ESPÈCES SUFFRUTESCENTES, FORMANT
DE PETITS ARBUSTES A FEUILLES TOUJOURS VER-
TES :

* » anomala	1.50
» Bidwillii	1.50
» buxifolia	1.50
» carnosula	1.—
* » Cataractæ	1.—
* » cupressoides	1.50
» Chatamica (espèce rampante)	1.50
* » epacridea	1.50
» elliptica	1.50
» glauco coerulea	1.—
* » Hectori	1.50
* » Hulkeana	1.50
* » Jobanoracensis	1.50
* » ligustrifolia	1.—
» lyalii	1.50
» pinguæfolia	1.—
* » salicifolia	1.—
» Traversi	1.50

Ce sont de charmants arbuscules au feuillage élégant et décoratif, aux fleurs nombreuses et belles, originaires des montagnes de la Nouvelle-Zélande.

Vesicaria sinuata	0.50
» utriculata	1.50
Vicia Onobrychioides	1.—
» Orobus	1.50
» unijuga	2.50
Vinca acutiflora	0.50
» Herbacea	0.50
» difformis	1.50
» Libanotica	2.50
» voir <i>Pl. vivaces</i>	
Vincetoxicum alpinum	0.50
» nigrum	0.50
» rubrum	0.50

VIOLA

GROUPE I. ESPÈCES DU GENRE VIOLETTE :

Viola adunca	2.50
» arenaria (fl. roses, très odorant)	1.50
» atlantica ¹	2.50

Excellente esp. à feuilles divisées et à belles fl. violet foncé; très florifère et solide.

¹ Nous avons reçu du jardin botanique de Zurich, en 1902, les graines de ce Viola qui n'est pas l'atlantica de Pomel, mais que nous ne sommes pas encore parvenus à identifier. C'est une pl. très caractéristique et curieuse.

	Fr. Ct.
† <i>Viola biflora</i> (fl. jaune vif)	0.50
» <i>canadensis</i>	1.—
† » <i>canina</i> (bonne pour sous-bois).	0.50
» » à fl. blanches	2.50
» » à fl. roses	2.50
» <i>cognata</i>	2.50
† » <i>cucullata</i>	0.50
† » » à fl. blanches	0.50
» » var. <i>grandiflora</i>	0.50
» <i>delphinifolia</i>	2.50
» <i>elatior</i>	0.50
» <i>glabella</i>	2.50
» <i>Jooi</i> (très odorante)	1.50
» <i>Labradorica</i>	0.50
» <i>mirabilis</i>	0.50
» <i>nuttali</i>	2.50
» <i>odorata</i>	0.50
» <i>palmata</i>	1.—
† » <i>palustris</i>	0.50
» <i>pedata</i>	2.50
» » <i>bicolor</i>	2.50
» <i>pinnatifida</i>	2.50
» <i>pinnata</i> (esp. alpine rare)	1.—
† » <i>primulifolia</i>	1.50
» <i>purpurea</i>	2.50
» <i>Riviniana</i>	1.—
» <i>Rydbergii</i>	2.50
» <i>Selkirkii</i>	2.50
† » <i>sagittata</i>	1.—
» <i>stagnina</i>	1.—
» <i>sulfurea</i> (fl. jaune soufre, odor.)	0.50
† » <i>sylvestris</i>	0.50
» <i>Tomasiniana</i> (très odorante; fl. roses)	2.50

Les esp. marquées d'une † sont celles qui recherchent l'ombre et la fraîcheur.

GROUPE II. ESPÈCES DU GENRE PENSÉE :

» <i>alpina</i>	2.50
» <i>altaica</i>	2.50
» <i>Bosniaca</i>	1.—
» <i>calcarata</i> , <i>Pensée des Alpes</i>	0.50
(La douz. 5 fr.)	
» » à fl. blanches	1.—
» » à fl. jaunes	1.—
» » lilas clair	1.—
» <i>cenisia</i> (dans pierrier calcaire)	2.50
» <i>Comollia</i>	2.50

Le *V. Comollia* est une rarissime et superbe espèce des moraines bergamasques, aux fl. rose

	Fr. Ct.
tendre (jaune verdâtre en dessous des pétales) et odorantes. Il lui faut un sol pauvre, friable et le plein soleil.	
» <i>cornuta</i> . (La douz. 5 fr.)	0.50
» » fl. blanches. (id.)	0.50
» » var. <i>Floraire</i> , pl. très florifère se couvrant, d'un bout de l'année à l'autre, de fl. lilas très voisines de la pensée des Alpes. Dans un lieu abrité de <i>Floraire</i> elle n'a pas cessé de fleurir du 1 ^{er} janvier au 31 décembre. C'est l'une des meilleures pl. de rochers et des plus faciles à cultiver.	
<i>Viola cornuta</i> Papilio	0.50
» » <i>rosea</i>	1.50
» » <i>Wermig</i>	0.50
Excellente pl. provenant de <i>V. calcarata</i> et fleurissant de juillet en octobre.	
<i>Viola declinata</i>	2.50
» <i>gracilis</i>	2.50
» <i>heterophylla</i>	1.—
» <i>latisepala</i>	1.—
» <i>lutea</i>	0.50
» <i>minutiflora</i>	2.50
» <i>Mumbyana</i>	0.50
» <i>nummularifolia</i>	2.50
Délicieuse pensée des Alpes-Maritimes, se couvrant de grandes fleurs bleu-lilacé qui sont une vraie merveille. Fente d'un rocher au mi-soleil.	
» <i>polychroma</i>	2.50
» <i>pubescens</i>	2.50
» <i>rothomagensis</i>	1.—
» <i>Valderia</i>	2.50
» <i>Sudetica</i>	2.50
» <i>Zoyzii</i>	1.—
<i>Vittadenia australis</i>	2.50
» <i>triloba</i>	0.50
<i>Wahlbergella pauciflora</i>	2.50
<i>Waldsteinia geoides</i>	0.50
<i>Wulfenia Amherstiana</i>	2.50
» <i>Carinthiaca</i>	0.50
<i>Wyettia mollis</i>	2.50
<i>Zauschneria californica</i> (fl. rouge vermillon)	1.—
<i>Zephyranthes candida</i>	0.50
<i>Zoziana absinthifolia</i>	2.50
COLLECTION A NOTRE CHOIX :	
100 plantes alpines diverses	40.—
50 »	20.—
25 »	12.—
12 »	5.—

Plantes vivaces.

Nous comprenons, sous ce titre, celles des pl. de pleine terre rustiques sous le climat de Genève et Paris qui sont plus spécialement des fleurs décoratives, des pl. propres à orner les plates-bandes, les massifs, les pelouses, etc. Le style naturel qui prévaut en ce moment et qui consiste à imiter la nature alpestre et montagnarde, à remplacer le conventionnel par le naturel, ce style qu'on a admiré aux villages suisses de Genève et de Paris, exige la présence de nombreuses pl. vivaces. Celles-ci, isolées ou groupées dans les gazons, artistiquement disposées suivant leurs couleurs, leur époque de floraison, leur taille, leur forme aussi, forment de véritables tableaux qui enfonce carrément l'ancien système des corbeilles unies ou multicolores d'espèces exotiques qu'il faut rentrer à l'automne et soigner l'hiver sous verre. Les pl. vivaces elles, se conservent indéfiniment et n'exigent d'autres soins que ceux de la propreté de leur souche et d'arrosage plutôt modéré — surtout si elles sont plantées dans le gazon qui leur constitue un admirable cadre et un merveilleux décor. Comme fleurs à bouquets, propres à garnir les tables, les salons et les maisons, elles sont incomparables et les livrent en grande abondance. C'est pourquoi le Jardin alpin d'acclimatation a transformé son champ d'activité et, depuis plusieurs années, s'occupe à collectionner, à acclimater, à cultiver, multiplier et répandre toutes les pl. vivaces susceptibles d'être introduites dans le Jardin du centre européen. Nos collections de *Floraire* sont peut-être les plus complètes qui existent, au point de vue des espèces, s'entend, car nous donnons moins d'importance aux variétés horticoles.

	Fr. Ct.
<i>Acanthus latifolius</i>	1.—
» <i>mollis</i>	1.—
» <i>spinosissimus</i>	1.—
» <i>spinosus</i>	2.50

L'*Acanthe*, dont le beau feuillage a donné le chapiteau corinthien, est, dans ses diff. formes et esp., l'une des plus ornement. d'entre les pl.; ses fl. roses, disp. en longs épis dressés, sont relevées par le plus élégant des feuillages; sol profond; soleil et position plutôt abritée. Juillet-sept.

<i>Achillea filipendulina</i> (fl. jaune vif) . . .	0.50
» <i>Ptarmica</i>	0.50
» » à fl. pleines	0.50
» <i>sericea</i>	0.50

Cette dernière esp. est recommandable pour les mauvais sols. Les fleurs jaunes forment des bouquets compacts de mai en novembre.

† <i>Althæa ficifolia</i> (fl. jaune soufre . . .	0.50
» <i>officinalis</i> (<i>Guimauve officinale</i>) . .	0.50
† » <i>rosea</i> (<i>Rose trémière, Passerose</i>) . .	0.50

Le type à fl. simples, dans toutes les couleurs.

† » <i>rosea</i> (v. à fl. pleines, multicol.) . .	0.50
----------------------------------------------------	------

Les esp. marquées d'une † sont les passeroses pl. extrêmement décoratives et élégantes, qui fleurissent de juin en automne; soleil; sol plutôt maigre si l'on veut éviter la rouille qui s'attaque volontiers à leurs feuilles.

	Fr. Ct.
<i>Alyssum saxatile</i> , <i>Corbeille d'or</i>	0.50
» » à fl. doubles	0.50
» » à fl. jaune soufre	1.50

Excell. pl. à bordures; mai-juin; soleil.

<i>Amaryllis Belladonna</i>	1.50
<i>Amphicome arguta</i>	1.50

Très belle Bignoniacée vivace et rustique de l'Himalaya, à fleurs rose vif; soleil.

<i>Amsonia angustifolia</i>	0.50
» <i>latifolia</i>	0.50
<i>Anaphalis Margaritacea</i>	0.50

Immortelle blanche à couronnes.

<i>Anchusa Barrelieri</i>	0.50
» <i>italica</i>	0.50
» <i>Dropmore</i>	1.—
» <i>officinalis</i>	0.50
» <i>opale</i>	1.—

Borraginées aux fl. bleues, très intense chez *Italica*; sortes de gigantesques *Myosotis*. Été Pl. murale excellente, très florif. et dont on possède de nombreuses variétés.

<i>Anemone japonica</i>	0.50
» » à fl. blanches, <i>Honorine</i>	
» » <i>Jobert</i>	0.50
» » à fl. blanch., doubl.	0.50

<i>Angelica Archangelica</i> , <i>Angélique</i> . . .	1.—
<i>Antirrhinum majus</i> , <i>Muflier, Gueule de</i>	
<i>Loup</i> ; angl. : <i>Snapdragon</i>	0.50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<i>Apios tuberosa</i>	0.50	<i>Aster Bigelowi</i> (lilas clair)	0.50
Sorte de Haricot vivace grimpant, à gros tubercule, été fl. rouge lie de vin.		» <i>cordifolius</i>	0.50
<i>Apocynum androsæmifolium</i>	1.—	» <i>diffusus</i>	0.50
<i>Aquilegia californica hybrida</i>	0.50	† » <i>diplostephioides</i>	0.50
» <i>cœrulea hybrida</i>	0.50	» <i>ericoides</i> (<i>Larme du jardinier</i>)	0.50
» <i>grandiflora</i>	0.50	» <i>dumosus</i>	0.50
» <i>Haylodgensis</i>	1.—	» <i>foliaceus</i>	1.—
» <i>Helenæ</i>	0.50	» <i>floribundus</i>	0.50
» <i>hybrida</i> (var. anglaises)	0.50	» <i>gramineus</i>	0.50
» <i>Jæschkani</i> (<i>Chrysanthæ × Skinneri</i>)	1.—	» <i>grandiflorus</i> (esp. tardive tr. belle)	1.—
» <i>nivea grandiflora</i>	0.50	» <i>horizontalis</i>	0.50
» <i>rosea</i>	0.50	» <i>incisus</i> (<i>Calimeris incisa</i>)	0.50
» <i>vulgaris</i> , et ses variétés	0.50	» <i>lævigatus</i> , <i>A. lucidus</i>	0.50
Les Ancolies sont excell. pour garnir les massifs ombragés, émailler les lieux frais et les gazons et fleurir la pl. terre. On en fait de délicieux motifs de décoration dans le bord des massifs d'arbres.		» <i>longifolius</i> (fl. blanches)	0.50
<i>Arabis albida</i> (<i>Corbeille d'argent</i>)	0.50	» <i>Maacki</i>	0.50
» » à fl. pleines	0.50	† » <i>nanus</i>	0.50
Très belle var. à grand effet; forme des touffes très larges, se recouvrant de fl. blanches d'avril en juin.		» <i>niveus</i> (fl. blanc pur).	0.50
<i>Aristolochia clematitis</i>	0.50	» <i>Novæ Angliæ</i>	0.50
» <i>Pistolochia</i>	2.50	» » <i>Belgii</i>	0.50
» <i>rotunda</i>	2.50	» » à fl. blanc pur	0.50
<i>Arum italicum</i> (excell. pl. d'ombre).	0.50	† » <i>Porteri</i> (blanc pur; nain)	0.50
<i>Arundo Donax</i>	0.50	» <i>Ptarmicoides</i> (fl. blanches, très belles)	1.—
» » fol. var.	2.50	† » <i>pumilus</i>	0.50
<i>Asclepias Cornuti</i> (<i>A. syriaca</i>)	0.50	» <i>pyrenæus</i> (très beau et très rare).	2.50
» <i>purpurascens</i>	0.50	» <i>roseus</i> (beau carmin vif)	0.50
» <i>speciosa</i>	1.50	» <i>sagittæfolius</i>	0.50
» <i>tuberosa</i> (superbe pl. d'été et d'automne)	1.50	» <i>scaber</i>	0.50
L'A. Cornuti (<i>Pl. aux oiseaux</i> ou <i>Herbe à la Ouate</i> à cause de ses graines soyeuses, contenues dans des fruits qui ont la forme d'oiseaux) est des meilleures pl. mellifères connues; ses nombreuses fl. rose brunâtre, très odorantes renferment une quantité considérable de miel qui est très recherché des abeilles; cette esp. est stolonif. et très envahissante, elle réussit dans les plus mauvais sols. L'A. <i>tuberosa</i> est l'une des plus brillantes plantes vivaces; espèce basse, à nombreuses fleurs orangé vif, se succédant d'août en octobre; soleil.		» <i>sericeus</i> (feuill. argenté soyeux; belles fl. violettes)	1.50
<i>Asphodelina cretica</i> (<i>Asphodelus creticus</i>).	0.50	» <i>tenuifolius</i> (fl. blanches).	0.50
» <i>lutea</i>	0.50	» <i>Towsendi</i>	1.—
Jolies Asphodèles très rustiques, à fl. jaunes; la dernière est connue sous le nom de <i>Bâton de Jacob</i> ; sol profond, soleil.		» <i>Tripolium</i>	0.50
<i>Asphodelus albus</i>	0.50	» <i>turbinellus</i> (l'un des plus gracieux).	0.50
» <i>ramosus</i>	0.50	» <i>versicolor</i>	0.50
Les Belles Asphodèles ou Lis de Provence, réussissent bien chez nous dans une situation sèche et ensoleillée.		Bonnes pl. d'automne qui se contentent de peu et résistent aux plus mauvais sols; très florifères elles constituent un bel ornement des massifs, plates-bandes, pelouses vertes et sont bonnes comme fl. coupées. Les esp. marquées d'une † sont naines et propres à la rocaille.	
<i>Aster acuminatus</i>	0.50	<i>Bambusa aurea</i>	2.50
» <i>azureus</i>	0.50	» <i>Metake</i> (<i>Arundinaria japonica</i>)	2.50
† » <i>Bessarabicus</i>	0.50	» <i>minima</i>	2.50
Belle esp. à gr. fl., l'une des plus florifères et recommandables. Grandes fleurs lilas violet, plante basse et de grand effet. Cult. facile.		» <i>nigra</i>	2.50
		» <i>pumila</i>	2.50
		<i>Bocconia</i> (<i>Maclaya</i>) <i>cordata</i>	0.50
		» <i>microcarpa</i>	0.50
		Belles Papavéracées ornementales, à feuill. glauque et denté très élégant, à tiges élevées et à fl. blanc rosé très nombreuses; juillet-sept.; le B <i>microcarpa</i> la plus belle du genre, atteint 3 et même 3 1/2 m. de haut. Excellentes pl. à isoler dans les gazons; très solides.	
		<i>Boltonia latisquama</i>	0.50
		Sorte d'Aster très florifère, aux innombrables capitules lilas rose, très propres à orner les jardins et les grands rochers.	
		<i>Borago orientalis</i>	0.50
		L'une des premières fl. du printemps; fl. bleu et rose; ombre ou mi-ombre; pl. ornementale.	

	Fr. Ct.
Buphtalmum (Telekia) speciosum	0.50
Belle pl. d'ornement à grande f. cordiforme, à capitules jaune vif, au disque brun, répandant une agréable od. de résine; été; culture très facile. Très belle quand isolée dans les parterres.	
Centaurea atropurpurea	0.50
» Babylonica (pl. géante à fl. jaun.)	1.—
» macrocephala	0.50
Centranthus ruber	0.50
» var. atrorubens	0.50
» var. à fl. blanches	0.50
La Valériane rouge ou Barbe de Jupiter est l'une des meill. pl. vivaces; elle anime de ses fl. de feu les murailles des vieux châteaux, les talus pierreux des chemins de fer; c'est l'une des plus brillantes d'entre les fleurs mérid. et elle s'est naturalisée un peu partout chez nous. Elle fleurit tout l'été et même l'aut.; il lui faut le soleil.	
Cheiranthus Cheirii (Viollier)	0.50
» semperflorens	0.50
Chelone barbata (Penstemon)	0.50
» obliqua	1.—
» à fl. blanches.	1.—
Très belles pl. d'ornement et excell. pour la fl. coupée; le Ch. barbata et ses var. hybrides sont d'entre les plus brillantes des pl. viv.; fl. rouge très ardent chez le type, passant par différ. teintes et jusqu'au carmin chez ses var.; bonne terre meuble; sol.; été et aut.	
Chrysanthemum lacustre	0.50
» maximum	0.50
» uliginosum	0.50
Grandes Marguerites blanches de bel effet dans les jardins.	
Clematis Davidiana (fl. bleues)	1.—
» integrifolia (fl. bleu foncé)	0.50
» recta (erecta) (fl. blanches)	0.50
» stans (fl. odorantes, lilas)	2.50
» tubulosa (fl. bleues)	1.—
Ces clématites sont herbacées et mi-ligneuses; elles forment de fortes touffes de 60 cm. à 1 m. 50 de haut; leurs fleurs sont bleues (blanches et très nombreuses chez recta) et très ornementales; sol.; sol profond et léger; été.	
Clerodendron foetidum	1.—
Convallaria majalis. (La douz. 2 fr.)	0.50
» grandiflora	0.50
Coreopsis auriculata	0.50
» diversifolia	1.50
» grandiflora	0.50
» var. Eldorado	0.50
» lanceolata	1.—
» rosea (à fl. roses)	1.—
» tenuifolia	1.—
» tripteris	0.50
» verticillata	1.—
Les Coreopsis vivaces sont extrêmement précieux pour la décoration des jardins et pour la confection des gerbes et bouquets; leurs fleurs très brillantes, très nombreuses, ornementales, se gardent longtemps dans l'eau; ils n'exigent aucun soin et demandent seulement un sol sain et un peu de soleil.	

	Fr. Ct.
Crambe cordifolia	1.—
» grandiflora	1.—
» maritima (Chou marin)	0.50
Grandes Crucifères dont les immenses panicules de fl. blanches, très ornementales surtout chez cardifolia et grandiflora, sont extrêmement belles à voir.	
Crinum Powellii	1.50
» à fl. blanches	1.50
Superbe Amaryllée à fl. rose tendre, rustique et fleurissant de juin en automne.	
Cynanchum acutum	1.—
Datisca cannabina	1.—
Delphinium azureum	0.50
» Belladonna , du plus pur azur	1.50
» grandiflorum	2.50
» Brunonianum	1.50
» cœlestris	0.50
» Formosum (beau, bleu foncé)	1.—
» grandiflorum (bleu céleste superbe)	0.50
» à fl. blanches.	1.—
» à fl. lilas	1.—
» à fl. rose foncé	1.50
» à fl. azurées	1.50
» nain	1.50
Le D. Grandiflorum et ses var. sont les meilleures des pl. vivaces; réussit dans tout sol pas trop lourd, grâce à sa racine mi-tubéreuse et fleurit pendant tout l'été. Les fl., d'un bleu très pur, rappelant les fl. de gentiana verna, forment des panicules nains d'une grande beauté. Excellent pour la fl. coupée grâce à ses tiges de fer.	
» hybridum	0.50
» variétés avec noms	1.—
(Nous possédons une collection de 30 variétés différentes, à fl. simples ou pleines, dans les plus beaux coloris.)	
» nudicaule	1.—
» sulfureum	1.—
Les pieds d'alouettes vivaces sont excellents pour la décor. des jardins; les fleurs d'un bleu souvent superbe, passant, suivant les espèces, de l'azur du ciel au bleu très foncé, sont extrêmement belles et décoratives. D. nudicaule est rouge écarlate et sulfureum jaune clair. Ces deux derniers sont tuberculeux.	
Dianthus plumarius (type)	0.50
(La douz. 2 fr.)	
Excell. pl. à bordure, très propre à planter sur les talus secs et exposés au soleil. C'est l'une des pl. que nous recommandons le plus vivement pour la décoration des lieux arides et secs.	
» var. Oeillets mignardises , dans les différentes variétés à fl. doubles ou simples	0.50
(La douz. 5 fr.)	
» semperflorens (Oeillet flon)	1.—
(voir Oeillets).	
» Zonatus (Oeillet Cyclope)	0.50
Pour les autres Dianthus, voir <i>Pl. alpines</i> .	

	Fr. Ct.
<i>Dictamnus albus</i> (<i>Dictame</i>)	1.—
» <i>caucasica</i>	1.50
» <i>Fraxinella</i> (<i>Fraxinelle</i>)	1.—
Rutacées à forte odeur balsamique très saine, à fl. roses ou blanches, en épis dressés; c'est le <i>Burning Bush</i> des Anglais; dans les soirs calmes de l'été, si l'on approche une allumette enflammée de la grappe en fleurs, le gaz qu'elle exhale de ses glandes résineuses prend feu et il se produit une flamme qui entoure toute la grappe (expérience bien connue de tous les étudiants en sciences). Soleil; mai-juin.	
<i>Digitalis purpurea</i>	0.50
» » à fl. blanches	0.50
<i>Echinacea angustifolia</i> (<i>Rudbeckia angustifolia</i>)	0.50
» <i>magnifica</i>	0.50
» <i>purpurea</i> (<i>Rudbeckia purpurea</i>)	0.50
» » <i>nana</i>	1.50
Excell. pl. à capitules rouge-pourpre, à très longs ligules retombants chez angustif.; fl. excellentes pour bouquets chez purpurea et qui se conservent plus. semaines dans l'eau. Cette dernière est l'une des plus belles et l'une des plus florifères d'entre les plantes vivaces; sol. ou mi-sol.; sol léger; juin-novembre.	
<i>Echinops banaticus</i>	1.—
» <i>Ritro</i> (<i>Boule bleue</i>)	0.50
» <i>sphærocephalus</i> (<i>Boule azurée</i>)	0.50
<i>Eremurus</i> , voir <i>Pl. alpines</i> .	
<i>Eryngium cœruleum</i> (<i>E. dychotom.</i>)	0.50
» <i>creticum</i>	0.50
» <i>giganteum</i>	0.50
» <i>maritimum</i> (verdure gris plomb).	1.—
» <i>Oliverianum</i>	0.50
» <i>planum</i> (<i>Panicaut du désert</i>)	0.50
Voir en outre <i>Pl. alpines</i> .	
Ces divers Panicauts appartiennent tous au même genre que le Chardon bleu de nos Alpes; moins élégants dans leur découpe ils ont cependant tous une certaine valeur ornementale; fl. à involucre (qui sont souvent très finement découpés) et tiges, presque jusqu'à la base, bleuisant au moment de l'anthèse et deviennent, en été, d'un bleu intense; on en confectionne des bouquets d'hiver car ils conservent bien leur teinte et leur forme quand on a soin de les sécher à l'ombre. Ce sont d'ailleurs d'excellentes pl. décoratives et qui offrent l'avantage de réussir dans les plus mauvais sols et les pentes les plus arides.	
<i>Eulalia japonica</i>	1.—
» » <i>zebrina</i>	1.—
Graminées ornementales de grand effet.	
<i>Eupatorium ageratoides</i>	0.50
» <i>cannabinum</i> à fl. blanches	0.50
» <i>purpureum</i>	0.50
Composées à fl. serrées, en capitules dressés, blancs ou roses; juillet-sept., soleil.	
<i>Funkia</i> (<i>Hemerocallis</i>).	
» <i>Fortunei</i>	0.50
» <i>glauca</i>	0.50
» <i>grandiflora</i> (fl. blanch. très odor.)	0.50

	Fr. Ct.
<i>Funkia lancifolia</i>	0.50
» <i>ovata</i> (<i>F. cœrulea</i>)	0.50
» » var. <i>marginata</i>	0.50
» <i>Sieboldiana</i> (<i>F. cucullata</i>)	0.50
» » <i>variegata</i>	0.50
» <i>subcordata</i> (fl. blanches, très odorantes (<i>F. alba</i>))	0.50
» <i>undulata</i>	0.50

Ces pl. connues sous le nom d'Hémérocailles, sont des esp. d'ombre très résistantes; ce sont les seules pl. qui puissent résister dans les cours et jardins du centre de la ville de Londres; leurs superbes feuillages sont un ornement de premier ordre pour les jardins et la culture en vases ou en bacs. Ils résistent aux hivers les plus rigoureux et fleurissent, de juin en automne, suivant les esp. Les *F. grandif.* et *subcord.*, ont de grandes fl. blanc pur répandant le parfum du Lis blanc des jardins.

<i>Gaillardia aristata</i>	0.50
» <i>aurantiaca</i>	0.50
» <i>grandiflora</i>	0.50

Belles Composées à gros capitules jaune et rouge, très florifères et ornementales; excellentes pour la fleur coupée.

<i>Galatella</i> (<i>Aster</i>) <i>canescens</i>	0.50
» <i>hyssopifolia</i>	0.50

Ce sont des Asters aux capitules réunis en ombelles serrées; très belles pl. fleur. de juillet en octobre.

<i>Galega officinalis</i>	0.50
» <i>orientalis</i>	0.50
» <i>persica</i>	0.50

Papilionacées vigoureuses et très florifères (juin-novembre), aux innombrables fl. lilas et violet ou blanches, très robustes et se contentant de toutes les situations.

<i>Gaura Lindheimeri</i>	0.50
------------------------------------	------

Grande pl. aux tiges élancées, garnies des fl. très élégantes, blanc et rose, très propres à agrémenter les pelouses de verdure, les plates-bandes, les grands rochers; soleil; juillet-octobre.

<i>Grindelia robusta</i>	0.50
» <i>squarrosa</i>	0.50

Composées à fl. jaunes très brillantes et nombreuses, à involucre élégant; sept.-nov.; soleil ou mi-soleil; très bonnes pour bouquets.

<i>Gyneryum argenteum</i>	1.50
<i>Gypsophila paniculata</i>	0.50
» » à fleurs pleines	2.50
» » <i>compacta</i>	1.50
» <i>Scorzoneraefolia</i>	0.50

La *G. panicul.* est l'une des meill. d'entre les fl. à bouquets et une excell. pl. d'ornement; ses myriades de petites fl. blanches, portées sur des tiges capillaires et diffuses lui donnent l'air d'un voile de gaze entourant la pl.; on l'utilise beaucoup pour donner de la grâce et de l'élégance aux groupements de fl. coupées car elle se maintient bien et même se sèche

	Fr. Ct.
pour les bouq. d'hiver; isolée dans un gazon elle fait un effet superbe; soleil et sol profond. Les autres ont de plus grandes fl. roses.	
<i>Helenium autumnale</i>	0.50
» » var. <i>cupreum</i>	1.—
» » <i>Autumn Glory</i>	1.—
» <i>Bigelowi</i>	1.—
» <i>Hoopesi</i>	0.50
» <i>montanum</i>	1.—
» <i>pumilum</i>	0.50
» » <i>superbum</i>	1.—
Composées à fl. jaunes ou rouge cuivre, très florif. et bonnes pour bouquets; soleil. Juillet-octobre.	
<i>Helianthella quinquænervis</i>	1.50
<i>Helianthus angustifolius</i>	0.50
» <i>californicus</i> (<i>Soleil d'automne</i>)	0.50
» <i>ciliaris</i> (très beau)	1.50
» <i>doronicoides</i> (très grandes fleurs)	0.50
» <i>Maximiliani</i> (<i>Soleil d'été</i>)	0.50
» <i>mollis</i>	0.50
» <i>multiflorus</i>	0.50
» » à fl. doubles	0.50
» » à fl. pleines	0.50
» <i>Orgyalis</i>	0.50
» <i>rigidus</i> (<i>Harpalium rigidum</i>)	0.50
» » var. <i>Miss Nelly</i>	0.50
» <i>tuberosus</i> (<i>Topinambour</i>)	0.50
Les <i>Soleils</i> ou <i>Tournesols</i> vivaces ont été nommés avec raison les <i>rois des jardins</i> ; leurs nombreux et brillants capitules jaunes au cœur brun, sont un ornement précieux pour des bouquets et gerbes de fl.; leurs grandes formes produisent le plus bel effet dans les parterres, les parcs et jardins, surtout quand on les isole dans les pelouses. L'H. <i>californicus</i> est la merveille de l'automne, ses nombreux capit. oranges et presque séniles forment une guirlande qui court le long des tiges gracieusement arquées et élevées de près de 3 cm.; il fleurit à l'arrière-automne. H. <i>rigidus</i> , qui fleurit de juillet en septembre, est une excell. fl. à couper, de même que <i>multiflorus</i> et <i>doronicoides</i> . Ils ne demandent aucuns soins, se contentent de tout sol pas trop argileux et sont par excellence des pl. « bon enfant ».	
<i>Heliopsis lævis</i> (<i>Helianthus lævis</i>)	0.50
» <i>pitcherianus</i>	0.50
<i>Helleborus hybridus</i>	0.50
Les <i>Hellébores</i> hybrides, voisins de la Rose de Noël, ont été obtenus par le croisement des H. <i>abschasicus</i> , <i>niger</i> , <i>orientalis</i> et <i>viridis</i> ; ils offrent des couleurs et teintes très variées dans les tons roses, rougeâtres, cuivrés, verdâtres et blancs et fleurissent de janvier en avril. Leur feuillage est par lui-même très décoratif et leurs fleurs, qui apparaissent à une époque où l'on n'a encore que les fl. du Midi et les perce-neige, sont extrêmement précieuses. Pour les conserver dans l'eau, il faut pratiquer à la base de la tige 2 ou 3 incisions; sans cela elles flétrissent de suite; ombre ou mi-ombre.	
<i>Hemerocallis aurantiaca</i>	1.50
» <i>flava</i> (<i>Lis jaune</i>)	0.50
» <i>fulva</i>	0.50
» » à fl. doubles	1.50

	Fr. Ct.
<i>Hemerocallis Middendorffiana</i>	0.50
Les Hémérocalles (angl. Day lilies) sont de beaux lis aux fl. jaunes, parfois très parfumées, qui fleurissent de mai-juin et forment de grosses touffes décoratives et élégantes; soleil.	
<i>Heracleum giganteum</i>	1.—
» <i>Mantegazzianum</i>	1.—
» <i>villosum</i>	0.50
Pl. très grandes, aux formes architecturales, très propres à isoler dans les gazons ou les grands jardins. L'H. <i>Mantegazzianum</i> , dont les graines ont été rapportées du Caucase par MM. Levier et Sommier et données à notre jardin, est la merveille des pl. géantes. C'est une des meill. pl. mellifères et sa gigantesque ombelle, qui dans un sol profond, meuble et gras, peut atteindre 1 m. 1/2 de diamètre, porte (voir <i>Nuovo Giornale botanico italiano</i> , vol. VI, 1895), près de 10,000 fl., est portée par une hampe pourprée, haute 2 1/2 à 3 m.; les feuilles sont gigantesques et toute la pl. produit un effet superbe.	
<i>Hesperis matronalis</i> (<i>Girarde</i>)	0.50
<i>Hibiscus militaris</i>	2.50
» <i>palustris</i> (<i>Ketmie herbacée</i>)	2.50
» » à fl. blanches	2.50
» <i>roseus</i>	2.50
Ces Ketmies ont des fl. superbes, très grandes, d'un très beau carmin ou rose-clair, ou blanc-rosé avec des macules foncées à la base. Ce sont des fl. brillantes et très décoratives et ces pl. sont d'entre les plus belles qui se puissent voir. Très rustique sous notre climat, elles ne demandent qu'une bonne terre de jardin profonde et une situation un peu chaude.	
† <i>Hypericum aureum</i>	1.—
» <i>calycinum</i>	0.50
† » <i>densiflorum</i>	1.—
» <i>empetrifolium</i>	1.—
† » <i>galioides</i>	1.—
» <i>Gebleri</i>	0.50
† » <i>hircinum</i> (<i>Millepertuis Bouc</i>)	0.50
† » <i>Hookerianum</i>	2.50
» <i>japonicum</i>	1.50
† » <i>Kalmianum</i>	1.—
† <i>Hypericum Moserianum</i> (fl. jaunes à anthères rouges)	0.50
† » <i>patulum</i>	1.—
† » <i>prolificum</i>	1.—
Les esp. marquées d'une † sont arbustives ou sous-frutescentes; fl. jaunes, très brillantes, se succédant de juin en août; soleil.	
<i>Ipomæa</i> (<i>Pharbitis</i>) <i>Leari</i>	1.50
<i>Ipomæa pandurata</i>	5.—
<i>Liseron</i> vivace à gros tubercules, à belles et nombreuses fl. blanches, à gracieux ramaux retombant; l'une des plus rares et des plus belles d'entre les pl. rustiques chez nous; il lui faut un sol profond, meuble, une exposition chaude et abritée; fleurit de juillet en octobre.	
» <i>leptophylla</i>	2.50

	Fr. Ct.
Iris germanica	0.50
» » à f. panachées	1.—
» Kämpferi	0.50
» » variétés	

Nous possédons une belle collection des variétés horticoles des Iris germanica et Kämpferi et en faisons des assortiments sur demande.

Kniphofia aloides (<i>Tritoma Uvaria</i>)	0.50
» grandiflora	1.—
» Nelsoni	1.—
Lathyrus latifolius « white Pearl »	1.—
Lilium candidum (Lis de la Vierge)	0.50
» tigrinum	0.50
Linum perenne	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. roses	0.50

Solide et excellente plante vivace à floraison très prolongée.

Lobelia cardinalis (vrai)	1 50
» fulgens	0.50
» Gerardi	1.—
» Rivoirei	1 50
» rosea ardens	2.50

Très belles pl. d'ornement, à grand effet, fleurissant de juillet en automne; mi-nombre; sol frais et sain. Le L. cardinalis vrai, au feuillage vert clair, aux fl. rouge vermillon ardent, est une des plus belles pl. vivaces. Il aime les sols humides ou frais.

Lychnis chalcedonica (<i>Croix de Malte</i>)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. rose chair	0.50
» coronaria (<i>Coquelourde</i>)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» dioica, à fl. doubles	1 50
» diurna fl. pl.	1.—

Excell. pl. pour lieux ensoleillés, plates-bandes, et pour isoler dans pelouses; la Croix de Malte, avec ses capitules de fl. vermillon et la Coquelourde, avec sa masse de grandes fl. carmin vif, sont d'entre les meill. pl. d'ornement; cette dernière fleurit tout l'été.

Monarda dydima (<i>Thé d'Oswego</i>)	0.50
» » Cambridge scarlet	0.50
» » à fl. blanches	1.—
» fistulosa (<i>Bergamotte</i>)	0.50
» Kalmiana	0.50
» purpurea	0.50
» rosea superba	0.50
» Russelliana (<i>Monarde rose</i>)	0.50

Très belles pl. à fl. élégantes et décoratives, à feuillage odoriférant, fleurissant de juillet en automne; mi-ombre; bon sol sain; excell. fl. pour bouquets. Le M. dydima a les fl. d'un rouge vermillon velouté très brillant; le M. fistulosa les a d'un carmin vif et Russelliana rose lilas. Ces pl., trop peu connues, méritent d'être dans tous les jardins.

Oeillet flon (<i>Dianthus semperflorens</i>)	I.—
----------------------------------------------------------	-----

Nous possédons deux var. de ce superbe œillet qui fleurit d'un bout de l'année à l'autre et dont l'origine est inconnue. (On le croit hy-

bride entre les œillets de jardins et celui de Chine.) C'est l'une des meill. plantes pour la cult. en pots comme pour la pleine terre où il donne avec abondance ses énormes bouquets serrés de fl. rose carmin vif très doubles et éclatantes. Plante ne s'élevant pas à plus de 20 à 30 cm. et résistant l'hiver dehors.

Oeillet flon à fl. striées de blanc et de carmin (var. superbe et de grand effet).	1.50
------------------------------------------------------------------------------------	------

PAEONIA, PIVOINES

I. ESPÈCES BOTANIKES (à fl. simple.)

Paeonia albiflora, à fl. blanch. odor	5.—
» Bannatica	2.50
» Beresowskii	2.50
» corallina	1.—
» decora (<i>P. romanica</i>)	1 50
» Emodi (fl. blanc-jaunâtre)	2.50
» humilis	1.—
» lobata	1.—
» lutea	5.—
» macrophylla	2.50
» mlokosewshi	2.50
» Montan (en arbre)	2.50
» officinalis	0.50
» paradosa	2.50
» peregrina	0 50
» Russi	2.50
» tenuifolia	2.50
» » fl. pl.	1.—
» » alba	2.50
» triternata	2.50
» » à fl. blanches	2.50
» Wittmanniana	2.50

II. VARIÉTÉS HORTICOLES :

P. albiflora (<i>Pivoines de Chine</i>) à	2.50
-------------------------------------------------------	------

Nous possédons un grand assortiment d'entre les plus belles variétés de Pivoine de Chine et en faisons des collections sur demande à 2 fr. 50 la plante.

Paneratium Illyricum	1.50
» maritimum	1.—
Papaver bracteatum (<i>P. involucratum</i>)	0.50
» » var. maximum (tr. gr. fl.)	0.50
» » var. praecox	1.—
» orientale (<i>Pavot vivace</i>)	0.50
» » Beauty of Levermere	1.—
» » Brightness	1.—
» » Duke of Teck	1.—
» » Grand Mogol	1.—
» » Grosfürst	1.—
» » Hesperia	1.—
» » Mahony	1.—
» » Marie Studholme	1.—
» » Menelik	1.—
» » Mrs. Marsh	1.50
» » Prince of Orange	1.—
» » Prinzess Ena	1.50

	Fr. Ct.
Papaver orientale Prinz. Victoria-Louise	1.—
» » Proserpine	1.—
» » Psyché	1.—
» » Rose Queen	1.50
» » Royal Scarlet	1.—
» » Salmon Queen	1.—
» » semiplenum	2.50
» » Silberblick	1.50
» » Silver green	1.—

Les Pavots vivaces d'Orient et leurs variétés sont l'une des merveilles du monde des fleurs. Rien n'égale l'éclat de leurs masses rouge ardent, rouge cinabre, vermillon, écarlate, cardinal, sang de bœuf, brun noir, rose tendre, rose vif, rose chair très clair, rose lilas ou bleuâtre et de leurs teintes variées dans les variétés nouvellement mises au commerce. Leur culture est des plus simple, car il suffit d'un sol meuble pour les voir étaler, dans les mois de mai-juin, leurs brillants atours.

Douze var. à notre choix, 8 fr.; 6 idem, 4 fr.

Pentstemon acuminatus (fl. bleues)	0.50
» antirrhinoides	1.50
» azureus (bleu azur)	1.—
» campanulatus (rose-pourpre)	1.50
» carinatus (rose)	1.50
» Cobæa (bleu rose; très gr. fl.)	0.50
» cœruleus	1.50
» cordifolius	1.50
» confertus (basse, fl. bleues)	1.—
» cyananthus (violet très foncé)	1.—
» diffusus (rose-pourpre)	0.50
» Digitalis (blanc-bleuâtre)	0.50
» Gentianoides (versicolore)	1.—
» glaber (violet-rose)	0.50
» glaucus (violet-rougeâtre)	1.—
» Gordonii splendens	2.—
» Hallii (nouv. espèce californ.)	2.50
» heterophyllus (très beau bleu)	2.50
» hybridus (dans les meilleures variétés anglaises et françaises)	0.50
» Jamesi (pl. alpine de rocaïlle)	1.50
» lævigatus (blanc teinté bleu)	1.—
» linarioides	1.50

Délicieuse petite pl. traînante aux fl. lilas.

» menziesii	2.50
» » Douglasi	2.50
» ovatus (bleu-rougeâtre)	0.50
» pubescens (blanc-bleuâtre, opale)	0.50
» puniceus (rouge-minium)	2.50
» Richardsonii (bleu-violacé)	1.—
» Scouleri (rose-violacé)	1.—
» secundiflorus	1.50
» Watsoni	1.—
» Wrigtii (rouge-violacé)	1.—

Les *Penstemon* (*Beard tongue* des Américains) sont d'excell. pl. viv. très florifères et extrêm. gracieuses, fleurissent l'été et abondamment, des très propres à la confection des bouquets et gerbes, très élégantes dans les jardins et produisant un effet superbe.

	Fr. Ct.
Petasites gigantes	1.—

Pl. à feuil. gigantesques, orbiculaires et très décorat.; propre à garnir les lieux humides et ombragés: traçante. Voir *Pl. alpines*

Phlox vivaces hybrides.

Il en existe deux groupes différents. Le premier comprend les var. précoces qui proviennent des suffruticosa et glaberrima; le second, les tardives, odorantes qui proviennent de croisements entre les *P. maculata* et *paniculata*. Cette dernière catégorie a reçu le nom de *Phlox decussata* (Hort.). Il en existe un grand nombre de variétés dont nous n'avons conservé et multiplié que les meilleures que nous offrons au prix de 50 cts. le pied.

Phyllostachys (Bambusa) Henonis	1.50
Physostegia virginiana	0.50
» » à fl. blanches	0.50

Très belle Labiée à fl. roses, disposées en épis dressés et se succéd. de juil. en automne; très décorative et propre pour bouquets; la var. à fl. blanc pur est également très belle; mi-soleil ou soleil.

Phytolacca decandra	0.50
Platycodon autumnale	1.50
» glaucum	1.50
» grandiflorum	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » var. <i>nanum</i>	0.50
» Mariesi	0.50

Excell. Campanules à très grandes fl. bleu violacé, très foncé, blanc pur chez la variété bl., très ornementales et fleurissent de juillet en oct.; sol sain et profond; soleil. Pl. de grande valeur ornementale, très robustes et n'exigeant aucun soin.

Polygonum cuspidatum (<i>P. Sieboldi</i>)	0.50
» » (var. à feuilles pa-nachées)	1.—
» molle	0.50
» Sacchalinese	0.50

Ces renouées vivaces sont de belles pl. d'ornement grâce à leurs tiges élég. et feuillées, à la vigueur de leur croissance (les cuspid. et Sacchal. atteignent dans leurs tiges annuelles près de 3 m. de haut) et au fait qu'elles réussissent dans les plus mauvaises conditions. Le *P. molle* est moins décoratif, mais il offre, à l'arrière-automne (oct.-novembre), des grappes dressées de fl. blanc pur sur tiges pourpres qui sont charmantes et excell. pour bouquets.

Primevères des jardins, <i>Auricules</i> , <i>Primevères doubles</i> , etc.	0.50
Pyrethrum roseum	0.50

Variétés horticoles à fl. souples et doubles, rose, clair ou vif, carmin foncé ou clair, écarlate, cramoisi, pourpre, blanc, etc., à 1 fr.

Les Pyrètes fleurissent tout l'été; ce sont d'excellentes fl. à bouquets, se conservant longt. dans l'eau et de bonnes pl. de décoration, soleil; sol meuble.

	Fr. Ct.
† <i>Rheum Emodi</i> , <i>Rhubarbe de l'Himalaya</i>	1.50
† » officinale	1.50
† » palmatum	1.50
† » » fl. roseis	2.50
» <i>Rhaponticum</i> , <i>Rhubarbe alimentaire</i>	1.—
» » variétés <i>Paragon</i> , <i>Prince Albert</i> , <i>Queen Victoria</i>	1.—

Les Rhubarbes se cultivent dans un sol profond et riche en humus; les esp. décoratives (très propres à isoler dans les gazons) sont munies d'une t. Rh. offic. fournit la vraie var. de Rhub. des officines; les espèces et var. alimentaires (qu'on utilise aussi comme pl. de décoration) exigent pour donner des pétioles bien fournis, un sol très gras, très profond, remué et beaucoup d'arrosage; soleil.

<i>Rosmarinus officinalis</i> (<i>Romarin</i>)	0.50
<i>Rudbeckia ampla</i>	1.50
» <i>californica</i>	0.50
» <i>flava</i>	1.—
» <i>fulgida</i> (fl. jaune et noire)	0.50
» <i>hirta</i>	0.50
» <i>hybrida superba</i>	1.50
» <i>laciniata</i>	0.50
» » à fl. pleines	0.50
» <i>maxima</i>	1.50
» <i>nitida</i>	1.50
» <i>purpurea</i> (<i>Echinacea purpurea</i>)	0.50
» » <i>nana</i>	2.50
» <i>speciosa</i>	0.50

Les Roubecques sont des Composées de toute beauté, très ornementales et excell. pour la fl. coupée, se maintenant très longtemps dans l'eau; ce sont de grandes marguerites aux ligules jaune plus ou moins vif, entourant un disque brun ou noir; chez *Purpurea* ces lig. sont d'un rouge vineux très beau, et chez *maxima*, la plus brillante esp., ils sont jaune vif et très longs, retombant le long de la tige. R. lacin., à fl. doubles, est l'une des meill. pl. viv., très élég., très brillante, s'élevant à plus de 2 m. et se couvrant de gros capitules en forme de roses d'un jaune orangé très vif et qui se conservent 15 jours ou moins dans l'eau. Isolées dans les gazons, les Roubecques font un effet superbe; elles aiment le soleil et fleurissent de juin en automne.

<i>Salvia argentea</i> (feuilles argentées)	0.50
» <i>azurea</i>	1.—
» » v. <i>grandiflora</i>	1.50
» <i>ringens</i> (<i>Sauge grecque</i>)	1.—
» <i>Sclarea</i> (<i>sclarée</i>)	0.50

Ces Sauges sont des pl. aromatiques propres à planter au soleil; *S. azurea* a les fleurs d'un azur superbe (sept.-nov.) et fait grand effet, c'est une pl. de premier mérite.

<i>Silphium albiflorum</i> (très rare, à fl. blanches)	5.—
» <i>asteriscus</i>	0.50
» <i>dissectum</i>	1.50
» <i>integrifolium</i>	0.50
» <i>laciniatum</i> (<i>Herbe du pilote</i>)	1.50
» <i>perfoliatum</i> (<i>Plante au compas</i>)	0.50
» <i>terebinthaceum</i>	1.50

	Fr. Ct.
<i>Silphium trifoliatum</i> (<i>S. ternatum</i>)	1.50

Grandes Composées formant de fortes touffes, s'élevant parfois à plus de 2 m. et produisant, de juill. en oct., des capit. jaunes (sauf chez albifl.); tr. propres à isoler dans gazons à cause de leurs formes architecturales.

<i>Solidago arguta</i>	0.50
» <i>canadensis</i> (<i>Verge d'or</i>)	0.50
» <i>Drummondii</i>	0.50
» <i>graminifolia</i>	0.50
» <i>humilis</i>	0.50
» <i>lithospermifolia</i>	0.50
<i>Solidago missouriensis</i>	0.50
» <i>prostrata</i>	0.50
» <i>puberula</i>	0.50
» <i>reflexa</i>	0.50
» <i>Riddellii</i>	0.50
» <i>rigida</i>	0.50
» <i>rigidiscula</i>	0.50
» <i>serotina</i>	0.50
» <i>Shortii</i>	0.50
» <i>spectabilis</i>	0.50
» <i>virgaurea</i>	0.50
» <i>virginiana</i> (très tardif)	0.50

Les Verges d'or sont de bonnes pl. décoratives, très solides, formant des touffes dressées, plus ou moins élevées, à plus ou moins grands et élégants capitules, de fl. innombrables, jaune vif, orangé ou pâle, très élégantes, juillet-octobre. Sol quelconque; soleil ou mi-ombre. Le *S. canadensis* s'est vulgarisé dans certaines contrées de l'Europe centrale (entre autres dans les environs de Fribourg) et embellit considérablement le paysage auquel il donne une teinte or et orange, très chaude.

<i>Spiræa aruncus</i> (<i>Reine des bois</i>)	0.50
» <i>gigantea</i> (<i>S. Kamtschatika</i>)	1.—
» <i>lobata</i> (<i>S. venusta</i>) (rose vif)	1.—
» <i>palmata</i> (rose pâle)	1.—

Un sol frais et humide convient spéc. à ces belles Spirées qu'on a nommées avec raison les *Reines des prairies*.

<i>Statice Gmelini</i>	1.—
» <i>latifolia</i>	1.—

Bonnes pl. aux innombrables fl. bleu et rose, qu'on sèche pour les bouquets d'hiver; sol profond; soleil.

<i>Thladiantha dubia</i> , <i>Cucurbitacée</i> vivace et grimpante (pieds mâles et femelles)	1.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

<i>Tradescantia alba major</i>	1.50
» <i>virginica</i> (<i>Ephémère</i>)	0.50
» » à fl. blanches	0.50
» » à fl. pourpres	0.50

Curieuses fl. construites sur le plan de 3; pl. solides (juillet-sept.)

<i>Verbascum Ol ympicum</i>	0.50
» <i>Phoeniceum</i> (violet sombre)	0.50
» » var. à fl. blanch. ou roses	0.50

Bonnes pl. propres à garnir les lieux arides; fl. sessiles, en épis dressés; V. Phœn. et ses var. recherchent la mi-ombre.

	Fr. Ct.
Vernonia Arkansana	1.50
» eminens	1.50
» glauca	1.50
» præalta	1.—

Ce sont de belles Composées à formes élevées, fleurissant à l'automne.

Vinca major (<i>Grande Pervenche</i>)	0.50
(La douz. 2 fr.)	
» » à f. panachées	0.50
» » à f. réticulées, veinées de jaune	0.50
» à f. marginées de blanc	0.50

Vinca minor (<i>Petite Pervenche</i>) (à fl. blan- ches, bleues ou rouge-violet), La dz. 2 fr.	0.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------

	Fr. Ct.
Vinca minor (à fl. bleues doubles)	0.50
» » (à fl. rouges doubles)	0.50
Yucca angustifolia	2.50
» filamentosa	0.50
» glauca	2.50

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

100 plantes vivaces diverses fr. 40.—

50 » 20.—

25 » 10.—

12 » 5.—

Orchidées rustiques.

Nous adoptons dans cette liste la nomenclature de Pfitzer suivie dans le volume « Orchidées rustiques et leur culture », par H. CORREYON ; ce livre, qui traite de toutes les Orchidées pouvant résister dehors sous notre climat, est en vente au Jardin alpin au prix de 4 fr. Il est illustré de 40 figures et contient la description et le mode de culture de toutes les espèces terrestres rustiques. Cet ouvrage a eu un certain succès dans le monde horticole et a été primé dans 12 expositions.

	Fr. Ct.
Aceras anthropophora (<i>Orchis Homme</i> <i>pendu</i>)	1.50
» longibracteata	2.50
Anacamptis pyramidalis (<i>O. pyramidal</i>)	1.—
Bletilla hyacinthina (<i>Jacinthe du Japon</i>)	1.50
Calypso borealis	2.50
Cœloglossum viride (<i>Orchis grenouille</i>)	1 50
Cypripedium acaule	2.50
» Calceolus (<i>Sabot de Vénus</i>). (La douz. 10 fr.)	1.—
» califormicum	5.—
» macranthum	2.50
» mandschuricum	10.—
» montanum	2.50
» parviflorum	2.50
» pubescens (<i>Sabot de Vénus améri- cain</i>)	2 50
» spectabile (<i>Cypripède superbe</i>)	2 50
» venticosum	5.—
Epipactis palustris (<i>E. des marais</i>)	1.—
Goodyera repens (<i>Godière rampante</i>)	2.50
Gymnadenia albida (<i>Orchis miel</i>)	1.50
» conopea (<i>Orchis parfumé</i>)	1.—
» odoratissima (<i>Orchis suave</i>)	1.—
Habenaria ciliaris	2.50

	Fr. Ct.
Herminium Monorchis	2.50
Himantoglossum hircinum (<i>Orchis Bouc</i>)	2.50
Liparis Læselii	2.50
Listera cordata	2.50
» ovata (<i>Listère à f. ovales</i>)	1.—
Nigritella angustifolia (<i>Orchis vanillé</i>)	1.—
» suaveolens	5.—
Ophrys apifera (<i>Ophrys abeille</i>)	2.50
» arachnites (<i>O. frêlon</i>)	2.50
» aranifera (<i>O. araignée</i>)	1.50
» fusca	1.50
» lutea	2.50
» muscifera (<i>O. mouche</i>)	1.—
» speculum	2.50
» tenthradinifera	2.50
» Champagneuxi	5.—
Orchis coriophora	2.50
» fusca (<i>Orchis brun</i>)	2.50
» galeata (<i>O. casque</i>)	1.50
» globosa (<i>O. globuleux</i>)	1.50
» incarnata (<i>O. incarnat</i>)	1.—
» latifolia (<i>O. à f. larges</i>)	1.—
» laxiflora	2 50
» maculata (<i>O. maculé</i>)	1.—
» » à fl. blanches	2.50

	Fr. Ct.
Orchis mascula (<i>O. mâle</i>)	1.—
» militaris (<i>O. militaire</i>)	1.—
» morio (<i>O. bouffon</i>)	1.—
» » à fl. blanches	2.50
» » à fl. roses	2.50
» » à fl. violet-noir	2.50
» » à fl. lilas pâle	2.50
» olbiensis	2.50
» papilionacea	1.50
» palustris (<i>O. des marais</i>)	1.—
» provincialis	1.50
» pyramidalis, voir Anacamptis.	
» Robertiana	2.50
» sambucina (<i>O. sureau</i>)	1.—
» » à fl. rouges	1.—
» Simia (<i>O. singe</i>)	1.—
» spectabilis	2.50
» undulatifolia	1.50
» ustulata (<i>O. brûlé</i>)	1.50
Platanthera bifolia (<i>Orchis à deux feuilles</i>).	1.—

	Fr. Ct.
Platanthera chlorantha (<i>Orchis verdâtre</i>)	1.—
Spiranthes æstivalis (<i>Spiranthe</i>)	2.50
Serapias cordigera	2.50
» lingua	2.50
» longipetala	2.50

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX :

Nous faisons des collections d'orchidées rustiques, composées d'après les conditions de culture qui nous sont indiquées, et de telle façon qu'elles réussissent dans ces conditions, aux prix de :

50 Orchidées de plein air, en 25 espèces	fr. 35.—
25 idem en 25 espèces »	20.—
25 idem en 10 » »	12.—
12 idem en 12 » »	10.—
12 idem en 6 » »	5.—

Fougères rustiques.

Pour la description et le mode de culture des Fougères de plein air, voir le vol. *Les Fougères et les Sélaginelles*, par H. CORREVON, ouvrage illustré, couronné par plusieurs jurys ; prix : 2 fr. t. 0. En vente au Jardin alpin. Nous suivons ici encore la nomenclature de Hooker.

Les Fougères dont les noms sont précédés d'une † sont celles dont la verdure persiste l'hiver, c'est-à-dire qui sont *sempervirentes*.

	Fr. Ct.
* Adiantum capillus Veneris (<i>Cheveux de Vénus</i>)	1.—
» pedatum (<i>Capillaire du Canada</i>)	1.50
Cette dernière espèce est la plus gracieuse et la plus élégante des Fougères rustiques.	
Allosorus, voir <i>Cryptogramme</i> .	
† Aspidium acrostichioides	2.50
† » aculeatum	1.—
† » » var. <i>Braunii</i>	2.50
† » angulare	2.50
† » » proliferum (l'un des plus gracieux)	2.50
» atractos	2.50
» atratum	2.50
» Braunii	2.50
» erythrosorum	2.50
» laserpitiifolium	3.50
† » setosum	2.50
† » lobatum (beau et très solide).	1.—
† » Lonchitis (<i>Holyfern</i>)	1.—

	Fr. Ct.
† Aspidium munitum	2.50
» novæboracense	2.50
» pilosum	2.50
» pumilum	2.50
† Asplenium adiantum nigrum	1.—
† » adulterinum	2.50
» angustifolium	2.50
† Ceterach (<i>Ceterach officinarum</i>)	1.—
» Filix-fœmina (<i>Athyrium</i> f. f., <i>Foug. femelle</i>)	1.—

Nous offrons les var. suivantes du f. f. : cristatum, Edwardsii, Elworthii, Frizelliae, Howardi, plumosum et Victoriae, au prix de 2 fr. 50.

» fontanum (Hallesi)	0.50
» germanicum	2.50
» Goringianum tricolor	5.—
» lanceolatum	2.50
» Petrarchæ	5.—
† » ruta muraria (<i>Rue des murs</i>)	0.50

	Fr. Ct.
<i>Asplenium ruta muraria</i> , var. <i>incisum</i> . . .	2.50
» » » var. <i>microphyllum</i> . . .	2.50
† » <i>septentrionale</i> . . .	1.—
† » <i>trichomanes</i> (<i>Faux Capillaire</i>) . . .	0.50
† » » var. <i>incisum</i> . . .	2.50
† » <i>viride</i> . . .	1.—
<i>Athyrium</i> , voir <i>Asplenium</i> f. f.	
<i>Blechnum</i> , voir <i>Lomaria</i> .	
<i>Botrychium Lunaria</i> , <i>Lunaire</i> . . .	1.50
<i>Ceterach</i> , voir <i>Asplenium</i>	
* <i>Cheilanthes fragans</i> , <i>Ch. odora</i> . . .	2.50
<i>Cryptogramme acrostichioides</i> . . .	5.—
» <i>crispa</i> , <i>Allosorus crispus</i> (<i>Parsley fern</i> des Anglais) . . .	2.50
† <i>Cyrtomium caryotideum</i> (<i>Aspidium caryotideum</i>) . . .	2.50
† <i>falcatum</i> (<i>A. falcatum</i>) . . .	1.50
* <i>Fortunei</i> (<i>A. Fortunei</i>) . . .	1.50
Sup. Foug. du Japon, à belle verdure très ornementale; il leur faut une position abritée chez nous; très belles dans les appartements.	
<i>Cystopteris alpina</i> . . .	1.50
» <i>asplenioides</i> . . .	2.50
» <i>bulbifera</i> (<i>Fougère bulbifère</i>) . . .	0.50
» <i>dentata</i> . . .	2.50
» <i>fragilis</i> (l'une des plus gracieuses) . . .	0.50
» » var. <i>purpurea</i> . . .	2.50
» » var. <i>sempervirens</i> . . .	2.50
» <i>intermedia</i> . . .	2.50
» <i>montana</i> . . .	2.50
» <i>polipodioides</i> . . .	2.50
» <i>regia</i> . . .	2.50
» <i>tenuis</i> . . .	2.50
<i>Dicksonia punctilobula</i> . . .	2.50
<i>Lastrea</i> , voir <i>Nephrodium</i> .	
† <i>Lomaria alpina</i> . . .	2.50
† » <i>Spicant</i> (craint la chaux) . . .	1.—
<i>Lycopodium Selago</i> . . .	2.50
<i>Nephrodium cristatum</i> . . .	2.50
» <i>dædaleum</i> . . .	2.50
» <i>decursive-pinnatum</i> . . .	2.50
» <i>dilatatum</i> . . .	1.—
» <i>filixmas</i> (<i>Fougère mâle</i>) . . .	0.50
» » var. <i>crispum</i> . . .	2.50
» » var. <i>cristatum</i> . . .	2.50
» » var. <i>decurrens</i> . . .	2.50
» » var. <i>grandiceps</i> . . .	2.50
» » var. <i>grandidens</i> . . .	2.50
» » var. <i>lineare</i> . . .	2.50
» » var. <i>Pinderi</i> . . .	2.50
» <i>Goldianum</i> . . .	5.—
» <i>marginale</i> . . .	2.50
» <i>montanum</i> (<i>Oreopteris</i>) . . .	2.50
» <i>paleaceum</i> . . .	2.50
» <i>pseudo-mas</i> . . .	2.50
» <i>rigidum</i> (<i>Aspid. rigidum</i>) . . .	2.50

Très belle esp. pouvant résister au grand soleil; calcaire.

	Fr. Ct.
<i>Nephrodium spinulosum</i> . . .	1.—
» <i>thelypteris</i> . . .	1.—
† <i>Nothocleane Marantæ</i> . . .	2.50
* » <i>Onychium japonicum</i> . . .	1.50
<i>Onoclea germanica</i> (<i>Struthiopteris germ.</i>) . . .	1.—
» <i>orientalis</i> (<i>Struthiopt. pennsylvanica</i>) . . .	2.50
» <i>sensibilis</i> . . .	1.—
Esp. traçantes, très propres à garnir rapidement les lieux ombragés.	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> . . .	2.50
<i>Osmunda cinnamomea</i> . . .	3.—
» <i>Claytoniana</i> (<i>O. interrupta</i>) . . .	3.—
» <i>gracilis</i> . . .	2.50
» <i>japonica</i> . . .	3.—
» <i>regalis</i> (<i>Fougère royale</i> ; <i>F. fleur</i>) . . .	1.50
» » <i>cristata</i> . . .	2.50
<i>Phægopteris hexagonopteris</i> . . .	2.50
<i>Polypodium Dryopteris</i> (<i>Oak fern</i>) . . .	1.—
» <i>Phægopteris</i> (<i>Beech fern</i>) . . .	1.50
» <i>Robertianum</i> (<i>P. calcareum</i>) . . .	1.—
† » <i>vulgare</i> (<i>Fougerolle, Réglisse des bois</i>) . . .	0.50

La plus solide d'entre les Fourgères.

» » var. <i>cambricum</i> . . .	2.50
» » var. <i>cristatum</i> . . .	2.50
» » var. <i>trychomanoides</i> . . .	2.50
<i>Polystichum</i> , voir <i>Aspidium</i> .	
<i>Pteris aquilina</i> (<i>Fougère impériale</i>) . . .	1.50
† » <i>cretica</i> . . .	1.50
* <i>Scolopendrium Hemionitis</i> . . .	5.—
† » <i>vulgare</i> (<i>Langue de cerf</i>). (Dz. 5 fr.) . . .	0.50
† » » <i>bifrons</i> . . .	5.—
† » » <i>crispum</i> . . .	5.—
† » » <i>dædaleum</i> . . .	5.—
† » » <i>laceratum</i> . . .	5.—
† » » <i>undulatum</i> . . .	2.50
<i>Selaginella denticulata</i> . . .	1.—
» <i>Douglasii</i> . . .	5.—
» <i>Helvetica</i> . . .	0.50
» <i>rupestris</i> . . .	5.—
† <i>Woodsia hyperborea</i> . . .	2.50
† » <i>ilvensis</i> . . .	2.50
» <i>obtusa</i> . . .	2.50

COLLECTION A NOTRE CHOIX :

50 Foug. en 50 esp. ou variétés	50.—
50 » 25 »	35.—
25 » 25 »	25.—
25 » 10 »	15.—
12 » 12 »	10.—
12 » 6 »	6.—

Cactées rustiques.

	Fr. Ct.
Cereus phœniceus	5. —
Opuntia arborescens	1.50
» albospina	1.50
» arenaria	1.50
» Arkansæ	1.50
» brachyarthra	1.50
» brevispina	2.50
» cæspitosa	2.50
» camanchica	2.50
» » carnea straminea	2.50
» » carnosa	2.50
» » var. gigantea	2.50
» » var. minor	2.50
» » var. rubra (fl. rouge vif)	5. —
» cantabrigensis	5. —
» cymochila	2.50
» Engelmanni	2.50
» erythrostemma	5. —
» flavispina	2.50
» fragilis	2.50
» fulgida (fl. d'un rouge vif)	2.50
» Greenei	2.50
» humilis	2.50
» hybrida	2.50
» leucospina	2.50
» macrorhiza	2.50
» mesacantha	2.50
» missouriensis	2.50
» ophiocarpa	5. —

	Fr. Ct.
Opuntia orbicularis	2.50
» pachyclada rosea	5. —
» pisciformis	2.50
» polycantha	2.50
» » var. major	2.50
» Raffinesquiana	1. —
» rodantha (rose carmin vif)	5. —
» » var. pisiformis	2.50
» rubra	2.50
» salmonea	2.50
» Schumanniana	2.50
» Spæthiana	2.50
» spinacantha	5. —
» spinocentra	2.50
» vulgaris (Cactus du Tyrol)	1. —
» Xantostemma	2.50
» » var. elegans (rouge)	2.50
» » var. fulgens	2.50
» » var. gracilis	2.50
» » var. rosea (rose vif)	2.50

Ces Cactées sont d'une grande beauté. Elles résistent à nos climats les plus rudes, même au nord de l'Allemagne, si l'on a soin, l'hiver, de les couvrir d'un toit en planches à une certaine hauteur, de manière à ce que l'air puisse jouer dessus sans que la pluie ou la neige les atteigne. — Chez nous il suffit de les planter en plein soleil et dans un lieu sec; il est inutile de les couvrir l'hiver.

Plantes aquatiques et marécageuses.

	Fr. Ct.
Acorus Calamus (Roseau odorant)	0.50
» » à feuilles panachées	1. —
» gramineus (A. pusillus)	0.50
» » à feuilles panachées	1. —
Alisma natans	1.50
» plantago	0.50

	Fr. Ct.
Anagallis tenella (Mouron rose)	2.50
Anemone rivularis	0.50
Aponogeton distaction	1.50
Arundo Donax	0.50
Astilbe rivularis	0.50
Astrantia major	0.50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Butomus umbellatus (<i>Jonc fleuri</i>)	1. —	Lysimachia clethroides	0.50
Calla palustris	1. —	» nummularia (trainante)	0.50
Caltha palustris (<i>Populage</i>)	0.50	» punctata	0.50
» » à fl. pleines	1. —	» thrysiflora	0.50
Cardamine pratensis (<i>Cresson violet</i>)	0.50	» vulgaris	0.50
» » à fl. doubles	1. —	Menyanthes trifoliata (<i>Trèfle d'eau</i>)	0.50
Carex Buchanani (verdure brune)	1. —	Mimulus cardinalis	0.50
» maxima	0.50	» luteus	0.50
» stricta	1. —	Myosotis palustris	0.50
Comarum palustre	0.50	» » semperflorens (pl. superbe, fleurissant du printemps à l'automne	0.50
Epilobium abysynicum	0.50	Nuphar luteum (<i>Nénufar jaune</i>)	2.50
» hirsutum	0.50	Nymphæa alba (<i>Nénufar blanc</i>)	1. —
» » à fl. blanches	1. —	» chromatella	2.50
Epipactis palustris	1. —	» rosea	2.50
Eriophorum alpinum	1. —	» rubra	2.50
» angustifolium (<i>Line-aigrette</i>)	1. —	Osmunda regalis (<i>Fougère royale</i>)	0.50
» capitatum	1. —	Peltandra virginica	2.50
» latifolium	1. —	Phragmites communis à f. panachées	1.50
Gentiana Pneumonanthe	2.50	* Pontederia cordata	2.50
Hydrocharis morsus Ranæ	2.50	Potamogeton natans (<i>Potamot</i>)	1.50
Hydrocotyle rotundifolia (<i>H. Sibthor-</i> <i>pioides</i>)	2.50	Potentilla anserina	0.50
» vulgaris	0.50	» fruticosa	1. —
Hippuris vulgaris	1. —	» salessoviana	1. —
Hottonia palustris	2.50	Primula japonica	0.50
Houttuynia cordata	2.50	» Poissoni	0.50
Iris acoroides	0.50	» rosea	1. —
» cuprea	1. —	! Ranunculus Lingua	0.50
» pseudo-acorus (<i>Iris jaune</i>)	0.50	! Rumex hydrolapathum (<i>Bananier des</i> <i>eaux</i>)	1.50
» Kämpferi	1. —	! Sagittaria japonica	2.50
Juncus glaucus (<i>Jonc des jardiniers</i>)	0.50	» sagittæfolia	1. —
Limnanthemum nymphoides (<i>Villarsia</i>)	1. —	* Typha latifolia (<i>Massette</i>)	0.50
Lobelia cardinalis	1. —	* » minima	1. —
» syphilitica	0.50		

Arbustes et Arbres d'ornement.

Nous avons établi dans notre propriété de Floraire et dans nos environs une pépinière d'arbustes rares ou peu connus et même d'arbustes et d'arbres ordinaires. Nous en publions ici la première liste. Elle comprend aussi un certain nombre d'espèces rares que nous collectionnons depuis quelques années et avons reçu des sources les plus autorisées. D'ailleurs nos espèces sont contrôlées et identifiées dès qu'elles fleurissent. Les espèces basses et propres à garnir les rochers sont marquées d'une † et celles dont les feuilles sont persistantes d'un !

Un catalogue spécial d'arbustes d'ornement et d'arbres forestiers, conifères, etc., est envoyé aux clients qui le désirent. Comme il s'agit de fortes plantes, qui coûtent de gros ports, il ne concerne guère que nos environs.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Abelia triflora	2.50	Acer Platanoides	1.50
! » uniflora	2.50	» Pseudo-Platanus	1.50
Le premier est un arbre de 2 à 3 m. se couvrant littéral., de mai à fin juillet, de fl. roses et très odorantes.		Amelanchier alnifolia (<i>Aronia</i>)	2.50
Acer negundo californicum	2.50	» canadensis	1.50
		» vulgaris (<i>Aronia rotundifolia</i>)	1. —
		Amorpha fruticosa	0.50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<i>Amorpha canescens</i>	1.50	<i>Cistus ladaniferus</i>	1.50
» <i>nana</i>	1.50	» <i>laurifolius</i>	1.50
<i>Amygdalus Fenzliana</i>	2.50	Les seuls Cistes rustiques chez nous; très beaux.	
» <i>nana</i> (<i>Pêcher nain de Tartarie</i>)	2.50	* » <i>albidus</i>	1.50
Délicieux petit arbuste de premier printemps, se recouvrant littéralement de fleurs rose vif et très rustique.		* » <i>creticus</i>	1.50
<i>Anona triloba</i>	1.50	* » <i>monspeliensis</i>	1.50
* <i>Artemisia abrotanum</i>	0.50	» <i>populifolius</i>	2.50
» <i>arbuscula</i>	2.50	* » <i>salvifolius</i>	1.50
» <i>argentea</i>	2.50	<i>Cladrastris amurensis</i>	2.50
<i>Atriplex canescens</i>	1.—	» <i>tinctoria</i>	1.—
» <i>Halimus</i> (<i>Pourpier de mer</i>)	1.—	<i>Clerodendron foetidum</i>	1.—
<i>Baccharis halimifolia</i> (<i>Senegon en arbre</i>)	1.—	» <i>trichotomum</i>	2.50
<i>Berberis aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>)	1.—	* <i>Cneorum tricocum</i>	2.50
» <i>buxifolia</i> (<i>B. dulcis</i>)	1.—	<i>Cocculus carolinus</i>	2.50
» <i>ilicifolia</i>	1.—	* <i>Colletia subul</i>	2.50
» <i>Lycium</i>	1.—	<i>Colutea arborescens</i> (<i>Baguenaudier</i>)	1.—
» <i>stenophylla</i>	1.—	» <i>cruenta</i>	1.—
» <i>Thunbergii</i>	1.—	<i>Coriaria myrtifolia</i> (<i>Corroyère</i>)	1.—
» <i>virescens</i>	1.—	<i>Corniola mantica</i>	2.50
» <i>vulgaris</i> (<i>Épine-vinette</i>)	1.—	* <i>Corokia Cotoneaster</i>	5.—
<i>Betula alba</i> (<i>Bouleau blanc</i>)	1.—	<i>Cornus canadensis</i>	2.50
» <i>nana</i> (<i>Bouleau nain</i>)	1.50	» <i>florida</i>	2.50
L'un des meilleurs et des plus gracieux arbustes de rocailles.		» <i>rubra</i>	2.50
» <i>pumila</i> (<i>Bouleau bas</i>)	2.50	» <i>Purpusi</i>	1.50
<i>Broussonetia papyrifera</i>	1.50	» <i>sanguinea</i>	0.50
<i>Budleya japonica</i> (<i>curviflora</i>)	0.50	» <i>sibirica</i>	1.—
» <i>variabilis</i>	0.50	» <i>stolonifera</i>	1.—
Très bel arbuste à fl. lilas, violet et or ou bronze, en grappes allongées, très parfumé et fleurissent de juin jusqu'en hiver.		» <i>var. à bois jaune</i>	1.—
» <i>Veitchiana</i>	1.50	<i>Coronilla Emeroides</i>	2.50
Superbe variété récemment introduite, qui surpasse en beauté le type <i>variabilis</i> .		» <i>Emerus</i>	0.50
* <i>Bupleurum fruticosum</i> (<i>Oreille de lièvre</i>)	1.—	<i>Corylus</i> (<i>Noisetiers</i>) <i>americana</i>	1.—
<i>Cæsalpina japonica</i>	2.50	» <i>columna</i>	1.—
<i>Calophaca wolgarica</i>	2.50	» <i>japonica</i>	1.—
<i>Calycanthus floridus</i> (<i>Arbre aux Anémones</i>)	1.—	» <i>Sieboldiana</i>	2.50
» <i>occidentalis</i>	1.—	<i>Cotoneaster acuminata</i>	1.—
» <i>præcox</i>	1.—	» <i>angustifolia</i>	2.50
» <i>var. grandiflorus</i>	2.50	» <i>buxifolia</i>	1.—
* <i>Calycotome spinosa</i>	2.50	» <i>depressa</i>	2.50
<i>Caragana altagana</i>	1.—	» <i>frigida</i>	1.—
» <i>pygmæa</i>	1.—	» <i>horizontalis</i> (<i>C. Davidiana</i>)	1.—
<i>Caryopteris mastacanthus</i>	0.50	L'un des meilleurs arbustes de rocailles; branches étalées et se couvrant de baies rouges l'hiver.	
<i>Cedrela sinensis</i>	2.50	» <i>integerrima</i>	1.—
<i>Cedrus atlantica</i>	2.50	» <i>microphylla</i>	1.—
» <i>Libani</i>	2.50	» <i>multiflora</i>	1.—
» <i>pendula</i>	5.—	» <i>nepalensis</i>	1.—
* <i>Celtis australis</i> (<i>Micocoulier</i>)	1.—	» <i>nummularia</i>	1.—
» <i>caucasica</i>	2.50	» <i>pannosa</i>	1.—
<i>Cerasus Padus</i> (<i>Cerisier à grappes</i>)	0.50	» <i>rotundifolia</i>	1.—
» <i>virginica</i>	1.—	» <i>Simoni</i>	1.—
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	1.50	» <i>sinensis</i>	1.—
<i>Cercis siliquastrum</i>	1.—	1 » <i>thymifolia</i>	1.—
<i>Chænomeles</i> , voir <i>Cydonia</i> .		» <i>tomentosa</i> (<i>Cotonnier</i>)	1.—
<i>Chamæbathria millefolium</i>	5.—	» <i>vulgaris</i> (<i>Cotonnier commun</i>)	1.—
<i>Chamæcerasus Alberti</i>	1.—	<i>Cratægus Crus Galli</i> (<i>Ergot de Coq</i>)	1.—
» <i>Tibetica</i>	1.50	» <i>oxyacantha</i> à fl. doubles	1.50
		» <i>pyracantha</i> (<i>Buisson ardent</i>)	1.50
		<i>Cupressus Arizona</i> de 3 fr. à 15.—	
		» <i>var. argentea</i>	5.—
		» <i>var. pyramidalis</i>	5.—

	Fr. Ct.
<i>Cupressus sempervirens</i> (<i>Cyprès d'Italie</i>), de 5 fr. à 10. —	
<i>Cydonia japonica</i> (type à fl. vermillon). . .	1.50
» » var. diverses à . . .	1. —
<i>Cytisus albus</i> . . .	1. —
» <i>Ardoini</i> . . .	5. —
» <i>Baumgarteni</i> . . .	0.50
» <i>alpinus</i> (<i>Cytise des Alpes</i>) . . .	1. —
» <i>austriacus</i> . . .	1. —
» <i>biflorus</i> . . .	1. —
» <i>capitatus</i> (<i>Cytise en bouquets</i>) . . .	1. —
» <i>caramanicus</i> . . .	2.50
» <i>hirsutus</i> . . .	1. —
» <i>Kewensis</i> . . .	2.50
» <i>Laburnum</i> . . .	1. —
» <i>leucanthus</i> . . .	1. —
» <i>nigricans</i> . . .	1. —
* » <i>purpureus</i> . . .	1.50
» <i>radiatus</i> . . .	1. —
Délicieux arbuste nain aux rameaux étalés, for- mant des boules de fl. jaunes en mai-juin.	
<i>Cytisus Schipkaensis</i> . . .	1.50
» <i>sessilifolius</i> . . .	2.50
» <i>versicolor</i> . . .	2.50
<i>Damnacanthus indicus</i> . . .	5. —
<i>Daphne</i> , voir <i>Pl. alpines</i> .	
<i>Daphniphyllum macropodium</i> . . .	5. —
<i>Decaisnea Fargesii</i> . . .	1.50
<i>Dendromecon rigidum</i> . . .	2.50
<i>Desmodium penduliflorum</i> (très beau) . . .	1.50
» <i>Tiliæfolium</i> . . .	1.50
<i>Deutzia corymbosa</i> . . .	2.50
» <i>crenata</i> . . .	1.50
» » (fl. pl. rosea) . . .	1.50
» <i>discolor purpurascens</i> . . .	2.50
» <i>gracilis</i> . . .	1.50
» » var. <i>carminea</i> . . .	1.50
» » var. <i>eximia</i> . . .	1.50
» » var. <i>rosea</i> . . .	1.50
» <i>japonica</i> . . .	1.50
» <i>parviflora</i> . . .	1.50
» <i>straminea</i> . . .	1.50
<i>Diervillea floribunda</i> . . .	1.50
<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> . . .	1.50
<i>Diospyros Lotus</i> . . .	1. —
<i>Dirca palustris</i> . . .	2.50
» <i>virginianus</i> . . .	1. —
* <i>Edgeworthia Gardneri</i> (<i>E. chrysantha</i>) . . .	5. —
<i>Elæagnus angustifolius</i> (<i>Olivier de Bohême</i> , <i>Chalef</i>) . . .	1. —
» <i>argenteus</i> (<i>Shepherdia argentea</i>) . . .	1.50
» <i>longipes</i> (<i>Chalef américain</i>) . . .	2.50
» <i>umbellata</i> . . .	1.50
<i>Erica arborea</i> . . .	2.50
* <i>Escalonia macrantha</i> . . .	1.50
<i>Euonymus europæus</i> (<i>Bois carré</i>) . . .	0.50
» <i>filiformis</i> . . .	1. —
» <i>latifolius</i> . . .	1. —
» <i>nanus</i> . . .	1. —
» <i>radicans</i> . . .	1. —
<i>Exochorda Alberti</i> . . .	1. —
» <i>grandiflora</i> . . .	1.50

	Fr. Ct.
<i>Fallugia paradosa</i> . . .	2.50
<i>Fontanesia phylliræoides</i> . . .	2.50
<i>Forsythia europea</i> . . .	1.50
» <i>suspensa</i> . . .	0.50
» <i>viridissima</i> . . .	0.50
<i>Fraxinus americana</i> (<i>Frêne d'Amérique</i>) . . .	1.50
» <i>platycarpa</i> (<i>Frêne de la Caroline</i>) . . .	1.50
* <i>Fuchsia corallina</i> . . .	2.50
» <i>gracilis</i> . . .	1. —
» <i>Riccartoni</i> . . .	2.50
* <i>Garrya elliptica</i> . . .	5. —
<i>Genista alba</i> (délicieux arbuste à fl. blan- ches odorantes). . .	1. —
» <i>anglica</i> . . .	2.50
» <i>anxantina</i> . . .	2.50
» <i>cinerea</i> (des Basses-Alpes) . . .	2.50
» <i>decumbens</i> (<i>G Halleri</i>) . . .	2.50
» <i>germanica</i> (<i>Genêt d'Allemagne</i>) . . .	1. —
» <i>hispanica</i> . . .	1. —
» <i>horrida</i> (<i>Genêt hérisson</i>) . . .	1.50
» <i>juncea</i> (<i>Genêt à balais</i>) . . .	0.50
» <i>Libanotica</i> . . .	2.50
» <i>pilosa</i> (<i>Genêt velu</i>) . . .	1. —
» <i>radiata</i> (<i>Genêt rayonné</i>) . . .	1. —
» <i>sagittalis</i> (<i>Genêt ailé</i>) . . .	0.50
» <i>Scoparia</i> . . .	1.50
» » var. <i>Andreana</i> . . .	1.50
» <i>tinctoria</i> (<i>Genêt épineux</i>) . . .	1.50
» <i>triquetra</i> (très rare) . . .	2.50

Ces Genêts sont des pl. excell. pour la décor.
des grands rochers et des jardins; leurs fl.
extrêmement voyantes, d'un jaune ardent, se
succèdent pendant tout l'été. Il leur faut le
soleil.

<i>Gymnocladus canadensis</i> . . .	1. —
<i>Halesia tetraptera</i> . . .	1.50
<i>Halimodendron argenteum</i> . . .	1. —
<i>Hamamelis japonica</i> . . .	2.50
» <i>virginica</i> . . .	1. —
<i>Hedysarum multijugum</i> . . .	1. —

L'une des plus belles introductions de ces dern.
années; fl. carmin très vif, en grappes (juin-
octobre); arbuste formant une touffe de
1 m. 50.

<i>Helianthemum</i> , voir <i>Pl. alpines</i> .	
<i>Hibiscus syriacus</i> (<i>Ketmie</i>) . . .	1. —
<i>Hippophaë rhamnoides</i> (<i>Argousier</i>) . . .	1. —

Arbuste touffu, à verd. grisâtre-argentée, à baies
rouge brique, très artistique dans ses formes
et élégant dans ses couleurs.

<i>Hovenia dulcis</i> . . .	2.50
<i>Hydrangea paniculata</i> . . .	1.50
» <i>quercifolia</i> . . .	2.50
<i>Hymenanthera crassifolia</i> . . .	2.50
<i>Hypericum Androsæmum</i> . . .	0.50
» <i>aureum</i> . . .	1. —

Très bel arbuste bas se couvrant de milliers de
fl. jaunes tout l'été.

» <i>densiflorum</i> . . .	1. —
» <i>galioides</i> . . .	1.50
» <i>Hookerianum</i> . . .	1.50

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
<i>Hypericum kalmianum</i>	1 50	<i>Philadelphus Lewisii</i>	1 50
» <i>patulum</i>	1 50	» <i>microphyllus</i>	1 50
» <i>prolificum</i>	1 50	» <i>nanus</i>	1 50
<i>Idesia polycarpa</i>	2 50	» <i>nivalis</i>	1 50
<i>Indigofera dosua</i>	1.—	» <i>purpureo maculatus</i>	1 50
<i>Jasminum humile</i>	1.—	<i>Pinus Cembra</i> (<i>Pin d'Arolle</i>) de 1 à	5.—
<i>Juglans cordifolia</i>	2 50	» <i>montana</i>	2 50
» <i>nigra</i> (<i>Noyer d'Amérique</i>)	1.—	» <i>Pumilio</i>	5.—
» <i>Sieboldiana</i> (N. du Japon)	2 50	» <i>uncinata</i>	2 50
<i>Juniperus Cedrus</i> (du Pic de Ténériffe)	5.—	<i>Populus trychocarpa</i> (<i>Peuplier balsamique</i>)	1 50
» <i>communis</i> (<i>Genévrier</i>)	1.—	<i>Potentilla Friedrichseni</i>	1 50
» <i>nana</i>	1 50	» <i>fruticosa</i>	1.—
» <i>pachyphlea glauca</i> (feuillage d'un vrai bleu)	5.—	<i>Prunus Brigantiaca</i>	1.—
» <i>phœniceus</i>	2 50	» <i>incana</i>	1.—
» <i>sabina</i> (<i>Sabine des Alpes</i>)	1 50	<i>Pterocarya caucasica</i>	1 50
<i>Kerria japonica</i> (<i>chorchorus</i>)	0 50	» <i>rhoifolia</i>	5.—
Le type à fl. simples, d'un jaune orangé vif, que nous offrons ici, est une pl. rare dans les jardins et très belle.		<i>Purshia tridentata</i>	2 50
» <i>japonica</i> , fl. pl.	0 50	<i>Pyrus alpina</i>	1.—
<i>Lagerstroemia indica</i>	2 50	» <i>arbutifolia</i> (f. écarlates à l'automne)	1.—
<i>Koehltreuteria paniculata</i> (<i>Savonnier</i>)	1.—	» <i>Græca</i>	1.—
<i>Larix dahurica</i> (<i>Mélèze de Chine</i>)	1 50	» <i>Ringo</i>	1.—
» <i>leptolepis</i> (<i>Mélèze du Japon</i>)	1 50	• Ces poiriers sauvages ont leur feuillage rougissant plus ou moins à l'automne; chez les esp. américaines ce phénomène est très accusé et dure plus d'un mois.	
* <i>Laurus nobilis</i>	1.—	<i>Punica granatum</i> (<i>Grenadier</i>)	1.—
<i>Leycesteria formosa</i>	0 50	! <i>Rhamnus alaternatus</i>	1.—
<i>Ligustrum Ibot</i>	1 50	» <i>alpina</i>	0 50
» <i>japonicum</i>	1 50	» <i>Frangula</i>	0 50
» <i>lucidum</i>	1 50	» <i>grandifolia</i>	2 50
» <i>obtusifolium</i>	1 50	» <i>Pallasii</i>	2 50
» <i>Quihoni</i>	1 50	» <i>pumila</i>	1.—
» <i>sinense</i>	1 50	» <i>saxatilis</i>	2 50
<i>Lonicera Alberti</i> (<i>Chamæcerasus</i>)	1.—	* <i>Raphiolepis indica</i>	1.—
» <i>alpigena</i>	1.—	<i>Rhodotypus Kerrioides</i>	1.—
» <i>cærulea</i>	1.—	<i>Rhus Cotinus</i> , var. <i>atropurpureus</i>	1 50
» <i>chrysantha</i>	1.—	» <i>Osbecki</i>	1 50
» <i>fragrantissima</i>	1.—	<i>Ribes alpinum</i> (<i>Groseille des Alpes</i>)	0 50
» <i>involucrata</i>	1.—	» <i>aureum</i> (<i>G. dorée</i>)	0 50
» <i>nigra</i>	1.—	» <i>niveum</i>	1.—
» <i>pileata</i>	1 50	» <i>sanguineum</i>	1.—
» <i>pyrenaica</i> (tr. rare et belle pl.)	2 50	<i>Rosa alpina</i> (<i>Eglantine des Alpes, rose sans épines</i>)	1.—
» <i>rupicola</i>	1.—	» <i>altaica</i>	1.—
» <i>tatarica</i>	1.—	» <i>berberifolia</i> (de graines importées du Turkestan)	5.—
* <i>Loropetalum chinense</i>	5.—	» <i>Eglanteria</i> (<i>Rose capucine, Austrian Briar des Anglais</i>)	1.—
<i>Maclura aurantiaca</i> (<i>Oranger des Osages</i>)	1.—	» <i>indica</i> (type à fl. simples)	2 50
<i>Mahonia aquifolia</i>	0 50	» <i>Lawrenciana</i> (à fl. minuscules)	1.—
<i>Maliotus japonicus</i>	2 50	» <i>lutea</i> (<i>Eglantine soufre</i>)	1.—
<i>Nuttalia cerasiformis</i>	1 50	» <i>pimpinellifolia</i> (<i>Eglantine blanche</i>)	1.—
* <i>Olea Europæa</i> (<i>Olivier, type</i>)	2 50	» <i>rubiginosa</i> (<i>Sweet Briar des Anglais</i>)	0 50
<i>Ononis fruticosa</i>	1 50	» <i>rugosa</i>	0 50
<i>Oreodaphne</i> (<i>Umbellularia</i>) <i>californica</i>	5.—	» <i>sericea</i>	1.—
<i>Osmanthus illicifolius</i>	1 50	» <i>Thea</i> (type sauvage)	2 50
* <i>Osteomeles anthyllidifolia</i>	2 50	<i>Rosmarinus officinalis</i>	0 50
<i>Paliurus aculeatus</i> (<i>Argalou</i>)	1 50	<i>Rubus canadensis</i>	1.—
<i>Pavia macrostachya</i> (<i>Pavier blanc</i>)	1 50	» <i>discolor</i>	1 50
<i>Peraphyllum ramosissimum</i>	2 50	» <i>odoratus</i> (<i>Framboise à gr. fleurs</i>)	0 50
<i>Phellodendron amurense</i>	1.—	<i>Ruscus aculeatus</i> (<i>Fragon, Buis ardent</i>)	0 50
<i>Philadelphus acuminatus</i>	2 50	» <i>racemosus</i>	1.—
» <i>cordifolius</i>	2 50		
» <i>Falconeri</i>	2 50		
» <i>grandiflorus</i>	1 50		

	Fr. Ct.
Salisburya adiantifolia (<i>Gingko</i>)	1.50
Salix cæsia	1 —
» glauca	1.—
» helvetica	1.—
» herbacea (<i>Saule nain</i>)	1.—
» polaris	1.—
» reticulata (<i>Saule rampant</i>)	1.—
» retusa (<i>Saule des Alpes</i>)	1.—
» serpyllifolia	1.—

Les *S. herbacea*, *reticulata* et *retusa* sont les plus délic. miniatures de Saules qu'il soit possible d'imaginer ; leurs rameaux étalés et plaqués sur le sol ou les pierres sont garnis d'un élégant feuillage qui est une jolie décoration pour les rocailles.

Sambucus racemosa (<i>S. corail</i>)	1. —
Sorbus aucuparia (<i>Sorbier des oiseleurs</i>)	0.50
» chamæespilus	1. —
Spirea Aitchisoni	1. —
» argentea	1. —
» ariæfolia	1. —
» Bumalda	0.50
» » Anthony Watterer	1. —
» callosa	0.50
» Douglasi	0.50
» lævigata	2.50
» Lindleyana	0.50
» opulifolia	0.50
» paniculata	1. —
» prunifolia flore pleno	0.50
» salicifolia	0.50
» sorbifolia	0.50
» Thunbergia	1. —

	Fr. Ct.
» Ulmifolia	0.50
Staphylea colchica	1.50
» pinnata	0.50
» trifolia	1.50
Syringa Emodi (<i>Lilas de l'Himalaya</i>)	1.50
» oblata (<i>Lilas précoce</i>)	1.50

Esp. très distincte, basse et fleurissant 15 jours avant les autres lilas ; feuille plus large que longue.

Tamarix faricana	1. —
» æstivalis (fleurit l'automne)	2.50
» Caspica	1. —
» gallica	0.50
» germanica	0.50
» hispida	2.50
» indica	0.50
» japonica	1. —
» Kashgarica	2.50
Taxus baccata (<i>If</i>)	1. —
Tilia cordata (Tilleul du Japon)	2.50
» parvifolia (Tilleul des Alpes)	1.50
» japonica	2.50
Ulex europæus (<i>Ajone</i>)	1. —
» » à fl. doubles	2.50
Viburnum Opulus nanus	2.50
Vitex agnus castus	1. —
» Negundo	2.50
Xanthoceras sorbifolia	2.50
Zanthoxilum ailanthoides	2.50
» piperitum	2.50
» planispinum	2.50
Zizyphus vulgaris (Jujubier)	2.50

Lauriers roses (Nerium Oleander).

Collections de diverses variétés à fl. simples, mi-doubles et doubles, dans les teintes roses, carmin, carnées, blanc pur, blanc rosé, jaune paille, jaune canari, jaune Nankin, rouge sang foncé, saumon et pêche, à 1 fr. 50 le pied de 4 ans, 10 fr. les 12 var. diverses.

Le Laurier rose, rustique dans la Suisse italienne, l'Italie supérieure et le Midi de la France, est de culture très facile. On le rentre, sous notre climat, en cave ou en orangerie ; il fleurit abondamment et ne demande aucuns soins spéciaux, en dehors d'un copieux arrosage.

Plantes grimpantes.

	Fr. Ct.
Actinidia arguta	2.50
Akebia quinata.	1.—
» rosea	2.50
Ampelopsis quinquæfolia (<i>Vigne vierge</i>)	0 50
» Henryana	2.50
» heterophylla.	1.50
» muralis	1.—
» Thomsoni	2.50
» Veitchii	1.—
Apios tuberosa	1.—
Aristolochia Siph.	1.—
Berchemia racemosa	2.50
Bignonia capreolata	1.50
» grandiflora	1.50
» radicans	0 50
» » præcox	1.50
» » rubra	1.50
» » speciosa	1.50
Bryonia dioica	0.50
Calystegia dahurica (<i>Liseron rose vivace</i>)	0.50
» pubescens (<i>Liseron rose à fl. pleines</i>)	0.50
Celastrus scandens	1.50
Clematis Buchanani (superbe esp. à fl. jaunes et odorantes)	2.50
» cirrhosa	1.50
» coccinea (rouge brique vif)	1.50
» flammula (très florifère, odorante)	1.—
» graveolens (fl. jaunes)	1.—
» Heracleifolia.	2.50
» montana (Clématite odorante)	1.—
» » grandiflora	1.50
» » rubra (à fl. roses)	1.50
» orientalis (jaune)	1.—
» paniculata	1.50
» Tangutica (jaune vif)	2.50
» virginienensis	1.50
» vitalba (Viorne)	0.50
» viticella (violet foncé)	0.50
» » rosea	1.—
Cocculus Thunbergianus	2.50
Dioscoræa caucasica	2.50
Ercilla (Bridgesia) spicata	2.50
Glycine, voir <i>Wistaria</i>	
Humulus lupulus (Houblon)	0.50
Jasminum affine	1.—
» nudiflorum (fleurit l'hiver)	0.50
» officinale	0.50
» primulinum.	1.—
Lierre (<i>Hedera Helix</i>), type	0.50
Une douzaine de variétés diverses à f. diversement découpées et colorées, à 1 fr.	

	Fr. Ct.
Lonicera caprifolium (<i>Chèvrefeuille</i>)	0.50
» chinense (à parfum d'oranger)	1.—
» ciliosa	1.50
» Fuchsioïdes (fl. écarlate vif)	1.50
» Japonica (le plus suave).	1.—
» Myrtillus	2.50
* » splendida (rarissime espèce espagnole).	2.50
» sullivanti	1.—
Lycium barbarum.	0.50
» chinense	0.50
» europæum (<i>Lyciei</i>)	0.50

Pl. grimpante solide, qu'on plante contre les murs des maisons du Jura jusqu'à 1000 m. d'altitude.

Menispermum canadense.	1.—
Muhlenbeckia completa	2.50
Pæderia japonica	2.50
Periplocca græca	1.—
Polygonum Baldschuanicum	1.—

L'une des meilleures d'entre les plantes grimpantes; croissance très rapide; fl. rosé carné, abondantes.

Pueraria Thunbergiana	1.50
Rosa alpina à fl. doubles, var. sarmenteuse et superbe à fl. odorantes, se succédant tout l'été	1.50
» Banksia alba plena	1.50
» » lutea plena	1.50
» Wichuriana type	1.50
» » vars.	1.50
* Rubus australis	2.50
» fruticosus à fl. blanches doubles	1.—
» » à fl. roses doubles	1.—
» laciniatus, espèce très sarmenteuse	1.—

A joli feuillage lacinié, à fl. roses, à fruit excellent pour gelées et confitures.

Smilax aspera	2.50
» excelsa	2.50
» sagittæfolia	2.50
Wistaria multijuga	2.50
» sinensis (Glycine)	1.—
» » à fl. blanches	2.50
» » à fl. doubles	2.50
» » à fl. roses	2.50



Ouvrages de M. H. CORREVON en vente chez l'auteur à Floraire
(Les frais de port sont comptés en plus.)

Les plantes des Alpes. Genève 1884. Epuisé.

Les fougères rustiques. Epuisé; quelques exemplaires défraîchis en vente à Fr. 6.—

Les Orchidées rustiques. Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. Prix Fr. 4.—

Flore coloriée de poche. A l'usage des touristes dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées. Epuisé.

Les plantes alpines et de rocailles. Leur culture et leur acclimatation dans nos jardins. Un volume relié toile, de 200 pages, avec plusieurs illustrations. Prix Fr. 2.50

Les Fougères de pleine terre, les Prêles Lycopodes et Sélaginelles rustiques. Un volume relié toile, 140 p. avec illustr. Prix..... Fr. 2.50

Les Iris dans les jardins, par MM. H. CORREVON et H. MASSÉ. Un volume de 204 pages avec 9 figures.

Culture des plantes alpines dans le sphagnum pour les climats méridionaux et secs. Prix..... Fr. 1.—
Le même, en italien Fr. 1.—

Album des Orchidées de l'Europe centrale et septentrionale, par H. CORREVON. Epuisé.

Atlas de la Flore alpine. Edition française par H. CORREVON. Edité par le Club Alpin allemand et autrichien. 500 planches coloriées, admirablement exécutées, en 5 volumes et un volume de texte. Prix..... Fr. 75.—

Fleurs et Montagnes. Un vol. de poésies par H. CORREVON, avec illustrations par M^{lle} Adèle CORREVON. Prix Fr. 2.50

Le jardin de l'Herboriste. Nouv. édit. avec index très complet (110 gravures). Propriétés et culture des simples et plantes officinales. Prix... Fr. 3.50

Par Monts et par Vaux. Un volume de 232 pages avec nombreuses illustrations de Mademoiselle Adèle CORREVON. Prix Fr. 5.—

Nos Arbres. Un volume in-8 richement illustré. Prix Fr. 7.50

La Flore alpine. Par H. CORREVON et P. ROBERT. Prix..... Fr. 25.—
Ouvrage de luxe, richement et admirablement illustré, 100 planches coloriées et 178 figures des plantes alpines les plus répandues; 220 pages de texte donnant la description de la flore alpine, son acclimatation dans les jardins, un aperçu des meilleurs jardins alpins, etc.

Fleurs des Champs et des Bois, des Haies et des Murs par H. CORREVON et S. RIVIER Fr. 25.—
Ouvrage de luxe, reliure artistique, 225 pages de texte, 100 planches en couleurs représentant 180 plantes. Dès son apparition, ce beau volume a rencontré le plus grand succès et a été honoré de souscriptions de L.L. M.M. le Tsar des Bulgares, le Roi d'Espagne, etc.

Fleurs des champs et des bois des haies et des murs

par

HENRY CORREVON

Avec 100 planches en couleurs

d'après les aquarelles de

S. Rivier.

1 beau volume in-8° de 250 pages de texte.

Reliure artistique.

Prix : 25 francs.

En vente chez l'auteur à Floraire, Chêne-Bourg,
près Genève (Suisse).

1912

CONDITIONS DE VENTE

La vente se fait au comptant ou à trois mois. — Nos prix sont fixes pour les espèces choisies par l'acheteur, mais nous faisons les rabais suivants sur les commandes importantes :

5 %	à partir de	50 francs..
10 %	»	100 »
20 %	au-dessus	200 »
25 %	au delà	500 »

Nos clients peuvent nous régler par chèques ou par mandats postaux internationaux.

EXPÉDITIONS

Une collection de 12 plantes alpines, à notre choix et coûtant 5 francs (50 cent. à 1 franc d'emballage), pèse environ 3 kilos.

Pour les colis postaux de 5 kilos (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, France, Hollande, Italie, Luxembourg et Russie) nous pouvons emballer 25 plantes dans la caisse.

Les tarifs pour l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche étant peu élevés, nous envoyons par la voie des messageries les colis qui dépassent le poids du « colis postal » ; quand ce poids est trop élevé pour le transport postal nous choisissons la grande vitesse.

La livre sterling vaut 25 francs.

Le shelling 1 fr. 25 cent.

COLIS POSTAUX POUR L'ÉTRANGER :

		Fr. C.
De Genève en Allemagne	5 kilos.	Port : 1 —
» Autriche-Hongrie	5 »	» 1 —
» Belgique	5 »	» 1 50
» Danemark	5 »	» 1 50
» Espagne	3 »	» 1 75
» France	5 »	» 1 —
» Grande-Bretagne et Irlande	10 »	» 1 50
» »	1 »	» 1 50
» »	3 »	» 2 —
» »	5 »	» 2 25
» »	10 »	» 6 70
» Hollande	5 »	» 1 50
» Italie	5 »	» 1 25
» Luxembourg	5 »	» 1 25
» Norvège et Suède	5 »	» 2 25
» Portugal	5 »	» 2 25
» Russie	5 »	» 2 25

L'établissement, situé depuis 20 ans à Plainpalais, est transféré à Chêne-Bourg depuis 1903, à un quart d'heure de tramway de la Ville. Il s'est transformé en un établissement horticole qui s'occupe de la culture en grand des plantes de montagnes et de rochers, de celle des Plantes vivaces, aquatiques, grimpantes, des arbustes rares et nouveaux, des Conifères, des plantes méditerranéennes et orientales, des Fougères, des Cactées et des Orchidées rustiques, etc.

Adresse télégraphique : CORREVONCHÊNE-GENÈVE



Un groupe d'*Eryngium alpinum* au jardin de la « Rambertia », (Rochers de Naye).